

# NOTAS CIPEROLÓGICAS

Por MANUEL BARROS

---

## RÉSUMÉ

**Notes ciperologiques.** — L'auteur fait plusieurs corrections des noms avec lesquels figurent quelques plantes aux travaux publiés par lui, se rapportant à la priorité; il mentionne de nouvelles procedences du *Heleocharis villaricensis*, *H. Spegazzinii*, *H. pachycarpa* et *H. Parodii*.

Outre, il décrit une nouvelle variété du *Scirpus californicus* à laquelle il désigne avec le nom de *spoliatus*, mot qui exprime son plus notable caractère, c'est-à-dire qu'il a perdu ses écailles hypogines, dont il se distingue de la var. *tereticulmis*.

Después de aparecidos los trabajos sobre los géneros *Heleocharis*, *Kyllingia*, *Scirpus* y *Carex*, que vieron la luz en los *Anales del Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia »*, volumen XXXIV (1928), páginas 425 a 496 y volumen XXXVIII (1935), páginas 133 a 264, he tenido oportunidad de recoger algunas notas relacionadas con la sistemática de varias especies citadas en ellos y de examinar algunas que no habían sido señaladas todavía para nuestro país y entre ellas una variedad nueva para la ciencia.

Corregir algunos nombres que son sinónimos de otros, a los que corresponde la prioridad y dar a conocer las plantas aun no citadas, son los fines que estas notas persiguen.

*Heleocharis villaricensis* Maury, *Mém. de la Soc. de Phys. et d'Hist. Nat. de Genève*, volumen XXXI (1890), página 138, tab. 40 B. Esta especie perteneciente al subgénero *Eleogenus* ha sido coleccionada por Hauman en San Ignacio, Misio-

nes y se encuentra en el herbario del Museo Argentino « Bernardino Rivadavia ».

*Heleocharis prolifera* Torrey, *Ann. Lyc. N. York*, volumen III (1836), página 136. Este es el nombre que corresponde a la especie determinada por mí como *H. tenuissima* Boeck, en *Anales del Museo Nacional de Historia Natural « Bernardino Rivadavia »*, volumen XXXIV (1928), página 452, figura 12; el nombre de Boeckeler es muy posterior.

*Heleocharis flaccida* (Spreng.) Urban, *Symb. Antill.* (1900), página 165. Este es el nombre que debe llevar la especie descrita y figurada por mí (*loc. cit.*, pág. 434, fig. 3). Es el *Scirpus flaccidus* Spreng., *Tent. Suppl.* (1828), página 3. El nombre de *H. ocreata* Nees data de 1842.

*Heleocharis Spegazzinii* Barros, *loc. cit.*, página 474, figura 25. He comprobado la existencia de esta planta en varios otros herbarios: en Ginebra. Hassler 2827, de Santa Elisa, Chaco paraguayo; Schultz 1317, Chaco argentino, Col. Benítez.

*Heleocharis Parodii* Barros, *loc. cit.*, página 480, figura 28. Como una nueva procedencia figura el Uruguay; hallada por Rosengurtt en el departamento de Flores, sobre el río Yí, herb. Rosengurtt 678.

*Heleocharis pachycarpa* Desv., *loc. cit.*, página 464, figura 19. En el momento de aparecer mi monografía del género *Heleocharis*, no había tenido ocasión de observar ejemplares argentinos de esta planta. Posteriormente la he hallado en los lagos del Sur y conservo en mi herbario los números siguientes: 2317 de Río Negro, sobre el lago Mascardi; Bariloche, sobre el lago Nahuel-Huapí, n<sup>os</sup> 2324 y 2326; Neuquén, sobre el río Traful n<sup>o</sup> 2328; lago Correntoso n<sup>o</sup> 2336.

*Scirpus californicus* (Meyer) Britton, *Trans. New York As. Sc.*, volumen XI (1892), página 6, descrito por C. A. Meyer en *Cyperaceae novae*, *Mem. Acad. S. Petersb.*, volumen I (1831), página 201, tab. II con el nombre de *Elytrospermum californicum*. Este es el nombre que corresponde a la planta corrientemente designada como *Sc. riparius* Presl, cuya descripción es de 1828. El trabajo de Meyer vió la luz en 1931, fecha de la aparición del tomo I de las *Memorias de la Academia de San Petersburgo*; pero la fecha que figura en sus *Cyperaceae novae* es la de 1825.

*Scirpus californicus* var. *spoliatus* var. *nova*. *Culmus sesquimetralis et ultra, teres; inflorescentia ad caput unicum redacta; squamae hypogynae nullae; caeteroquin ut var. tereticulmis* (stuedel) Clarke. *A Sc. nodoso* Rottb. *differt stylo bifido; a var. tereticulme ob squamas hypogynas deficientes. Ad ripas lacus Mascardi lectus. in Herb. M. Barros servatus sub n<sup>o</sup> 2315.*

El *Scirpus nodosus* ha sido citado para la Argentina por Hicken en *Chloris platensis argentina* (1910) página 57, cita a la que hacen referencia Hauman y Vanderveken en *Anales del Museo Nacional de Historia Natural* de Buenos Aires, volumen XXIX (1917), página 222. A pesar de ello no he visto ejemplar alguno de procedencia argentina y sólo he visto en el herbario de Kew varios números procedentes de las islas de Juan Fernández, Valdivia y Valparaíso. Su diferencia con la nueva variedad reside en su estilo que en aquel es trifido. Su semejanza con la var. *tereticulmis* es tal que sólo la falta de escamas hipoginas lo distingue de ella.