

MISCELANEA

NÚMERO 143

Las aves Passeriformes de Tucumán, Argentina

Zulma J. Brandán Fernández
Claudia M. Antelo
Nora L. Marigliano



Fundación Miguel Lillo

Tucumán – Argentina

Miscelanea

Serie no periódica cuya temática incluye innovaciones metodológicas, información biológica catalogada, actualizaciones y ensayos científicos.

ISSN 0074-025X

Correo electrónico: eflizarra@lillo.org.ar

Fundación Miguel Lillo, 2021.
www.lillo.org.ar

Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina.
Telefax +54 381 433 0868
www.lillo.org.ar

Director General de Investigaciones:
David Flores (Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina)

Editor Área Zoología:
Emilio Lizarraga (Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina)

Editor gráfico:
Gustavo Sánchez (Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina)

Editor web:
Andrés Ortiz (Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina)

Consultas bibliográficas y ventas:
Centro de Información Geo-Biológico del Noroeste Argentino,
Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina.
Correo electrónico: biblioteca@lillo.org.ar

Ref. bibliográfica:
Brandán Fernández, Z. J.; Antelo, C. M.; Marigliano, N. L. 2021. Las aves Passeriformes de Tucumán, Argentina. *Miscelanea* 143, 216 pp.

Derechos protegidos por Ley 11.723
Editado en Argentina



Las aves Passeriformes de Tucumán, Argentina

The Passeriform Birds of Tucumán, Argentina

Brandán Fernández, Zulma J.*; Antelo, Claudia M.; Marigliano, Nora L.

Instituto de Vertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (T4000JFE) San Miguel de Tucumán, Argentina.

Autora para correspondencia: zjbrandan@lillo.org.ar

RESUMEN

Los inventarios faunísticos son una herramienta valiosa ante la pérdida de biodiversidad provocada por el crecimiento antrópico y la consiguiente transformación de los hábitats. Esta publicación tiene por objetivo brindar un catálogo de las aves passeriformes de la provincia de Tucumán, a partir de las especies efectivamente registradas y citadas en la literatura durante las dos últimas décadas y de los individuos capturados y depositados en la Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo desde 1846 hasta 2018. La revisión de 96 trabajos sobre la avifauna tucumana y de 12 guías nacionales e internacionales, sumada a los datos de colección, determinó la presencia de 261 especies pertenecientes a 24 familias del Orden Passeriformes, debiéndose confirmar la presencia de 8 especies. En la Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo se encuentra representado el 96% de las familias y el 90% de las especies de Tucumán, por lo que remarca su importante rol como colección de referencia. Detectamos 65 especies que efectúan algún tipo de desplazamiento migratorio, 17 incluidas en alguna categoría de conservación y 10 endémicas regionales. Sumado al trabajo ya existente de las aves no Passeriformes, esta obra completa el inventario actualizado de la avifauna tucumana, resultando un valioso aporte al conocimiento y brindando información de base para futuros proyectos de manejo y conservación.

Palabras clave — Avifauna, Passeriformes, inventario, diversidad, conservación.

► Ref. bibliográfica: Brandán Fernández, Z. J.; Antelo, C. M.; Marigliano, N. L. 2021. Las aves Passeriformes de Tucumán. *Miscelanea* 143, 216 pp.

► Recibido: 30 de noviembre 2020 – Aceptado: 20 de mayo 2021.

► URL de la revista: <http://www.lillo.org.ar/editorial/index.php/publicaciones/catalog/series/miscelanea>



► Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

ABSTRACT

Faunistic inventories are a valuable tool before the biodiversity loss caused by anthropic growth and the subsequent transformation of habitats. This work has the objective of providing a catalog of the passerine birds in the province of Tucumán, drawn from the species effectively registered in the field, the ones quoted in literature during the past two decades, and the exemplars captured and deposited in the Ornithological Collection of the Fundación Miguel Lillo since 1846 until 2018. The perusal of 96 works on the tucumán avifauna and 12 national and international guides, in addition to the collection data, have determined the presence of 261 species belonging to 24 families of the order Passeriform with the uncertain presence of another 8 species. 96% of the families and 90% of the species of Tucumán are represented in the Ornithological Collection of the Fundación Miguel Lillo, further solidifying its role as a reference collection. We counted 65 species with any kind of migratory displacement, 17 included in any conservation category and 10 regionally endemics. The previously published work on the Non-passeriform birds of Tucumán and this one on Passeriform birds compose the updated inventory of the avifauna in Tucumán, resulting in a valuable contribution to its knowledge and providing information as a basis for management and conservation projects.

Keywords — Avifauna, Passeriform, inventory, collection, conservation.

INTRODUCCIÓN

Los inventarios faunísticos son una herramienta valiosa para el conocimiento y valoración de la fauna presente en un espacio geográfico y se hacen cada vez más necesarios, como fuentes de información, ante la pérdida de biodiversidad, provocada por el crecimiento antrópico y la transformación de los hábitats (Dirzo y Raven, 1994).

El espacio geográfico escogido para nuestro trabajo abarca la provincia de Tucumán que se encuentra ubicada en el noroeste argentino, entre los 26°04' y 28°01' de latitud sur y los 64°28' y 66°09' de longitud oeste. Es la más pequeña de las provincias argentinas, con una superficie de 22.524 km², a pesar de lo cual presenta una enorme diversidad de paisajes (Santillán y Ricci, 1980), flora, fauna y gea que se integran para originar una variedad de hábitats para la vida silvestre (Vides-Almonacid *et al.*, 1998). Soporta una carga poblacional humana de 64.3 habitantes/km² (INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo nacional de población, hogares y viviendas, 2010) lo que genera grandes transformaciones en los hábitats naturales. (<http://g.geosplan.tucuman.gob.ar/html/mapas/IGN/IGN-ProblemasAmbientales.pdf>).

Ornitológicamente, la provincia es reconocida por su riqueza de especies, según Moschione (2007) contiene aproximadamente el 49% de las citadas para el país, por lo cual es prioritario tener un conocimiento actualizado y detallado de la misma. Cuenta con 14 áreas naturales protegidas, que suman 170.000 ha bajo distintas figuras de protección legal (Malizia, 2014), en las que se preserva mucha de la diversidad ornitológica de la provincia, entre ellas, 107 de las especies incluidas en alguna de las categorías de amenaza nacionales (Rabuffetti y Cerezo, 2017).

Existen numerosas fuentes usadas para elaborar inventarios faunísticos (Villareal *et al.*, 2006), en este trabajo empleamos datos obtenidos a campo, registros bibliográficos y material colectado con fines de estudio y depositado en colección. Con respecto a este último punto, cabe destacar que en muchos países latinoamericanos, el desarrollo de la ornitología como disciplina se ha cimentado gracias a las colecciones científicas de aves, puesto que las mismas funcionan como bibliotecas de la naturaleza por la cantidad de información que preservan (Escalante-Pliego y Chávez-Castañeda, 2002; Cuervo *et al.*, 2006).

Recurrimos a la Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo (COLFML), la cual conserva material de más de 170 años de colectas procedentes tanto del territorio nacional como de países circunvecinos. Esta colección es considerada una valiosa muestra de referencia (Brandán y Antelo, 2001) por la representatividad que posee de la avifauna local y del resto de Argentina, así como también de Chile, Bolivia y Perú. A partir de ella surgieron trabajos taxonómicos y de distribución que sirvieron de base para la catalogación de la diversidad regional y resultaron primordiales para elaborar valiosas guías de aves, así como otros trabajos científicos orientados hacia distintas disciplinas (ej.: Esteban, 1948, 1953 y 1960; Olrog, 1962, 1963, 1967, 1968a, b; 1972a, b; 1974a, b, 1979, 1984 y 1985a, b; Lucero, 1983; Brandán y Antelo, 2001; Brandán y Navarro, 2009; Antelo y Brandán Fernández, 2013; Ortiz *et al.*, 2013a).

La COLFML cuenta con aproximadamente 16.000 ejemplares de aves, preparados en piel y en pedestal, de los cuales 11.939 son de Argentina y 4.197 de Tucumán (Echevarría *et al.*, 2008a). De este material preservado registramos los datos de la totalidad de aves passeriformes colectadas en territorio provincial desde 1846 hasta 2018 y depositadas en la misma, incluyendo también el material en alcohol y esqueletos.

Otras fuentes consultadas fueron los trabajos de investigadores que aportan listados de especies o que las mencionan como avistadas en el territorio provincial y que constituyen una apreciable fuente de información. En esta revisión fueron incluidas las publicaciones de ornitólogos desde el año 1999 a 2019, así como las referencias de guías de aves nacionales e internacionales del mismo período. Cabe destacarse que en la bibliografía disponible no existía un consenso sobre la riqueza de passeriformes, tal como ocurría para las aves no passeriformes (Antelo y Brandán Fernández, 2013).

Con toda esta información generamos el presente inventario de aves passeriformes para la provincia de Tucumán. El mismo está ordenado sistemáticamente y menciona las especies citadas en la literatura, pero además aporta una revisión sobre las avistadas durante las dos últimas décadas así como también sobre las capturadas en la provincia y que se encuentran depositadas en la Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo.

De esta manera, con la publicación ya existente sobre los no passeriformes de Tucumán (Antelo y Brandán Fernández, 2013), se completa el inventario actualizado de la avifauna para la provincia, resultando un valioso aporte al conocimiento y brindando información de base para proyectos de manejo y conservación.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Presentamos el inventario organizado sistemáticamente desde familia a especie, siguiendo la taxonomía a nivel de nombres genéricos, específicos y en inglés según lo propuesto por el Comité Sudamericano de Clasificación (Remsen *et al.*, 2020).

Junto al nombre científico actualizado aportamos: los nombres vernáculos en español mencionados en Navas *et al.* (1990) y en los casos que existieran los nombres vulgares en portugués, para lo cual consultamos la página web de EcoRegistro.org (2020), listado sistemático de las aves de Brasil (<http://www.ecoregistros.org/site/pais.php?id=7&idgrupoclase=1>), la Lista del Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2010) y a Bencke *et al.* (2010).

A continuación describimos para cada especie tanto el **Hábitat** que frecuenta como su **Distribución** en todo el país, en base a datos bibliográficos de los siguientes autores: de la Peña, 1999; Howard y Moore, 2003; Brandán y Navarro, 2009; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017; del Hoyo, Elliott, Sargatal, Christie y Kirwan, 2019.

Luego detallamos **Localidades de observación** en la provincia, donde incluimos las mencionadas en trabajos de investigación publicados desde el año 1999 hasta 2019, además en tesis de grado y de posgrado presentadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán. Los datos fueron organizados como cita bibliográfica y en forma cronológica: apellido del observador/es, año entre paréntesis, cuando hubo dos trabajos para el mismo año agregamos una letra a fin de identificarlos y por último localidad de avistaje, con el departamento entre paréntesis para facilitar la ubicación geográfica, siendo este un aporte de las autoras en caso de que no figurara en los trabajos originales. Si se describió más de una localidad por trabajo las mencionamos a todas y si la localidad abarcaba más de un departamento o se desconocía el mismo colocamos las siglas «S/Dpto». Las localidades de observación se graficaron en un mapa (Figura 1).

En el ítem **Material estudiado** registramos los datos de las etiquetas de las pieles, material en pedestal, en alcohol y esqueletos de ejemplares colectados en la provincia y depositados en la COLFML. Indicamos el número de colección entre paréntesis, cantidad y sexo de los ejemplares, procedencia (detallando localidad y el departamento administrativo sólo en el caso de que existiera otra localidad con el mismo nombre o se cuente sólo con este único dato y sin localidad cuando se desconocía la misma) y la fecha de colecta. El sexo de cada ejemplar se señaló con iniciales en mayúscula (M: macho, H: hembra y con el signo ?: cuando se desconoce). Los ejemplares con los mismos datos de procedencia se agruparon a los fines de no redundar la información.

En el ítem: **Literatura** colocamos en orden cronológico los autores y el año de las guías de aves nacionales e internacionales en las que figuran estas especies como integrantes de la avifauna tucumana.

Finalmente en **Observaciones** se incluyen datos de interés como estado de conservación, endemismos, especies exóticas o algún otro que se considere relevante. Para conocer el estado de conservación se revisó los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres




Fig. 1. Localidades en la provincia de Tucumán donde se observaron las Aves Passeriformes citadas en el presente trabajo, desde 1999 a la actualidad.

[CITES] (2019); la categorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentinas [MAyDS y AA] (2017) y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN] (2019). En CITES I se incluyen las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro. En el CITES II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. En el CITES III figuran las especies incluidas a solicitud de una parte que necesita la cooperación de otros países para evitar su explotación insostenible o ilegal. Las categorías de UICN son: LC preocupación menor, NT casi amenazada, VU vulnerable, EN en peligro y CR peligro crítico. Para MAyDS y AA las categorías son: EC en peligro crítico, EN en peligro, AM amenazada, VU vulnerable, NA no amenazada e IC insuficientemente conocida.

En el apéndice 1 se detallan las localidades de captura del material depositado en la COLFML, ordenadas alfabéticamente, con su departamento administrativo y coordenadas geográficas, en el caso de ser posible su localización aproximada.

En el apéndice 2 se listan las especies de distribución dudosa o incierta en la provincia, considerándose así a aquellas que presentan sólo localidades de observación, de un único observador y por única vez o ejemplares que se encuentran en la COLFML sin localidades definidas, que no figuran para la provincia en ninguna guía de aves y nunca fueron observados en Tucumán o citas en guías de aves que no fueron observadas localmente y de las cuales no se tiene certeza que pertenezcan a la avifauna de la provincia.

INVENTARIO DE AVES DEL ORDEN PASSERIFORMES

1) Familia *Thamnophilidae*

17 especies en Argentina de las cuales cinco están presentes en Tucumán y una para confirmar (Apéndice 2).

Batara cinerea

BATARÁ GIGANTE / GIANT ANTSHRIKE / MATRACÃO

- **HÁBITAT:** Estrato bajo en claros de selvas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta, en Jujuy, Salta y Tucumán y en Misiones.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), Hualinchay (Trancas); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafi Viejo).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (10540 y 10542) 1H y 1M, Río Las Tipas, La Isla, 1957; (10541 y 10543) 1H y 1 M, La Angostura, 1957; (10950) 1M, La Higuera, 1958; (11008) 1M, Las Mesadas, 1958; (11009) 1H, Ventana del Indio, 1958; (11360) 1M, Chilca, 1959; (11371) 1M, Las Mesadas, 1959; (12188, 12189) 2H, Las Mesadas, 1961; (12240) 1H, Las

Tipas, 1962; (12293) 1H, Hualinchay, 1962; (12375) 1M, Las Mesadas, 1962; (12417 y 12148) 1M y 1 H, Las Mesadas, 1963; (12696 y 12697) 1H y 1 M, Las Mesadas, 1964.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Taraba major

CHORORÓ / GREAT ANTSHRIKE / CHORÓ-BOI

- HÁBITAT: Claros en selvas, bosques, sabanas, espinal y monte.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona cordillerana y Misiones, hasta Catamarca, La Rioja, norte de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Capllonch y Ortiz (2006) Monteagudo (Simoca), Ticucho y San Pedro de Colalao (Trancas), (Cruz Alta); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alderete y Capllonch (2010) Agua Salada (Leales), Ticucho (Trancas), Colombres (Cruz Alta); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), San Pedro de Colalao y Ticucho (Trancas), Garmendia y 7 de Abril (Burruyacú), Los Puestos, Leales y Abra Rica (Leales), (Cruz Alta).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (103, 104 y 163) 2M y 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (254) 1M, Los Romanos, 1946; (512) 1M, sin localidad, 1899; (513) 1H, sin localidad, 450 m snm, 1902; (514) 1H, sin localidad, 1902; (515) 1M, sin localidad, 360 m snm, 1928; (516) 1M, sin localidad, 1898; (526, 1007 y 1015) 2M y 1H, Dpto. Leales, 1946; (896 y s/nº) 1H y 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1252 y 1264, 1920) 1M y 2H San Pedro de Colalao, 1946; (1422 y 1430) 2M, Dpto. Leales, 1946; (2037) 1M, Yerba Buena, 1946; (2759) 1H, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (6356) 1M, San Pedro de Colalao, 1952; (10351) 1H, Dpto. Trancas, 1956; (10735) 1M, Rearte, 1957; (10954) 1M, La Higuera, 1958; (11393) 1M, Estancia Pozo Cavao, 1959; (12419) 1M, Campo las Chuñas, 1963; (12420) 1M, Las Mesadas, 1963; (17207) 1M, El Vizcacheral, 1993; (s/nº).

- en pedestal: (163) 1M-1H, Concepción, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Thamnophilus ruficapillus

CHOCA CORONA ROJIZA / RUFIOUS-CAPPED ANTSHRIKE /
CHOCA-DE-CHAPÉU-VERMELHO

- **HÁBITAT:** Bordes de selvas y bosques húmedos, en espinales, matorrales y capueras.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta, en Jujuy, Salta, Tucumán y oeste de Santiago del Estero y en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y norte de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch y Ortiz (2006) Horco Molle (Yerba Buena), Aguas Chiquitas (Burruyacú), Las Juntas (Trancas), (Cruz Alta); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Trancas); Alderete y Capllonch (2010) Las Juntas (Trancas); Ortiz, Aráoz y Alderete (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), Aguas Chiquitas (Burruyacú), Las Juntas (Trancas), (Cruz Alta).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (371) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (507) 1?, Taficillo, 1929; (520) 1M, sin localidad, 1930; (526) 1M, sin localidad, 370 m snm, 1928; (527) 1M, sin localidad, 1902; (537) 1M, sin localidad, 1901; (549) 1H, Ñorco, 1904; (6313) 1H, Las Juntas, 1950; (9853) 1H, La Angostura, 1956; (10367) 1?, San Pedro de Colalao, 1959; (10388) 1M, San Pedro de Colalao, 1956; (10602) 1M, Rearte Norte, 1957; (10742) 1H, La Angostura, 1957.
 - en pedestal: (164) 1M-1H, Concepción, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Thamnophilus caerulescens

CHOCA COMÚN / VARIABLE ANTSHRIKE / CHOCA-DA-MATA

- **HÁBITAT:** Selvas, selvas en galería, bosques, espinal y monte.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la zona cordillerana, hasta Catamarca y La Rioja, norte de San Luis, Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Capllonch y Ortiz (2006) El Chañar (Burruyacú), El Cadillal (Tafí Viejo), San Pedro de Colalao, Tapia (Trancas); Alderete y Capllonch (2010) El Chañar (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Chañar (Burruyacú), El Cadillal (Tafí Viejo), San Pedro de Colalao, Tapia, Vipos (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz, Martínez Pastur, Juliá y Quiroga (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (124) 1M, Dpto. Tafí Viejo, El Cadillal, 1946; (521 y 525) 1H y 1H, sin localidad, 370 m snm, 1928; (522) 1?, La Ramada, 1946; (531) 1H, Tapia, 1901; (540) 1M, San Pedro de Colalao, 1917; (544) 1?, sin localidad, 1901; (545) 1M, sin localidad, 486 m snm, 1948; (546) 1M, Tapia, 1911; (992 y 994) 1M y 1H, Leales, 1946; (1249 y 2475) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (1367, 1377, 1411) 3M, Las Cañitas, 1946; (1618 y 1028, 2016, 3232) 1? y 3M, El Saladillo, 1946; (1967) 1M, Tapia, 1946; (3492) 1M, Cerro del Campo, 1946; (7690) 1H, sin localidad, 415 m snm, 1927; (7928) 1M, Los Nogales, 1946; (10586) 1H, El Simbolar, 1957; (10588) 1M, Chulca, 1957; (17208) 1M, El Vizcacheral, 1993.
 - en pedestal: (165) 1M, Concepción, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myrmorchilus strigilatus

BATARÁ ESTRIADO / STRIPE-BACKED ANTBIRD / PIU-PIU

- HÁBITAT: Bosques y sabanas de tipo chaqueño, matorrales y monte cerrado.
- DISTRIBUCIÓN: En el norte del país, exceptuando la zona cordillerana y mesopotámica, en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán, Marigliano, Navarro y Antelo (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capplonch y Ortiz (2006) Río Urueña (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2013a) Río Urueña (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

2) Familia Melanopareidae

Dos especies en Argentina y una presente en Tucumán.

Melanopareia maximiliani

GALLITO DE COLLAR / OLIVE-CROWNED CRESCENTCHEST

- HÁBITAT: Matorrales, pastizales y terrenos rocosos en bordes de bosques y sabanas.
- DISTRIBUCIÓN: En el norte del país desde Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y norte de

Santa Fe, hasta Tucumán, Santiago del Estero, este de Catamarca, La Rioja, oeste de Córdoba y San Luis.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Sierra de San Javier (Yerba Buena); Navarro, Brandán y Marigliano (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Marigliano, Navarro y Brandán (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Sierra de San Javier (Yerba Buena), Sierras de Medina (Burruyacú), Vipos y Ticucho (Trancas).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (877, 2238) 2H, San Pedro de Colalao, 1946; (971 y 976) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1712) 1M, sin localidad, 1899; (1713) 1H, Tañí Viejo, 1916; (1715) 1M, sin localidad, 450 m snm, 1900; (11268) 1M, San Pedro de Colalao, Alto La Totorá, 1958.

- en pedestal: (172) 1M-1H, Dpto. Tañí del Valle, Aconquija, 1911.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

3) Familia Rhinocryptidae

11 especies en Argentina y tres en Tucumán. Dos especie endémicas presentes en la provincia.

Rhinocrypta lanceolata

GALLITO COPETÓN / CRESTED GALLITO

- HÁBITAT: Bosques, estepas arbustivas, monte chaqueño y espinal.

- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la Mesopotamia, desde Jujuy, Salta y centro de Formosa, por el noroeste de Córdoba y centro de Chaco hasta el norte de Neuquén, Río Negro y sur de Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Tacanas, Estación Aráoz (Leales); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tacanas, Estación Aráoz, Finca Abra Rica (Leales).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (602) 1M, Tapia, 1901; (603) 1H, Los Gómez, 1915; (604) 1M, sin localidad, 330 m snm, 1915; (747, 755) 2M, El Guardamonte, 1946; (2021) 1H, Dpto. Leales, 1946; (2022, 2023) 2H, Dpto. Leales, 1946.

- en pedestal: (161) 1H, Toro Muerto, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Teledromas fuscus

GALLITO ARENA / SANDY GALLITO

- HÁBITAT: Estepas arbustivas, prepuna, arenales y salitrales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el suroeste de Salta y oeste de Tucumán por Catamarca exceptuando la zona cordillerana, hasta Neuquén, noroeste de Córdoba, sur de La Pampa, norte de Río Negro y Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Valle de Yocavil, entre Amaicha del Valle y Quilmes, El Pichao, Sierra de Quilmes (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (9789) 1M, Amaicha del Valle, Santa María, frontera Tucumán-Catamarca, 1956; (11137 y 11138) 1H y 1M, Amaicha del Valle, 1958.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: Especie endémica. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Scytalopus superciliaris

CHURRÍN CEJA BLANCA / WHITE-BROWED TAPACULO

- HÁBITAT: Cerca del suelo en yungas y bosques dominados por alisos.
- DISTRIBUCIÓN: Entre los 1000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y norte de La Rioja.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) La Banderita (Chicligasta), Taficillo (Tafí Viejo), La Angostura, El Infiernillo, La Ciénaga (Tafí del Valle); Capllonch (2007b) La Angostura, Cerro Muñoz, El Infiernillo (Tafí del Valle), La Ciénaga (Tafí Viejo); Moschione (2007) Sierra de Medina (Burruyacú/ Trancas), Sierra de San Javier (Yerba Buena/ Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Río Los Sosa (Monteros/ Tafí del Valle), Parque Provincial Cumbres Calchaquies (Tafí del Valle/ Trancas), Cuesta del Clavillo (Chicligasta), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Trancas (Trancas), Reserva Natural La Angostura (Tafí del Valle), Parque Provincial Los Ñuñorcós, Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/ Monteros), Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico); Alderete y Capllonch (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí

Viejo); Capllonch, Ortiz y Ferro (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Araújo (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) La Banderita (Chicligasta), San José de Chasquivil, La Ciénaga (Tafí Viejo), El Infiernillo, La Quebradita, Tafí del Valle, Dique La Angostura (Tafí del Valle); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (614 y 615) 1H y 1M, Dpto. Tafí del Valle, 2300 m snm, 1901; (617) 1H, La Ciénaga, 1913; (8488) 1M, Tafí del Valle, 1953; (9066) 1M, Tafí del Valle, 1955; (9686) 1H, Dpto. Tafí del Valle, 1955; (14540) 1M, Alto de La Perdiz, Cumbres de Cabra Horco, 1977; (17043, 17049) 2?, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.

- en pedestal: (273) 1M, Las Pavas, 1910; (273) 1H, Las Pavas, 1911.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019a); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: Especie endémica. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

4) Familia Furnariidae

95 especies en Argentina, 48 presentes en Tucumán. Cuatro especies endémicas. Tres ejemplares Tipo depositados en COLFML.

Geositta tenuirostris

CAMINERA PICUDA / SLENDER-BILLED MINER

- HÁBITAT: Estepas altoandinas y áreas altoserranas con suelos rocosos y pastizal disperso en el noroeste.

- DISTRIBUCIÓN: Entre 3000 y 4000 m snm desde Jujuy y Salta por Tucumán, San Juan, La Rioja hasta Mendoza.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Cumbres de Mala Mala (Lules), Valle de la Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch (2007b) Cumbres Calchaquíes, del Aconquija y de Mala Mala (S/Dpto.), El Infiernillo, Valle de La Ciénaga (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande, Huaca Huasi (Tafí Viejo), El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres Calchaquíes, Quilmes, Cumbres del Aconquija, El Infiernillo, Valle de La Ciénaga (Tafí del Valle), Cumbres de Mala Mala (Lules); Salvador (2015) El Infiernillo (Tafí del Valle); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1060) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1580 y 1642) 1H y 1M, Dpto. Lules, Cumbres de Mala Mala, 1901; (1632) 1H, La Ciénaga, 1903; (5194, 5215, 5239,

5246 y 5230, 5241) 4M y 2H, El Infiernillo, 1947; (5406, 5436, 5497, 5500 y 5424) 4H y 1M, El Infiernillo, 1948.

– en pedestal: (683) 1H, Dpto. Taquí del Valle, Aconquija, 1918.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdS y AA: NA.

Geositta cunicularia

CAMINERA COMÚN / COMMON MINER / CURRIQUEIRO

● HÁBITAT: Áreas abiertas, andinas y pampeanas, suelos arenosos con dunas y sectores pedregosos en sierra y montaña.

● DISTRIBUCIÓN: Desde Jujuy pasando por Salta, Tucumán, sur de Santiago del Estero y Córdoba hasta Tierra del Fuego. En otoño algunas poblaciones migran hacia el noreste hasta Entre Ríos y Corrientes.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Taquí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) entre El Infiernillo y Ampimpa (Taquí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Taquí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Lagunas de Huaca Huasi (Taquí Viejo), entre Ampimpa y El Infiernillo (Taquí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdS y AA: NA.

Geositta rufipennis

CAMINERA COLORADA / RUFIOUS-BANDED MINER

● HÁBITAT: Estepas altoandinas y áreas altoserranas con suelos rocosos en declive con pastizal y arbustal disperso.

● DISTRIBUCIÓN: Disyunta, desde Jujuy por la zona cordillerana hasta Santa Cruz y en las sierras de Córdoba y San Luis.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) entre El Infiernillo y Ampimpa (Taquí del Valle); Capllonch (2007b) Ruta 307, entre El Infiernillo y Ampimpa (Taquí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Taquí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Taquí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Ruta 307 entre El Infiernillo y Ampimpa, Sierra de Quilmes (Taquí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1591) 1M, Cerro Muñoz, 1905; (2079) 1M, El Infiernillo, 1946; (5177) 1H, El Infiernillo, 1947; (8975) 1M, entre el Infiernillo y Amaicha, Aconquija, 1955.
- Literatura: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- Observaciones: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sittasomus griseicapillus

TAREFERO / OLIVACEOUS WOODCREEPER / ARAPAÇU-VERDE

- HÁBITAT: Selvas, selvas en galería, bosques húmedos en el noroeste y noreste.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta, en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y en Formosa, Chaco, norte de Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo, Brandán, Navarro y Marigliano (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Ticucho y Choromoro (Trancas), Los Puestos (Leales); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Araoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) Horco Molle (Yerba Buena), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), Burruyacú (Burruyacú), Chulca (Trancas), (La Cocha), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Río Chico, San Ignacio, Reserva Natural Santa Ana (Río Chico); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo, Marigliano, Brandán y Navarro (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho, Choromoro (Trancas), Chorrillos (Burruyacú), Los Puestos (Leales); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano, Antelo, Brandán Fernández y Navarro (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (131) 1H, Las Cañitas, 1946; (334) 1H, El Sunchal, 1946; (638 y 650 y 981) 1M y 1H y 1?, Los Nogales, 1946; (911 y 941) 1M y 1?, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1027, 1041, 2056 y 1180, 1659) 3M y 2H, El Saladillo, 1946; (1086) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1832 y 1835) 1H y 1M, sin localidad, 450

m snm, 1900; (1833) 1M, sin localidad, 1903; (1834) 1M, Quebrada de Vipos, 1905; (1839) 1H, Dpto. Capital, 1899; (2584) 1H, Yerba Buena, 1946; (3489) 1M, Cerro del Campo, 1946; (4533) 1H, Dpto. Tafí Viejo, El Cadillal, 1947; (4596) 1M, El Timbó, 1947; (6094) 1M, Yerba Buena, 1945; (6608) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (9021) 1M, Las Juntas, 1954; (10619) 1M, Rearte, 1957; (12348) 1M, Quebrada de Los Laureles, San Pedro de Colalao, 1962.

– en pedestal: (198) 1M, La Calera, 1909; (198) 1H, Iltico, 1909.

– en alcohol: (17658) 1M, Villa Batiruaná, 2018.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Dendrocolaptes picumnus

TREPADOR COLORADO / BLACK-BANDED WOODCREEPER /

ARAPAÇU-MEIO-BARRADO

● HÁBITAT: Selvas y bosques del noroeste o isletas de monte en el Chaco húmedo.

● DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta y Tucumán y en el este de Formosa.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en pedestal: (194) 1M, Concepción, 1911; (194) 1H, Iltico, 1910.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: El nombre en inglés en del Hoyo *et al.* (2019), es PALE-BILLED WOODCREEPER. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Xiphocolaptes major

TREPADOR GIGANTE / GREAT RUFIOUS WOODCREEPER / ARAPAÇU-DO-CAMPO

● HÁBITAT: Bordes de selvas y bosques de tipo chaqueño.

● DISTRIBUCIÓN: En el norte del país exceptuando la zona cordillerana, hasta Catamarca, norte de Córdoba y de Santa Fe.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch y Ortiz (2006) Chulca, Trancas (Trancas), El Sunchal (Burruyacú); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Tapia, Trancas); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal

(Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Chulca, Trancas (Trancas), El Sunchal (Burruyacú), La Florida (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (64 y 316) 1H y 1M, Tapia, 1946; (197) 1? La Ramada, 1946; (325) 1M, El Sunchal, 1946; (363, 850) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (643) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (668) 1M, Los Nogales, 1946; (1101) 1H, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1170, 1179) 2H, El Saladillo, 1946; (1425) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (1643) 1H, La Ciénaga, 1903; (1841) 1M, sin localidad, 1927; (1842) 1M, sin localidad, 1929; (1844) 1H, Santa Bárbara, 1927; (1845) 1H, sin localidad, 1900; (1850) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (2051) 1?, Los Gómez, 1939; (2056) 1M, Trancas, 1946; (2068) 1H, Dpto. Trancas, sin localidad, 1946; (2224) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (4384) 1H, Raco, 1946; (4600) 1?, S/Dpto., El Cadillal, 1947; (5062) 1M, Tafí del Valle, 1947; (5191) 1M, El Infiernillo, 1947; (5476 y 5478) 1M y 1H, Tafí del Valle, 1948; (5494) 1M, El Infiernillo, 1948; (8216) 1H, San Javier, 1953; (8828) 1M, Dpto. Tafí Viejo, El Cadillal, 1954; (8993 y 8994) 1M y 1?, La Angostura, 1954; (8995) 1M, Las Juntas, 1954; (10496) 1H, Cerro del Campo, 1957; (10623) 1H, Rearte, 1957; (10644) 1H, Rearte, 1957; (10724) 1M, Quebrada las Cuevas, 1957; (10921) 1H, Las Cuevas, 1957; (11394) 1M, Estancia Pozo Cavao, 1959; (12326) 1M, San Pedro de Colalao, 1962; (12327) 1H, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1961.

- en pedestal: (193) 1M-1H, Concepción, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Campylorhamphus trochilirostris

PICAPALO COLORADO / RED-BILLED SCYTHEBILL / ARAPAÇU-BEIJÁ-FLOR

- HÁBITAT: Bosque chaqueño y selvas en galerías.

- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona cordillerana, hasta norte de San Juan y Córdoba, sur de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Corrientes.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alderete y Capllonch (2010) (Simoca); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), La Cocha (La Cocha), Garmendia, Río Urueña, 7 de Abril (Burruyacú); Mamaní, Quiroga, Moreno Ten y Aveldaño (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (741, 768) 2M, El Guardamonte, 1946.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Drymornis bridgesii

CHINCHERO GRANDE / SCIMITAR-BILLED WOODCREEPER /
ARAPAÇU-DO-ESPINILHO

- HÁBITAT: Bosques de tipo chaqueño, arboledas y espinal.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana y a Misiones hasta el este de Neuquén, norte de Río Negro, sur de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch y Ortiz (2006) Los Puestos, El Guardamonte (Leales), Monteagudo (Simoca), San Pedro de Colalao, El Cadillal, Choromoro (Trancas); Alderete y Capllonch (2010) (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Los Puestos, El Guardamonte (Leales), Monteagudo (Simoca), San Pedro de Colalao, Chulca, Ticucho, Choromoro (Trancas), 7 de Abril (Burruyacú); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (229) 1H, Los Romanos, 1946; (762, 795, 798, 834 y 767, 785, 796) 4M y 3H, El Guardamonte, 1946; (766) 1M, sin localidad, sin fecha; (810 y 811, 813, 814) 1M y 3H, Los Herrera, 1946; (887 y 893) 1H y 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1861) 1M, sin localidad, 1928; (1864 y 1866) 1M y 1H, Tapia, 1901; (1908) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2024) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (2058) 1H, Trancas, 1946; (2067) 1H, Dpto. Trancas, sin localidad, 1946; (2071) 1?, Los Gómez, 1939; (2560) 1H, El Saladillo, 1946; (2609) 1H, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1946; (4599) 1M, Los Herrera, 5 km al SO de la Estación El Guardamonte, 1947; (5361) 1H, El Guardamonte, 1948; (9512) 1H, Laguna Jangallo, 1955; (10395) 1M, Las Tipas, 1956; (10885) 1H, San Pedro de Colalao, Agua Rosada, sin fecha; (10951) 1M, La Higuera, 1958; (10956) 1?, Agua Rosada, 1958.
 - en pedestal: (197) 1M-1H, Toro Muerto, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Lepidocolaptes angustirostris

CHINCHERO CHICO / NARROW-BILLED WOODCREEPER / ARAPAÇU-DE-CERRADO

- HÁBITAT: Selvas, selvas en galerías, bosques chaqueños, espinal y plantaciones.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la zona cordillerana, hasta el este de Mendoza y La Pampa, sur de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También en el extremo norte de Buenos Aires.

- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro, Brandán, Antelo y Marigliano (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán (2005) Cañada Honda y Timbó Nuevo (Burruyacú); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero, Brandán y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Ampimpa, El Molle (Tafí del Valle), Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) (Simoca, Leales, Trancas, Burruyacú, Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ampimpa, El Molle, Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- **MATERIAL ESTUDIADO:**

- en piel: (66, 647 y 318, 1571) 2H y 2M, Tapia, 1946; (157, 1132) 2M, Las Cañitas, 1946; (159, 160) 2M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (191) 1M, Los Gómez, 1946; (338) 1M, El Sunchal, 1946; (535) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (621, 1925, 2469, 2473 y 1061 y 2216, 2218) 4M y 1? y 2H, San Pedro de Colalao, 1946; (739 y 750) 1M y 1H, El Guardamonte, 1946; (805 y 806) 1? y 1M, Los Herrera, 1946; (892) 1?, sin localidad, 1928; (916, 1131, 1166, 1382, 1387, 2304, 2308, 2418, 2426 y 937, 1030, 1031, 1037, 1134, 1181, 1329, 1383, 1651, 2269, 2286, 2317, 2326, 2346, 2422) 10M y 14H, El Saladillo, 1946; (923) 1M, El Saladillo, 1944; (950) 1H, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (996) 1M, El Timbó, 1946; (1004, 1423, 1427 y 1025, 1550) 3M y 2H, Leales, 1946; (1466) 1M, Vipos, 1999; (1467) 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1902; (1822) 1M, sin localidad, 1901; (1829) 1M, sin localidad, 1902; (2054) 1M, Dpto. Trancas, sin localidad, 1946; (2600, 2601) 2H, Dpto. Leales, Río Colorado, 1946; (2733 y 2737) 1H y 1M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (2763 y 3254 y 3262) 1H y 1 M y 1?, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (3039) 1M, Cumbre del cerro Tafí, 1946; (4424) 1?, San Felipe, 1947; (4536) 1H, Los Herrera, 1947; (4537) 1H, El Timbó, 1947; (4805) 1H, Acherai, 1947; (6092) 1M, S/Dpto., El Cadillal, 1947; (6345) 1H, Las Tacanas, 1950; (6363) 1H, San Pedro de Colalao, 1950; (7744) 1H, Tapia, 1930; (8328) 1H, El Guardamonte, 1953; (8859) 1M, Dpto. Tafí Viejo, El Cadillal, 1954; (8973) 1H, Río Chilca, 1954; (8985 y 8987) 1H y 1M, La Angostura, 1954; (9338) 1M, Las Tacanas, 1955; (9514) 1H, Bajo Grande, 1955; (9647 y 9648) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, 1955; (10491) 1H, Cerro del Campo,

1957; (10607 y 10624) 1M y 1H, Rearte Norte, 1957; (11395, 11396) 1M, Estancia Pozo Cavao, 1959; (11396) 1M, Estancia Pozo Cavao, 1959; (17197 y 17198) 1H y 1M, El Vizcacheral, 1993.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: (191) Material Tipo colectado por S. A. Pierotti. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Xenops rutilans

PICOLEZNA ROJIZO / STREAKED XENOPS / BICO-VIRADO-CARIJÓ

- HÁBITAT: Tallos delgados en distintos estratos de las selvas del noroeste y Misiones.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca hasta los 1500 m snm y en Misiones y noreste de Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Capllonch *et al.* (2015) Dique La Aguadita (Burrucacú), Taficillo (Tafí Viejo).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (901) 1H, Taficillo, 1946.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Ochetorhynchus ruficaudus

BANDURRITA PICO RECTO / STRAIGHT-BILLED EARTHCREEPER

- HÁBITAT: Estepas alto y bajoandinas en laderas rocosas con matorrales dispersos, a veces cerca de cursos de agua.
- DISTRIBUCIÓN: Entre 3000 y 4000 m snm desde el norte de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán hasta el sur de Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) Cerro Muñoz (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1578) 1?, sin localidad, sin fecha; (1583) 1M, Cerro Muñoz, 1905.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010), como: *Upucerthia ruficauda*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Tarphonomus certhioides

BANDURRITA CHAQUEÑA / CHACO EARTHCREEPER / JOÃO-CHANQUENO

- **HÁBITAT:** Bosques, sabanas y áreas serranas de tipo chaqueño.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde este de Jujuy y Salta por Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes hasta Entre Ríos y Santa Fe, oeste de San Luis, Córdoba, La Pampa y suroeste de Buenos Aires, llegando hasta el noreste de Río Negro.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch y Ortiz (2006) Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca), Amaicha del valle (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) Ticucho (Trancas); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle), La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Ortiz y Aróz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Las Lajitas, Garmendia, 7 de Abril (Burrucacú), Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca), Amaicha del Valle, Colalao del Valle, El Remate, El Pichao, El Bañado (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (757) 1M, El Guardamonte, 1946; (1587) 1M, Los Gómez, 1915; (1589) 1M, Tapia, 1904; (1608) 1M, Nueva España, 1946; (11387) 1?, Amaicha del Valle, Tío Punco, 1959; (12558) 1H, Agua Rosada, 1963; (12559) 1M, San Pedro de Colalao, 1962.
 - en pedestal: (174) 1M-1H, Toro Muerto, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010), como: *Upucerthia certhioides*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Furnarius rufus

HORNERO / RUFIOUS HORNERO / JOÃO-DE-BARRO

- **HÁBITAT:** Diversos ambientes, plantaciones y poblados.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país hasta Río Negro y norte de Chubut.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo) y San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo) y San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006)

La Ciénaga (Tafí del Valle); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de la Ciénaga (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) Simoca (Simoca), Horco Molle (Yerba Buena), Leales (Leales), Burruyacú (Burruyacú), Trancas (Trancas), (Cruz Alta), Tafí Viejo (Tafí Viejo), Tafí del Valle (Tafí del Valle); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Soria *et al.* (2010) Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena); Echevarria, Lobo Allende, Juri y Chani (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) La Ciénaga (Tafí Viejo), Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández, Navarro, Marigliano y Antelo (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (237) 1M, Los Gómez, 1946; (299 y 2990) 1? y 1H, La Ramada, 1946; (350) 1M, Mariño, 1946; (564) 1H, Zárate Norte, 1946; (984) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (1106) 1M, La Reducción, 1946; (1615) 1H, sin localidad, 1901; (1619) 1M, sin localidad, 1900; (1629) 1M, sin localidad, 1898; (1984) 1H, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (2099) 1M, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (2019, 2368, 2546 y 2409) 3M y 1H, El Saladillo, 1946; (4809) 1M, Acherál, 1947; (6333) 1H, San Pedro de Colalao, Puesto El Alto, 1950; (8479) 1H, Laguna Calimayo, La Reducción, 1953; (8996) 1H, Río Chilca, 1954; (9195 y 9199) 1H y 1M, Dique Tacanas, 1954; (9847) 1H, La Angostura, 1956; (10441) 1H, Río Chilca, 1957; (17363) 1?, Colombres, sin fecha.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Furnarius cristatus

HORNERITO COPETÓN / CRESTED HORNERO

● HÁBITAT: Bosque chaqueño.

● DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando zona montañosa del oeste y la Mesopotamia, hasta el este de Mendoza, norte de San Luis, oeste de Córdoba y norte de Santa Fe.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2013a) Garmendia, 7 de Abril (Burrucacú), Vipos (Trancas), Los Gómez (Leales).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1620) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1915; (1624 y 1630) 1H y 1M, Santa Ana, 1902; (1625) 1H, Los Gómez, 1915; (1626) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1914; (1628) 1M, San Carlos, 1914.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phleocryptes melanops

JUNQUERO / WREN-LIKE RUSHBIRD / BATE-BICO

- HÁBITAT: Juncuales, totorales y esteros.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el país.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Arroyo Mista y Río Colorado (Leales), márgenes del Río Salí (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca), Río Colorado y márgenes del Río Salí (S/Dpto.), San Miguel de Tucumán (Capital); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1604) 1H, Laguna de Malvinas, 1903; (1607) 1M, Laguna de Malvinas, Km 80, 1903; (8331, 8333, 8334) 3M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1953.
 - en pedestal: (264) 1M-1H, Dpto. Chicligasta, Santa Cruz, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Upucerthia dumetaria

BANDURRITA COMÚN / SCALE-THROATED EARTHCREEPER

- HÁBITAT: Estepas altoandinas y patagónicas, áreas altoserranas y abiertas del bosque araucano, matorrales y arbustales.
- DISTRIBUCIÓN: Hasta los 3000 m snm desde Jujuy y Salta por Tucumán, Catamarca y La Rioja, Córdoba, San Juan y Mendoza, San Luis, La Pampa y Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. En otoño migra hacia el norte hasta Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) entre El Infiernillo y Ampimpa, Tafí del Valle (Tafí del Valle); Capllonch (2007b) Tafí del Valle, El Infiernillo, Ampimpa (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Huaca Huasi (Tafí Viejo) y El Molle (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) entre El Infiernillo y Ampimpa, en Tafí del Valle (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1570) 1H, sin localidad, 1899; (1571, 1573) 2M, sin localidad, 1900; (1572) 1M, Cerro de Tucumán, 1929; (5451) 1H, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1948.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Upucerthia validirostris

BANDURRITA ANDINA / BUFF-BREASTED EARTHCREEPER

- HÁBITAT: Estepas altoandinas y áreas altoserranas con suelos rocosos en declive, con matorral y pastizal disperso.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta, por el oeste desde Jujuy hasta el norte de Neuquén y en las Sierras de Córdoba y San Luis.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Tafí del Valle, La Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch (2007b) Tafí del Valle, El Infiernillo (Tafí del Valle), La Ciénaga (Tafí Viejo); Moschione (2007) Parque Provincial Cumbres Calchaquies (Tafí del Valle/ Trancas), El Infiernillo (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo) y El Molle (Tafí del Valle); Areta y Pearman (2013) El Infiernillo (Tafí del Valle), Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo, Tafí del Valle, El Pichao (Tafí del Valle), Huaca Huasi, La Ciénaga (Tafí Viejo).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1575 y 1576) 1H y 1M, Dpto. Lules, Cumbres de Mala Mala, 1904; (2044, 2082, y 2049) 2M y 1H, El Infiernillo, 1946; (4543 y 5178 y 5219, 5220, 5226, 5229) 1? y 1H y 4M, El Infiernillo, 1947; (4544) 1H, Valle de Tafí, 1947; (5344 y 5345) 1H y 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1948; (5411, 5421, 5498 y 5496, 5503) 3M y 2H, El Infiernillo, 1948; (8974) 1M, entre el Infiernillo y Amaicha, 1955.
 - en pedestal: (173) 1M-1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: Especie endémica. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Cinclodes fuscus

REMOLINERA COMÚN / BUFF-WINGED CINCLODES / PEDREIRO-DOS-ANDES

- **HÁBITAT:** Arroyos y lagunas andinos y patagónicos.
- **DISTRIBUCIÓN:** Entre los 2000 y 4500 m snm desde Jujuy y Salta por Tucumán, Catamarca, Córdoba y norte de San Luis y por el oeste de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut hasta Tierra del Fuego. Posiblemente en Islas Malvinas. La raza austral migra al norte hasta el norte de Santiago del Estero, sur de Chaco y Corrientes.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Rumboll, Capllonch, Lobo y Punta (2005) Río Chulca (Trancas); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande, Huaca Huasi (Tafí Viejo), El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) márgenes del río Salí (S/Dpto), El Infiernillo, Quilmes (Tafí del Valle), Huaca-Huasi, La Ciénaga, El Siambón, Raco (Tafí Viejo), Río Los Sosa (Monteros), Río Chulca, San Pedro de Colalao (Trancas), Arroyo Mista (Leales); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (576, 1265, 1266) 3H, San Pedro de Colalao, 1946; (610) 1M, Tapia, 1946; (1635 y 1646) 1M y 1H, sin localidad, 1900; (1636) 1M, sin localidad, 1901; (1640 y 1644) 1M y 1H, sin localidad, 1929; (5064 y 5211) 1H y 1M, El Infiernillo, 1947; (5456 y 5467) 1H y 1M, Tafí del Valle, 1948; (2050) 1H, El Infiernillo, 1946; (5641) 1M, El Infiernillo, 1949; (15044) 1H, El Infiernillo, Quebrada, 1987; (15080) 1H, El Infiernillo, 1987; (10723) 1H, Quebrada las Cuevas, 1957.
 - en pedestal: (178) 1M, Las Pavas, 1909; (178) 1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.
 - en alcohol: (17500) 1?, La Junta, 1999; (17613) 1?, El Potrerillo, 2009.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) el nombre en inglés es: BAR-WINGED CINCLODES. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Cinclodes comechingonus

REMOLINERA SERRANA / CORDOBA CINCLODES

- **HÁBITAT:** Arroyos y pedregales altoserranos con pastizal disperso.
- **DISTRIBUCIÓN:** En sierras altas de Córdoba y San Luis. En otoño/ invierno migra al norte ocupando el sur de Salta, este de Tucumán, Santiago del Estero, oeste de Chaco y Formosa.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch y Ortiz (2006) Arroyo Mista (Leales); Moschione (2007) Río Los Sosa (Monteros/ Tafí del Valle), Reserva Natural La An-

gostura (Tafí del Valle), Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales), márgenes del río Salí (S/Dpto).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (520) 1?, Río Salí, 1946.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: Especie endémica. En Narosky e Yzurieta (2010) el nombre en inglés es: SIERRAN CINCLODES. UICN: LC; MAyDS y AA: VU.

Cinclodes albiventris

REMOLINERA ACANELADA / CREAM-WINGED CINCLODES

- HÁBITAT: Arroyitos y humedales altoandinos con vegetación y capas de turba subyacente.
- DISTRIBUCIÓN: Noroeste de Argentina desde Jujuy a La Rioja pasando por Tucumán y Catamarca.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) El Infiernillo (Tafí del Valle), Río Los Sosa (Monteros), El Siambón, Raco, Huaca Huasi, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), San Pedro de Colalao (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Chulca (Trancas), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/ Dpto.); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle), La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Salvador (2015) El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2046, 2084) 2M, El Infiernillo, 1946; (4546) 1H, Valle de Tafí, 1949; (5056) 1H, Tafí del Valle, 1947; (5193) 1M, El Infiernillo, 1947; (5419) 1H, El Infiernillo, 1948; (7976) 1M, Tafí del Valle, 1952; (8011) 1M, Cerro Negro, sin fecha.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como: raza norteña de *Cinclodes fuscus*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Cinclodes atacamensis

REMOLINERA CASTAÑA / WHITE-WINGED CINCLODES

- HÁBITAT: Arroyos andinos y altoserranos con pastizal y arbustal disperso.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre los 2000 y 4000 m snm en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza y en las serranías de Córdoba y San Luis.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Río Cochuna (Río Chico), La Ciénaga (Tafí del Valle), Choromoro (Trancas), Río Los Sosa, Pueblo Viejo (Monteros), El Siambón, Raco (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Pueblo Viejo, Río Los Sosa (Monteros), Río Cochuna (Chicligasta), Choromoro, San Pedro de Colalao (Trancas); Echevarria, Marano, Chani y Cocimano (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) La Angostura, Tafí del Valle (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande, Huaca Huasi (Tafí Viejo), El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Río Cochuna (Chicligasta), La Ciénaga (Tafí del Valle), Pueblo Viejo, Río Los Sosa (Monteros), Chulca, Choromoro (Trancas); Salvador y Di Giacomo (2014) Tafí del Valle (Tafí del Valle); Salvador (2015) El Infiernillo, 3000 m snm (Tafí del Valle); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1633) 1H, La Ciénaga, 1903; (1634) 1?, Tafí del Valle, 1901; (1647) 1M, sin localidad, 1930; (5431) 1H, Tafí del Valle, 1948; (5445) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1948; (5503) 1H, El Infiernillo, 1948; (15043) 1M, El Infiernillo, 1987; (17044) 1M, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.
 - en pedestal: (177) 1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Syndactyla rufosuperciliata

TICOTICO COMÚN / BUFF-BROWED FOLIAGE-GLEANER / TREPADOR-QUIETE

- HÁBITAT: Estratos bajos y medios en bosques húmedos, bosques en galería y selvas.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Hasta 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y norte de La Rioja y en el este de Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco y Entre Ríos hasta el norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Aguas Chiquitas, El Sunchal (Burruyacú), Horco Molle (Yerba Buena), la Florida (Monteros), Cochuna (Chicligasta); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) Ticucho (Trancas), Piedras Coloradas, Playa Larga, El Indio, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena), Cochuna (Chicligasta), Parque Bio-

lógico Sierra de San Javier, El Cadillal (S/Dpto.), San Ignacio (La Cocha), Taficillo, Cuesta de Chasquivil, Reserva Aguas Chiquitas (Tafí Viejo); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Reserva Aguas Chiquitas, El Sunchal (Burruyacú), Ticucho, Vipos (Trancas), La Florida (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena), Cochuna, Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (132 y 2616) 1M y 1H, Las Cañitas, 1946; (326, 335) 2H, El Sunchal, 1946; (382, 392, 583) 3H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (644, 645, 925) 3M, Los Nogales, 1946; (865) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (895) 1M, Quebrada de Lules, 1946; (914) 1H, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1039, 1128, 1360, 1361, 1378 y 1162, 1641, 2249, 2358 y 1381, 2504) 5H y 4M y 2?, El Saladillo, 1946; (1752) 1M, Agua La Tipa, 1899; (1753) 1H, sin localidad, 1929; (1754) 1M, Taficillo, 1929; (1756) 1H, Cerro de Tucumán, 1900; (2028, 2274 y 2041) 2M y 1H, Yerba Buena, 1946; (2044) 1?, Dpto. Río Chico, Monte Bello, 1946; (2076) 1M, El Infiernillo, 1946; (2207) 1H, Cerro San Javier, 1954; (3253) 1M, Cumbres de Tafí, 1946; (3485) 1M, Cerros de Tafí, 1947; (4532) 1H, El Timbó, 1947; (6593 y 6612) 1M y 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (7144) 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (8842 y 9206) 1? y 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (10589, 10592 y 10615) 2M y 1H, Rearte, 1957; (10626) 1M, Rearte Norte, 1957.
- en pedestal: (190) 1M-1H, Concepción, 1909.
- en alcohol: (17659, 17661 y 17660) 2? y 1H, Villa Batirua, 2018.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Leptasthenura fuliginiceps

COLUDITO CANELA / BROWN-CAPPED TIT-SPINETAIL

- HÁBITAT: Barrancas, matorrales, quebradas y estepas arbustivas y altoserranas.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre los 1000 y 2500 m snm desde Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca hasta Mendoza y en las sierras de Córdoba y San Luis. En invierno se desplaza a menor altura.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Capllonch (2005) Reserva Privada

Las Queñoas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Horco Molle (Yerba Buena), Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Tapia, Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) Taficillo, La Ciénaga (Tafí Viejo); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle y Yerba Buena (Yerba Buena), Las Tipas, Vipos (Trancas), Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1597) 1H, La Ciénaga, 1903; (1610) 1H, Villa Nougues, 1903; (1613) 1M, sin localidad, 1903; (5472) 1H, Tafí del Valle, 1948; (6635) 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8053) 1H, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1952; (8487) 1M, Tafí del Valle, 1953; (9653) 1M, Chilca, 1955; (9703) 1H, Tafí del Valle, 1956; (10338) 1M, Dpto. Trancas, sin localidad, 1956; (10595 y 10596) 1M y 1H, Rearte Norte, 1957; (12349) 1M, San Pedro de Colalao, Cruz Cañada, 1962.

- en pedestal: (180) 1H, Iltico, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Leptasthenura platensis

COLUDITO COPETÓN / TUFTED TIT-SPINETAIL / RABUDINHO

- HÁBITAT: Bosques xerófitos, espinales, arbustales y estepas.

- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona montañosa hasta el noreste de Chubut.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Amaicha del Valle (Tafí del Valle), San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Amaicha del Valle (Tafí del Valle), San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (376) 1H, Mariño, 1946; (1649) 1M, sin localidad, 1904; (1662) 1M, sin localidad, 1900; (4790) 1H, Los Herrera, 1947.

- en pedestal: (719) 1M-1H, Concepción, 1929.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Leptasthenura aegithaloides

COLUDITO COLA NEGRA / PLAIN-MANTLED TIT-SPINETAIL

- **HÁBITAT:** En matorrales, arbustales, barrancas y aún en el suelo. En estepas altoandinas y patagónicas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. Entre los 2000 y 4000 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y en Mendoza, La Pampa y sur de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. En invierno, migran al centro del país hasta Córdoba, sur de Santa Fe y Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch y Ortiz (2006) entre El infiernillo y Ampimpa (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) entre El Infiernillo y Ampimpa (Tafí del Valle); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (5474) 1H, Tafí del Valle, 1948.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phacellodomus rufifrons

ESPINERO FRENTE ROJIZA / RUFIOUS-FRONTED THORNBIRD / JOÃO-DE-PAU

- **HÁBITAT:** Bosques de transición en el noroeste en arbustales y árboles bajos.
- **DISTRIBUCIÓN:** Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y posiblemente en el oeste de Formosa.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch y Ortiz (2006) Arroyo Mista (Leales), Aguas Chiquitas (Burruyacú); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Piedra Tendida (Burruyacú), Arroyo Mista (Leales); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales), Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Burruyacú (Burruyacú), Monteagudo (Simoca).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (100) 1M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (175) 1H, La Ramada, 1946; (527, 1014 y 550, 987) 2M y 2H, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (872, 1932 y 1933) 2M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (947) 1M, Río Salí, 1946; (961) 1M, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1122, 1368 y 1126) 2H y 1M, Las Cañitas, 1946; (1420) 1H, Dique La Aguadita, 1946; (1432) 1M, Leales, 1946; (1611 y 3223) 1M y 1H, El Timbó, 1946; (1766) 1H, sin localidad, 1898; (1768, 1769 y 1770) 2H

y 1M, sin localidad, 1928; (1954 y 1970, 2586) 1H y 2M, Tapia, 1946; (2266, 2325, 2347, 2505, 2508 y 2289 y 2500, 2545, 3129) 5H y 1? y 3M, El Saladillo, 1946; (6301 y 6329) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1950; (6321) 1M, Las Tacanas, 1952; (8482) 1M, Laguna Calimayo, La Reducción, 1953; (8607) 1M, Amaicha del Valle, 1954; (9017 y 9019) 1H y 1M, Río Chilca, 1954; (9120) 1H, Las Vertientes, 1954; (9121) 1H, Las Mesadas, 1954; (9146) 1M, Rearte Norte, 1954; (9637) 1H, Chilca, 1955; (10601) 1M, Rearte Norte, 1957; (10913) 1M, La Higuera, 1957; (12328) 1H, San Pedro de Colalao, Cruz Cañada, 1961; (17199) 1H, El Vizcacheral, 1993; (17343) 1?, Colombres, 2005; (17376) 1?, Colombres, 2004.

– en pedestal: (176) 1M-1H, Concepción, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phacellodomus striaticeps

ESPINERO ANDINO / STREAK-FRONTED THORNBIRD

- HÁBITAT: Puna, prepuna y quebradas altoserranas del noroeste.
- DISTRIBUCIÓN: Entre los 1500 y 3000 m snm en Jujuy, este de Salta y Tucumán, Catamarca y norte de La Rioja.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle); Capllonch (2007b) El Infiernillo, Ruta 307 Km 95 (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo, El Molle, El Pichao, en las Sierras de Quilmes (Tafí del Valle); Salvador (2015) El Infiernillo, 3000 m snm (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1767) 1H, Ñorco, 1904; (1796) 1H, Ñorco, 1905; (5453) 1M, Tafí del Valle, 1948; (9696) 1H, Tafí del Valle, 1956.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phacellodomus sibilatrix

ESPINERO CHICO / LITTLE THORNBIRD / TIO-TIO-PEQUENO

- HÁBITAT: Bosques, monte chaqueño y espinal, selvas y selva en galería.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones, hasta el norte de San Luis, centro de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Monteagudo (Simoca) y (Cruz Alta); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Leales (Leales), 7 de Abril (Burruyacú), (Cruz Alta), Horco Molle (Yerba Buena); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phacellodomus maculipectus

ESPINERO SERRANO / SPOT-BREASTED THORNBIRD

- HÁBITAT: Yungas y bordes de Yungas en áreas semiabiertas.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y norte de La Rioja.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) El Taficillo, Sierra de San Javier, Las Tipas, Chasquivil (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Taficillo, Chasquivil, Las Tipas (Tafí Viejo), Sierra de San Javier (Yerba Buena), Sierra de Medina (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (972) 1H, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1761) 1M, Cumbre La Hoyada, 1902; (1782) 1H, Villa Nougues, 1905; (1760) 1M, Villa Nougues, 1903.
 - en pedestal: (684) 2H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1918.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: como *P. striaticollis maculipectis* en De la Peña (1999). UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phacellodomus ruber

ESPINERO GRANDE / GREATER THORNBIRD / GRAVETEIRO

- HÁBITAT: Bosques, arboledas y arbustales cerca del agua, además en bordes de selva y en selvas en galería.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera y Misiones, hasta el sur de Tucumán, norte de Santiago del Estero, sur de Santa Fe y Entre Ríos y norte de Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Capllonch y Ortiz (2006) Ticucho (Trancas), Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca), Arroyo Mista (Leales), Yerba Buena, Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1772) 1M, sin localidad, 1904; (1773) 1H, sin localidad, 1901; (1774) 1M, sin localidad, 1906; (3233) 1M, El Saladillo, 1946; (4807) 1M, Acheral, 1947.
 - en pedestal: (175) 1M-1H, Gastona, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Anumbius annumbi

LEÑATERO / FIREWOOD-GATHERER / COCHICHO

- HÁBITAT: Sabanas, áreas rurales y poblados, en áreas abiertas con árboles aislados, cerca de pastos cortos.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera por el este de Catamarca, La Rioja, San Juan, sur de Misiones y Corrientes hasta el este de Neuquén, Río Negro y norte de Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch, Ortiz, Ruiz y Lobo Allende (2005) Abra Rica (Leales); Capllonch y Ortiz (2006) Finca Abra Rica (Leales), Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Coryphistera alaudina

CRESTUDO / LARK-LIKE BRUShRUNNER

- HÁBITAT: Bosques, áreas rurales y poblados, en ramajes tupidos.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones, desde Salta y Tucumán hasta Mendoza, centro de La Pampa y suroeste de Buenos Aires y desde Formosa, sur de Corrientes hasta sur de Entre Ríos y Santa Fe.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Valle de Trancas (Trancas), Los Puestos, El Guardamonte, Los Gómez (Leales), Monteagudo (Simoca); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Valle de Trancas (Trancas), Los Puestos, El Guardamonte, Los Gómez, Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca), Garmendia, 7 de Abril (Burrucuyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (264) 1H, Los Gómez, 1946; (286, 1958, 1966, 2619 y 1589, 1590) 4M y 2H, Tapia, 1946; (378) 1H, Mariño, 1946; (525) 1H, Zárate Norte, 1946; (632 y 2243, 2479) 1M y 2H, San Pedro de Colalao, 1946; (807) 1M, El Guardamonte, 1946; (1016) 1H, Quebrada de Lules, 1946; (1781 y 1784) 1H y 1M, sin localidad, 1900; (1783) 1M, sin localidad, 1898; (1786) 1H, sin localidad, 1903; (2378 y 2388, 2755) 1M y 2H, El Saladillo, 1946; (8783) 1M, El Guardamonte, 1954; (9456) 1M, San Pedro de Colalao, 1955; (10442) 1M, Dos Pozos, 1957; (10962) 1M, San Pedro de Colalao, Agua Rosada, 1958.
 - en pedestal: (200) 1M-1H, Concepción, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Asthenes dorbignyi

CANASTERO ROJIZO / CREAMY-BREASTED CANASTERO

- **HÁBITAT:** Puna, matorrales y estepas arbustivas en el oeste.
- **DISTRIBUCIÓN:** Entre los 2500 y 4000 m snm desde Jujuy, por el oeste, hasta el norte de Mendoza y noroeste de San Luis.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch y Ortiz (2006) El Remate, Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Dique El Cadillal (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres Calchaquíes (S/Dpto.); Alderete y Capllonch (2010) Ticucho (Trancas), El Infiernillo, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Soria *et al.* (2010) El Remate, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Remate, Amaicha del Valle, El Pichao (Tafí del Valle), Dique El Cadillal (Tafí Viejo); Turienzo y Di Iorio (2013) Cuesta de los Cardones (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1669) 1M, Colalao del Valle, 1916; (1699) 1M, sin localidad, 1903; (11139) 1?, Amaicha del Valle, 1958; (17334, 17340) 2?, Amaicha del Valle, El Remate, 2005.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Asthenes baeri

CANASTERO CHAQUEÑO / SHORT-BILLED CANASTERO / LENHEIRO

- HÁBITAT: Bosques, estepas arbustivas, monte y espinal.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones, hasta el este de Neuquén y norte de Río Negro, sur de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Probablemente en zona costera de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Monteagudo (Simoca), Los Puestos (Leales), Ticucho (Trancas), Río Chico (Río Chico); Alderete y Capllonch (2010) Ticucho (Trancas), Los Puestos (Leales); Capllonch *et al.* (2011) Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca), Garmendia, 7 de Abril (Burruyacú), Los Puestos (Leales), Río Chico (Río Chico).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (136) 1M, Las Cañitas, 1946; (4597) 1M, Los Herrera, 5 km al SO de la Estación El Guardamonte, 1947; (754) 1H, El Guardamonte, 1946; (853 y 1937) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1674 y 1686) 1H y 1M, sin localidad, 1901; (1685) 1M, Medinas, 1914; (1687) 1M, sin localidad, 1908; (1721) 1H, Los Gómez, 1915; (5301) 1M, Cerros de Tafí, 1948; (2034) 1H, El Saladillo, 1946.
 - en pedestal: (383) 1M-1H, Concepción, 1918.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Asthenes maculicauda

ESPARTILLERO ESTRIADO / SCRIBBLE-TAILED CANASTERO

- HÁBITAT: Estepas y pastizales altoandinos en el noroeste.
- DISTRIBUCIÓN: Jujuy, Salta, oeste de Tucumán y Catamarca.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz, Novillo, Ferro, Ovejero y Capllonch (2005) Cumbres de Tafí (S/Dpto.), Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.), Altiplanicie de Hua-

ca-Huasi (S/Dpto.), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Mula Muerta- Cumbres Calchaquíes (S/Dpto.); Moschione (2007) Parque Provincial Los Ñuñorcós y Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/ Monteros), Parque Provincial Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle/ Trancas), El Infiernillo (Tafí del Valle), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Mula Muerta (Cumbres Calchaquíes), El Infiernillo (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: IC.

Asthenes sclateri

ESPARTILLERO SERRANO / PUNA CANASTERO

- HÁBITAT: Pastizales altoandinos y altoserranos con arbustos dispersos.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y norte de Mendoza y en las sierras de Córdoba y San Luis.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) El Infiernillo, La Ciénaga (Tafí del Valle), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Capllonch (2007b) El Infiernillo (Tafí del Valle), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2010) Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle), La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo, Sierra de Quilmes (Tafí del Valle), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), La Ciénaga (Tafí Viejo).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (5234) 1M, El Infiernillo, 1947; (5201) 1M, El Infiernillo, 1947; (11267) 1M, San Pedro de Colalao, Alto La Totorá, 1958; (1725) 1M, La Ciénaga, 1903; (1726) 1M, sin localidad, 1903; (1741) 1M, Villa Nougues, 1903; (1794) 1M, Villa Nougues, 1901; (1795) 1?, La Ciénaga, 1903.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA. En del Hoyo *et al.* (2019) figura como *Asthenes wyatti*. En la COLFML se encuentran depositados los siguientes ejemplares determinados como *Asthenes anthoides*: (especie del sur del país, que podrían estar mal determinados y pertenecer a *A. sclateri*)
 - en piel: (2081) 1M, El Infiernillo, 1946; (5186) 1H, El Infiernillo, 1947.

- en pedestal: (182) 1M, Dpto. Tañ del Valle, Aconquija, 1910; (682) 1M, Dpto. Tañ del Valle, Aconquija, 1918.

Asthenes modesta

CANASTERO PÁLIDO / CORDILLERAN CANASTERO

- **HÁBITAT:** Estepas altoandinas, patagónicas y altoserranas, matorrales y arbustales con o sin pastizales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Entre los 2500 a 3500 m snm, en Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja por el este de San Juan, Mendoza y la Pampa hasta el sur de Buenos Aires y Tierra del Fuego. En otoño migra hacia el noreste, sur de Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tañ Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Cumbres de Mala Mala (Lules), Cumbres de Tañ, El Infiernillo, Huaca Huasi (Tañ del Valle), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Capllonch (2007b) Cumbres de Mala Mala y de Tañ, El Infiernillo, Tañ del Valle (Tañ del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Infiernillo (Tañ del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande, Huaca Huasi (Tañ Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres de Mala-Mala (Lules), Sierras de Quilmes, Cumbres de Tañ, El Infiernillo (Tañ del Valle), Parque Nacional Campos de Los Alisos (Chicligasta), Huaca-Huasi (Tañ Viejo).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1667) 1H, Cuesta de Mala Mala, 1901; (1682) 1M, Dpto. Tañ del Valle, Cumbres de Mala Mala, 1904; (1688) 1H, Lagunas, Cerro de la Laguna, 1903; (2053, 2087 y 2083) 2H y 1?, El Infiernillo, 1946; (4539, 4549 y 5210, 5225) 2H y 2M, El Infiernillo, 1947; (4545) 1H, El Infiernillo, Valles de Tañ, 1947; (17339) 1?, La Ciénaga, 2005; (17469) 1?, Huaca Huasi, 2005.
 - en pedestal: (181) 1M-1H, Dpto. Tañ del Valle, Aconquija, 1912.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Asthenes pyrrholeuca

CANASTERO COLUDO / SHARP-BILLED CANASTERO

- **HÁBITAT:** Estepas arbustivas, matorrales, arbustales con vegetación palustre y áreas abiertas del Bosque Araucano. En migración asociados a humedales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde San Juan este de La Rioja, oeste de Córdoba, La Pampa y sur de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. En otoño migra al norte hasta Tucumán, Salta, Catamarca, Formosa y Corrientes. Las poblaciones del centro del país son residentes.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca), Río Chico (Río Chico), Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) Monteagudo (Simoca), Arroyo Mista (Leales), El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2015) Río Santa María, Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Río Chico (Río Chico), Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca), bañados de Amaicha, sobre el Río Santa María (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1678 y 1684, 1702) 1H y 2M, sin localidad, 1900; (1697) 1H, Ñorco, 1898; (1701) 1H, sin localidad, 1905; (10127) 1M, Bajo Grande, 1956; (17263) 1?, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 2016; (17341) 1H, Arroyo Mista, 2005.
 - en pedestal: (185) 1M-1H, Monte Toro, 1910; (686) 1M, Concepción, 1918.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: (1697) Material Tipo colectado por M. I. Lillo. En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés LESSER CANASTERO. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Asthenes heterura

CANASTERO ANDINO / MAQUIS CANASTERO

- HÁBITAT: Matorrales áridos y semiáridos de montaña con bosques bajos y abiertos.
- DISTRIBUCIÓN: En el noroeste del país, en Jujuy, Salta y Tucumán.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Pearman (2001) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: NT; MAyDS y AA: VU.

Cranioleuca pyrrhophia

CURUTIÉ BLANCO / STRIPE-CROWNED SPINETAIL / ARREBION

- HÁBITAT: Ramas y follaje denso en bosques de tipo chaqueño, espinal y ecotonos de bosques húmedos y selva en galería.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones hasta este de Neuquén y Río Negro, sur oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo);

Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Rumboll *et al.* (2005) Los Puestos (Leales); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Ticucho y Tapia (Trancas), Monteagudo (Simoca) y Garmendia (Burruyacú); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alderete y Capllonch (2010) Ticucho (Trancas), Colalao del Valle (Tafí del Valle), Agua Salada (Leales), Monteagudo (Simoca); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho, Tapia, Vipos (Trancas), Monteagudo (Simoca), Garmendia (Burruyacú), El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (268) 1M, Los Romanos, 1946; (496 y 878) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (608, 1957) 2M, Tapia, 1946; (908) 1H, Dpto. Simoca, Monteagudo, 1946; (949) 1M, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1605) 1H, Tapia, 1902; (1735) 1M, Ñorco, 1904; (1737) 1H, Tapia, 1901; (2585) 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (7740) 1M, sin localidad, 1929; (9654, 9655) 2M, Chilca, 1955; (10340, 10344) 2M, Dpto. Trancas, sin localidad, 1956; (10347) 1M, Dpto. Trancas, sin localidad, 1946; (11365) 1M, San Fernando, 1959; (17195) 1M, El Vizcacheral, 1993.

- en pedestal: (184) 1H, Toro Muerto, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pseudasthenes steinbachi

CANASTERO CASTAÑO / STEINBACH'S CANASTERO

- HÁBITAT: Estepas altoandinas y arbustivas, matorrales en el oeste.

- DISTRIBUCIÓN: Entre los 2000 y 3000 m snm, desde el sur de Jujuy, Salta y Tucumán hasta el norte de Mendoza y oeste de San Luis, también observado en Neuquén y oeste de Río Negro.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) El Remate, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Moschione (2007) Ruinas de Quilmes (Tafí del Valle), Reserva Natural La Angostura (Tafí del Valle), Parque Provincial Cumbres Calchaquies (Tafí del Valle/ Trancas); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Remate (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (5466) 1H, Tafí del Valle, 1948.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: Especie endémica. En Narosky e Yzurieta (2010) como: *Asthenes steinbachi* y en inglés CHESTNUT CANASTERO. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pseudoseisura lophotes

CACHOLOTE CASTAÑO / BROWN CACHOLOTE / COPERETE

- HÁBITAT: Sabanas, áreas rurales y arboledas en bosques chaqueños y espinales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones, hasta Neuquén, norte de Río Negro, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Monteagudo (Simoca), 7 de Abril (Burruyacú), Finca Abra Rica (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), 7 de Abril, Garmendia (Burruyacú), Abra Rica, Leales (Leales).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1806) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1928; (1808) 1M, S/Dpto., Río Colorado, 1907; (1810) 1M, Campo Azul, 1915; (8320) 1M, El Guardamonte, 1953; (17610) 1?, Campo Grande, Las Calandritas, 1996.
 - en pedestal: (192) 1M-1H, Toro Muerto, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pseudoseisura gutturalis

CACHOLOTE PARDO / WHITE-THROATED CACHOLOTE

- HÁBITAT: Estepas arbustivas y patagónicas, matorrales y arbustales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde Jujuy, oeste de Salta y Tucumán, por la zona montañosa, hasta Neuquén, donde se extiende al este, hasta el sur de La Pampa y Buenos Aires, ocupando toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Bañado, Quilmes, Fuerte Quemado, El Pichao (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (9783) 1M, Amaicha del Valle, 1956; (9784, 9786 y 9785 y 9787) 2H y 1M y 1?, camino entre Amaicha y Santa María, 1956; (11133, 11239 y 11134, 11136) 2H y 2M, Amaicha del Valle, 1958.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: Especie endémica. (9783) Material Tipo colectado por C.C. Olrog. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Certhiaxis cinnamomeus

CURUTIÉ COLORADO / YELLOW-CHINNED SPINETAIL / CURUTIÉ

- **HÁBITAT:** Humedales con mucha vegetación, pajonales, juncales y esteros.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa por el este de Tucumán hasta el noreste de Córdoba y centro este de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch *et al.* (2005) Arroyo Mista (Leales); Capllonch y Ortiz (2006) Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (17379) 1?, Arroyo Mista, 2004.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) como *Certhiaxis cinnamomea* y en inglés como YELLOW-THROATED SPINETAIL. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Schoeniophylax phryganophilus

CHOTOY / CHOTOY SPINETAIL / BICHOITA

- **HÁBITAT:** Bordes de bosques y arbustos aislados en sabanas, áreas rurales y espinales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la cordillera, hasta Córdoba, este de Neuquén, norte de Río Negro y sur de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch y Ortiz (2006) Las Talas, Bella Vista (Leales).
- **MATERIAL ESTUDIADO:** sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Synallaxis albescens

PIJUÍ COLA PARDA / PALE-BREASTED SPINETAIL / UÍ-PI

- **HÁBITAT:** Bosques en sabanas y áreas rurales, montes y arbustales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la cordillera, en Salta, Formosa, Misiones, Corrientes hasta el este de Neuquén, norte de Río Negro y sur de Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch y Ortiz (2006) Monteagudo (Simoca), Tacanas (Leales); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Abra Rica, Tacanas (Leales), El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1729) 1M, El Matadero, 1901.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Synallaxis frontalis

PIJUÍ FRENTE GRIS / SOOTY-FRONTED SPINETAIL / PETRIM

- HÁBITAT: Bosques y bordes de selvas, selvas en galería y montes con arbustales y setos.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera, hasta el este de San Juan y San Luis, el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y el noreste de Buenos Aires. La población más austral migra al norte en invierno.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Tapia, Trancas); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Alderete y Capllonch (2010) Horco Molle (Yerba Buena), Arroyo Mista (Leales), El Sunchal (Burruyacú), Monteagudo (Simoca), Colombres (Cruz Alta), Taficillo (Tafí Viejo), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1547) 1M, Leales, 1946; (1609) 1M, sin localidad, 1898; (1730) 1M, sin localidad, 1907; (1739) 1M?, sin localidad, 1928; (2227 y 2236) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (2589) 1H, Tapia, 1946; (9201) 1M, Las Tacanas, 1954; (9771) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956; (15150) 1M, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986; (17196) 1M, El Vizcacheral, 1993.
 - en pedestal: (269) 1H, Concepción, 1915.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Synallaxis azarae

PIJUÍ CEJA CANELA/ AZARA'S SPINETAIL

- HÁBITAT: Estrato bajo en yungas y sus ecotonos.
- DISTRIBUCIÓN: Entre los 1000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch y Ortiz (2006) Aguas Chiquitas, El Sunchal (Burrucacú), Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), Taficillo (Tafí Viejo), Horco Molle (Yerba Buena), Cochuna (Chicligasta), El Indio, Piedras Coloradas, Playa Larga (Monteros), Piedra Tendida, El Sunchal (Burrucacú), Las Tipas, Chulca (Trancas), La Florida (S/Dpto.); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Aguas Chiquitas, El Sunchal (Burrucacú), Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (218) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (390) 1M, El Timbó, 1946; (945) 1M, Timbó Viejo, 1946; (1650) 1M, Cerros de Tafí, 1900; (1661) 1M, Villa Nogués, 1905; (1659) 1M, Cerros de Tafí Viejo, 1900; (1731 y 1732) 1M y 1H, sin localidad, 1928; (2632) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1946; (3495) 1M, Cerros de Tafí, 1945; (4779) 1M, Cerro de Tafí, 1947; (5303) 1H, Cerro de Tafí Viejo, 1948;

(8045) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1952; (10508) 1H, Cerro del Campo, 1957; (17189) 1?, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., sin fecha. – en pedestal: (499) 1M-1H, Concepción, 1924.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019b); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés BUFF-BROWED SPINETAIL. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

5) Familia Cotingidae

Cinco especies en Argentina y una en Tucumán.

Phytotoma rutila

CORTARRAMAS / WHITE-TIPPED PLANTCUTTER

- HÁBITAT: Sabanas, bosques, arboledas, estepas arbustivas y prepuna.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, excepto Misiones y la cordillera del noroeste, hasta el norte de Santa Cruz y desde Corrientes y Río Negro hasta el sur de Santa Fe y La Pampa. Estas últimas poblaciones migran a la costa atlántica.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Rumboll *et al.* (2005) Los Puestos (Leales); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Leales (Leales), Monteagudo (Simoca), La Cocha (La Cocha), 7 de Abril, Burruyacú (Burruyacú), Vipos, Ticucho, Tapia, San Pedro de Colalao (Trancas), Amaicha del Valle, Fuerte Quemado, Quilmes, El Bañado, Colalao del Valle, El Pichao (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (121) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1946; (161) 1M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (227 y 265, 266, 267) 1M y 3H, Los Gómez, 1946; (228) 1M, Los Romanos, 1946; (530) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (588) 1M, sin localidad, 1907; (589) 1M, Dpto. Capital, sin localidad, sin fecha; (590) 1M, Las Tipas, 1901; (594 y 600) 1M y 1H, sin localidad, 1901; (595) 1M, sin localidad, 1927; (596) 1H, sin localidad, 1904; (599) 1H, sin localidad, 1928; (891) 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1549) 1H, Leales, 1946; (1562) 1H, La Aguadita, 1946; (1587 y 1965) 1H y 1M, Tapia, 1946; (1924) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1978) 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (1996) 1M, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1946; (2030) 1M, El Saladillo, 1946; (2054, 2066) 2H, Dpto. Trancas, sin localidad, 1946; (2063) 1M, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (2617) 1M, Nueva España, 1946; (6423 y 6428) 1M y 1H, Nueva España, 1950; (9013) 1M, Río Chilca,

1954; (9508) 1H, Laguna Jangallo, 1955; (9636) 1M, Chilca, 1955; (10482) 1M, Las Tipas, 1957; (10905) 1M, Agua Rosada, 1957; (12350) 1M, Chulca, 1961; (12701) 1H, Arroyo Tala, 1964; (17209, 17210) 2M, El Vizcacheral, 1993; (17420) 1M, Amaicha del Valle, El Bañado, 2010; (17441) 1M, Amaicha del Valle, El Bañado, 2008.

– en pedestal: (572) 1M, Concepción, 1918.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdS y AA: NA.

6) Familia Tityridae

Nueve especies en Argentina y cuatro en Tucumán.

Xenopsaris albinucha

TIJERILLA / WHITE-NAPED XENOPSARIS / TIJERILA

- HÁBITAT: Bosques, sabanas y ambientes húmedos.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norcentro del país, excepto Misiones y la zona montañosa del NOA, hasta Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. La población del sur migra más al norte en invierno.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (429) 1M, sin localidad, 1898; (9361) 1H, sin localidad, 1927; (9406) 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1916.
 - en pedestal: (225) 1M-1H, Iltico, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) se incluía en la Familia Tyrannidae. UICN: LC; MAdS y AA: NA.

Pachyramphus viridis

ANAMBÉ VERDOSO / GREEN-BACKED BECARD / CANEIRO-VERDE

- HÁBITAT: Estrato alto en selvas, bosques, quebradas y sabanas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana, hasta Tucumán, este de Catamarca, norte de Santiago del Estero, Chaco, este de Santa Fe, sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), San Javier (Yerba Buena), El Taficillo (Tafí Viejo), El Sunchal (Burrucacú); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (448) 1M, sin localidad, 1928; (449 y 7791, 7792, 9370) 1H y 3M, sin localidad, 1927; (9407) 1H, sin localidad, 1929.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) se incluía en la Familia Tyrannidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pachyramphus polychopterus

ANAMBÉ COMÚN / WHITE-WINGED BECARD / CANELEIRO-PRETO

- HÁBITAT: Selvas, bosques y arboledas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, excepto la cordillera, hasta el este de La Rioja, norte de San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe y noreste de Buenos Aires. La población del sur migra al norte en otoño.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Cadillal (Tafí Viejo), Horco Molle, Parque Sierra de San Javier (Yerba Buena), El Sunchal (Burrucacú), Monteagudo (Simoca); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (431) 1M, Tapia, 1901; (432) 1M, Las Cuchillas, 1906; (433) 1M, sin localidad, 1927; (2397) 1H, El Saladillo, 1946; (2478) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (3033) 1M, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (8474) 1M, Laguna Calimayo-La Reducción, 1953; (12343) 1H, Quebrada Los Matos, 1961; (13115) 1M, San Pedro de Colalao, 1960.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) se incluía en la Familia Tyrannidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pachyramphus validus

ANAMBÉ GRANDE / CRESTED BECARD / CANELEIRO-DE-CHAPÉU-PRETO

- HÁBITAT: Estrato medio y alto en selvas, bosques y quebradas húmedas.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Misiones, norte de Corrientes, este de Formosa, Chaco y Santa Fe y en Jujuy, Salta, Tucumán, oeste de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, norte de Córdoba y San Luis.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2010) Reserva Aguas Chiquitas, Cuesta de Chasquivil (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tafí del Valle (Tafí del Valle), Sierra de San Javier (Yerba Buena), Chasquivil, Taficillo (Tafí Viejo), San Pedro de Colalao (Trancas), Reserva Provincial Aguas Chiquitas, El Sunchal (Burruyacú); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (422) 1H, sin localidad, 1898; (437) 1H, Tafí Viejo, 1916; (438 y 456) 1H y 1M, Las Cuchillas, 1906; (457) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (460) 1M, La Hoyada, 1901; (461) 1M, Tafí Viejo, 1915; (2219, 2470, 2634) 3M, San Pedro de Colalao, 1946; (5327) 1M, San Pedro de Colalao, 1948; (9689) 1H, Tafí del Valle, 1955; (10884) 1M, San Pedro de Colalao, Quebrada El Cevil, 1958; (10889) 1M, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1957; (11271) 1M, Dpto. Trancas, Monte Bello, 1958; (12010) 1H, Las Juntas, 1960; (12571) 1M, Quebrada Los Matos, 1962; (12699) 1H, Las Mesadas, 1964.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) se incluía en la Familia Tyrannidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

7) Familia Tyrannidae

133 especies en Argentina y 81 presentes en Tucumán. Un ejemplar Tipo depositado en la COLFML. Con cuatro especies para confirmar (Apéndice 2).

Phylloscartes ventralis

MOSQUETA COMÚN / MOTTLE-CHEEKED TYRANNULET /
BORBOLETINHA-DO-MATO

- **HÁBITAT:** Estrato medio y alto en selvas, selva en galería, espinal denso y bordes de selvas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y en Misiones, Corrientes, este de Chaco y Santa Fe hasta norte de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal, Piedra Tendida (Burrucacú), Piedras Coloradas, Playa Larga, El Indio, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), La Junta, Chulca (Trancas), Cochuna (Chicligasta), Aguas Chiquitas, Taficillo (Tafí Viejo), Horco Molle (Yerba Buena), Dique Escaba (J.B. Alberdi), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle, San Javier, Yerba Buena (Yerba Buena), El Sunchal (Burrucacú), La Florida (Monteros), San Miguel de Tucumán (Capital), Tafí Viejo (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (72) 1H, Villa Nougés, 1903; (87 y 199) 1M y 1H, Cerros de Tafí, 1900; (88) 1M, sin localidad, 1903; (312, 401 y 401bis) 2M y 1?, Alpachiri, 1946; (753) 1M, Los Nogales, 1946; (870) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (886) 1M, Quebrada de Lules, 1946; (1152) 1M, Las Cañitas, 1946; (1156, 1652) 2M, El Saladillo, 1946; (1670 y 1992) 1M y 1H, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (3493) 1M, Cerros de Tafí, 1947; (5302) 1M, Cerros de Tafí, 1948; (8033) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (8044) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1952; (8463) 1M,

Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1953; (9036) 1H, La Angostura, 1954; (9632) 1M, Taficillo, 1955; (10598) 1M, Rearte Norte, 1957; (12344) 1M, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Laureles, 1962; (13101 y 14374) 1? y 1H, Cumbres del Aconquija, 1968; (17449) 1?, Reserva Provincial La Florida, 2009; (s/nº) 1M, El Timbó, 1946.

– en pedestal: (271) 1M, Concepción, 1915; (271) 1H, Iltico, 1909.

– en alcohol: (17662, 17663) 2?, Villa Batiruaná, 2018.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyS y AA: NA.

Leptopogon amaurocephalus

MOSQUETA CORONA PARDA / SEPIA-CAPPED FLYCATCHER / CABEÇUDO

● HÁBITAT: Estrato medio y bajo en selvas y bosques densos.

● DISTRIBUCIÓN: Disyunta, en Jujuy, Salta y Tucumán y en Misiones, norte de Corrientes y este de Formosa.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alderete y Capllonch (2010) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Quiroga (2018) Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta).

● MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyS y AA: NA.

Tolmomyias sulphurescens

PICOCHATO GRANDE / YELLOW-OLIVE FLYCATCHER /

BICO-CHATO-DE-ORELHA-PRETA

● HÁBITAT: Estrato medio y alto en yungas, selvas y bosques del norte.

● DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y en el este de Formosa, Chaco y norte de Santa Fe, norte de Corrientes y Misiones.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) San Ignacio (La Cocha), Ticucho (Trancas), Taficillo (Tafí Viejo), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), Taficillo, Tafí Viejo

(Tafí Viejo), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Ticucho (Trancas), San Ignacio, La Cocha (La Cocha); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuerilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en alcohol: (17515) 1?, Reserva Provincial La Florida, 7 Km al O de Ibatín, en Río Pueblo Viejo, 1998.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Hemitriccus margaritaceiventer

MOSQUETA OJO DORADO / PEARLY-VENTED TODY-TYRANT /
SEBINHO-DE-OLHO-DE-OURO

- HÁBITAT: Estrato bajo y medio en bosques, espinal, monte y sabanas de tipo chaqueño.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, por el oeste de Salta y Jujuy, este de Catamarca, La Rioja, norte de San Luis y Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal, Piedra Tendida (Burrucacú), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), Ticucho, Chulca, puente sobre el Río Tapia (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena), Agua Salada (Leales), Piedras Coloradas (Monteros); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Alpachiri (Chicligasta), Choromoro, El Cadillal, Chulca, Ticucho (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena), Piedra Tendida (Burrucacú), Soldado Maldonado (Monteros), Agua Salada, Abra Rica (Leales); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (77 y 85) 1H y 1M, sin localidad, 1900; (78) 1H, Los Gómez, 1915; (80, 252 y 251) 2H y 1M, sin localidad, 1928; (81) 1M, sin localidad, 1898; (82) 1H, sin localidad, 1903; (84) 1M, sin localidad, 1910; (278) 1H, Los Gómez, 1946; (1410) 1M, Las Cañitas, 1946; (8337) 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1953; (10506) 1M, Cerro del Campo, 1957; (14555) 1?, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1976; (15151) 1M, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986; (17232, 17233, 17234) 3M, El Vizcacheral, 1993.
 - en pedestal: (247) 1H, Concepción, 1909; (247) 1M, sin localidad, sin fecha.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyDS y AA: NA.

Poecilatriccus plumbeiceps

MOSQUETA CABEZA CANELA / OCHRE-FACED TODY-FLYCATCHER / TORORÓ

- HÁBITAT: Estrato bajo y denso en yungas, selvas y capueras, también en matorrales chaqueños.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta, norte de Tucumán, Formosa y Misiones.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burruyacú); Marigliano y Brandán Fernández (2013) Sierras de La Ramada y del Campo (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2013a) Piedra Tendida, El Sunchal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (15258) 1M, 5 Km al O de Piedra Tendida, 1991.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyDS y AA: NA.

Hirundinea ferruginea

BIRRO COMÚN / CLIFF FLYCATCHER / GIBÃO-DE-COURO

- HÁBITAT: En bosques, selvas, montes, quebradas selváticas y poblados donde ocupa diversas construcciones humanas.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Desde Jujuy, Salta y Formosa hasta Mendoza, norte de San Luis y oeste de Córdoba y otra en Misiones y norte de Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Remate, El Pichao, Amaicha del Valle, Ampimpa (Tafí del Valle), Dique Escaba (Juan B. Alberdi), Monteagudo (Simoca), Ticucho (Trancas); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (102, s/n°) 2M, Amaicha del Valle, 1946; (286) 1?, Vipos, 1949; (287) 1M, sin localidad, 1900; (288) 1H, sin localidad, 1902; (289) 1M, Vipos, 1899; (290) 1M, San Pedro de Colalao, 1917; (10767) 1H, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1956; (12336 y 12337) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, Chulca, 1961.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyDS y AA: NA.

Pyrrhomyias cinnamomeus

BIRRO CHICO / CINNAMON FLYCATCHER

- **HÁBITAT:** Estrato alto y medio en Yungas.
- **DISTRIBUCIÓN:** En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2010) El Indio (Monteros), Cuesta de Chasquivil (Tafí Viejo); Ortiz, Ferro y Barrionuevo (2012) El Indio 1200 m snm (Monteros); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Indio (Monteros), Chasquivil (Tafí Viejo), Tafí del Valle (Tafí del Valle), San Pedro de Colalao (Trancas).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (331 y 332) 1M y 1H, La Hoyada, 1901; (9776) 1H, camino entre el Ingenio Santa Lucía y Tafí del Valle, 1956; (12569) 1M, San Pedro de Colalao, 1962.
 - en pedestal: (208) 1M, Las Pavas, 1911.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Stigmatura budyoides

CALANDRITA / GREATER WAGTAIL-TYRANT / ALEGRINHO-BALANÇA-RABO

- **HÁBITAT:** Sabanas, bosque chaqueño, espinales y estepas arbustivas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y la Mesopotamia, por Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero hasta Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y noreste de Chubut. Probablemente en Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Trancas); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010), Agua Salada, Los Puestos (Leales), Cochuna (Chicligasta), Monteagudo (Simoca), Ticucho (Trancas), Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Amaicha del Valle y El Mollar (Tafí del Valle), Monteagudo (Simoca), Arroyo Mista (Leales), 7 de Abril (Burruyacú), Vipos, Tapia, San Pedro de Colalao (Trancas), Las Tipas (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (292 y 293) 1H y 1M, Tapia, 1946; (306) 1H, Tapia, 1902; (307) 1M, Vipos, 1905; (308) 1?, sin localidad, 1901; (495, 2237) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (787) 1H, El Guardamonte, 1946; (966) 1M, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (2012) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (5369) 1M, El Guardamonte, 1948; (9049) 1H, Zárate, 1954; (9050) 1H, La Angostura, 1954; (9517) 1M, El Guardamonte, 1955.
 - en pedestal: (507) 1M-1H, Concepción, 1918.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyS y AA: NA.

Inezia inornata

PIOJITO PICUDO / PLAIN TYRANNULET / ALEGRINHO-DO-CHACO

- HÁBITAT: Bordes de selvas y selva en galería, sabanas, bosques, montes y espinal.
- DISTRIBUCIÓN: norte de Argentina, en Jujuy, Salta, Formosa y Chaco hasta Tucumán y Catamarca.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: sin registros.
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1157) 1M, El Saladillo, 1946.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003).
- OBSERVACIONES: EcoRegistros. 2021. Piojito Picudo (*Inezia inornata*)-Ficha de la especie. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 19/05/2021. UICN: LC; MAdyS y AA: NA.

Euscarthmus meloryphus

BARULLERO / TAWNY-CROWNED PYGMY-TYRANT / BARULHENTO

- HÁBITAT: En sabanas, selvas y bosques de tipo chaqueño entre matorrales, arbustales y vegetación baja.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste hasta el noreste de San Juan y Mendoza, norte de San Luis, centro de Córdoba, sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) San Pedro de Colalao (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena), Monteagudo (Simoca), Colombres, (Cruz Alta), Abra Rica (Leales); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2635) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (7684) 1M, sin localidad, 1929.
 - en pedestal: (263) 1H, Concepción, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Camptostoma obsoletum

PIOJITO SILBÓN / SOUTHERN BEARDLESS-TYRANNULET / RISADINHA

- HÁBITAT: Copas de árboles bajos en bosques, sabanas, monte chaqueño y espinal.
- DISTRIBUCIÓN: En el norte y centro del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, desde Jujuy, Salta, Formosa y Misiones, por Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan hasta el noreste de San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Capllonch *et al.* (2009) Reserva Provincial Aguas Chiquitas (Burruyacú); Alderete y Capllonch (2010) Monteagudo (Simoca), Ticucho (Trancas), El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Reserva Provincial Aguas Chiquitas (Tafí Viejo); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Chicligasta (Chicligasta), Ticucho (Trancas), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Río Urueña (Burruyacú), Bañados de Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (133) 1M, sin localidad, 1904; (136) 1M, sin localidad, 1899; (190, 249) 2M, sin localidad, 1928.
 - en pedestal: (506) 1H-1?, Concepción, 1915.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Elaenia spectabilis

FIOFÍO GRANDE / LARGE ELAENIA / GUARACAVAL-GRANDE

- HÁBITAT: Capueras, bosques y sabanas.
- DISTRIBUCIÓN: En el norte del país, exceptuando la cordillera, desde Jujuy y el centro de Salta, Formosa y Misiones, hasta Tucumán, norte de Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y extremo norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch, Ortiz y Soria (2009) Arroyo Mista (Leales); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (165 y 169) 1M y 1H, sin localidad, 1905; (247 y 248) 2M, sin localidad, 1928; (7128) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (9416) 1H, sin localidad, 1927; (12563) 1M, San Pedro de Colalao, 1962; (17321) 1?, Arroyo Mista, 2004.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Elaenia albiceps

FIOFÍO SILBÓN / WHITE-CRESTED ELAENIA / GUARACAVAL-DE-CRISTA-BRANCA

- HÁBITAT: Bosque araucano y chaqueño, selvas, estepas arbustivas y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y desde el sur de La Rioja y Córdoba por el sur de Buenos Aires y este de La Pampa hasta Tierra del Fuego, probablemente en Islas Malvinas. La raza del sur migra al centro y norte del país en otoño-invierno.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Lobo (2005) San Pedro de Colalao, Dique Tacanas, Las Juntas-Choromoro, Las Vertientes, Ticucho (Trancas), Colalao del Valle, El Molle, Río Cajonal, Tafí del Valle, entre Acheral y Tafí Km 49 alisos (Tafí del Valle), Piedra Tendida (Burruyacú), Las Agüitas, La Hoyada, Tafí Viejo, Parque Biológico Sierra de San Javier- Horqueta (Tafí Viejo), Parque Biológico Sierra de San Javier, Anta Yacu (Yerba Buena), Río Los Sosa, Ruta 307 Km 19, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), La Banderita y pasando 3,5 Km de La Banderita (Chicligasta), Reserva Provincial Santa Ana, El Saltón (Río Chico), planta de Y.P.F. a 8,6 Km de Monteagudo, Monteagudo, Río Chico pasando Monteagudo

(Simoca), Dique San Ignacio (La Cocha); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena), Taficillo, Cuesta de Chasquivil (Tafí Viejo), Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca), Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Chasquivil (Tafí Viejo), La Banderita, Cochuna, Cuesta del Clavillo (Chicligasta), El Bañado, Tafí del Valle (Tafí del Valle), Monteagudo (Simoca); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (143) 1M, Cumbres de Tafí, 1915; (148) 1M, sin localidad, 1898; (150) 1H, sin localidad, 1900; (155) 1M, Colalao del Valle, 1913; (5350) 1H, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1948; (17389) 1?, Cuesta de Chasquivil, 2004; (17478) 1?, Amaicha del Valle, El Bañado, 2010; (2608) 1H, Aconquija, 1946; (14830) 1M, El Carmen, 13 km al O de Fuerte Quemado, 1985; (17082) 1M, Santa Cruz-10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.

– en pedestal: (245) 1M-1H, Concepción, 1909.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Elaenia parvirostris

FIOFÍO PICO CORTO / SMALL-BILLED ELAENIA / GUARACAVA-DE-BICO-CURTO

● HÁBITAT: Selvas, bosques, sabanas y arboledas.

● DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera, por el este de Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan hasta Mendoza, San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe, este y centro de Buenos Aires. En otoño/ invierno migran más al norte.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Capllonch y Lobo (2005) San Pedro de Colalao, Dique Tacanas, Ticucho (Trancas), El Cadillal, Aguadita, Parque Biológico Sierra de San Javier-Senda del pluviómetro (Tafí Viejo), Parque Biológico Sierra de San Javier, Anta Yacu, Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena), El Saladillo (Cruz Alta), El Indio, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Río Colorado, Agua Salada, Los Puestos (Leales), Monteagudo (Simoca), Dique San Ignacio (La Cocha); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alderete y Capllonch (2010) Parque

Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena), San Ignacio (La Cocha), Los Puestos (Leales), Ticucho (Trancas), Colombres (Cruz Alta), El Sunchal (Burruyacú), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho, El Cadillal (Trancas), Arroyo Mista, Los Puestos (Leales), Monteagudo (Simoca), El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2015) El Molle (Tafí del Valle); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (142) 1M, Cerros de Tucumán, 1900; (250, 254) 2M, sin localidad, 1928; (253, 2415) 2H, sin localidad, 1927; (1380) 1M, El Saladillo, 1946; (1421) 1M, Dpto. leales, sin localidad, 1946; (1548) 1H, Leales, 1946; (1634, 1637, 2027, 2028, 2029, 2033, 2105, 2250, 2254, 2258, 2283, 2290, 2295, 2339, 2375, 2377, 2382, 2413, 2414, 2439, 2440, 2511, 2952, 3135, 3138, 3159, 3227 y 2025, 2035, 2036, 2037, 2061, 2203, 2257, 2263, 2267, 2303, 2325, 2345, 2348, 2384, 2561, 3143, 3144, 3149, 3150, 3151, 3161, 3162, 3237) 27M y 23H, El Saladillo, 1946; (1998, 1999) 2M, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1946; (2220, 2232, 2477) 3H, San Pedro de Colalao, 1946; (2439 y 2450) 1M y 1H, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (2534) 1M, Malvinas (6 km SE de San Pablo) 1946; (2566, 2567 y 2570) 2H y 1M, La Aguadita, 1946; (2587) 1M, Tapia, 1946; (2604, 2605) 2M, Dpto. Leales, Río Colorado, 1946; (2762) 1H, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (3219) 1H, El Timbó, 1946; (9117) 1M, Dique Tacanas, 1954; (9119) 1M, Las Vertientes, 1954; (9331) 1M, San Pedro de Colalao, 1955; (10389) 1M, San Pedro de Colalao, 1956; (10914, 10915) 2M, La Higuera, 1957; (12566) 1M, Agua Rosada, 1963; (17235, 17237, 17240 y 17236, 17238, 17239, 19241) 3M y 4H, El Vizcacheral, 1993.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Elaenia strepera

FIOFÍO PLOMIZO / SLATY ELAENIA

- HÁBITAT: Estrato medio de yungas y bosques.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Observada en Sierras de Córdoba.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch y Lobo (2005) Dique Tacanas, Las Juntas, Choromoro, Las

Vertientes, Ticucho (Trancas), Piedra Tendida (Burruyacú), Aguas Chiquitas, Cerro Medici en El Cadillal, Cumbres de Tafí Viejo, La Hoyada, Parque Biológico Sierra de San Javier: Puesto de Velárdez, Senda del Pluviómetro (Tafí Viejo), El Molle, Tafí del Valle (Tafí del Valle), Parque Biológico Sierra de San Javier, Anta Yacu (Yerba Buena), Entre Acherál y Tafí Km 49, alisos, Playa Larga-Ruta 307, Río Los Sosa, Ruta 307 Km 19, Ruta 307 Km 43, El Indio, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), San Ignacio (La Cocha), Cochuna (Chicligasta), Reserva Provincial Santa Ana, El Saltón (Río Chico); Moschione (2007) Sierra de Medina (Burruyacú/Trancas), Sierra de San Javier (Yerba Buena/Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Río Los Sosa (Monteros/Tafí del Valle), Cuesta del Clavillo (Chicligasta), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Trancas (Trancas), Parque Provincial Los Ñuñorcós y Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/Monteros), Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico); Alderete y Capllonch (2010) Playa Larga, Piedras Coloradas (Montero), Piedra Tendida (Burruyacú), Cuesta de Chasquivil (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Dique San Ignacio (La Cocha), Horco Molle, Sierra de San Javier (Yerba Buena), La Banderita (Chicligasta), Chasquivil, Pinar de Velárdez (Tafí Viejo), El Indio, Reserva Provincial La Florida (Monteros), Piedra Tendida, Sierra de Medina (Burruyacú); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (152 y 167) 1H y 1M, Cerros de Tucumán, 1900; (173) 1M, La Hoyada, 1901; (11230) 1?, Amaicha del Valle, 1958; (14825) 1?, Ruta 307, km 26.9 camino a Tafí del Valle, 1984.

– en pedestal: (621) 1M-1H, Concepción, 1918.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Elaenia obscura

FIOFÍO OSCURO / HIGHLAND ELAENIA

● HÁBITAT: Estrato medio en selvas y bosques del noreste y noroeste.

● DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Misiones y norte de Corrientes y en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Rumboll *et al.* (2005) Ruta 307 camino a Tafí del Valle (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) El Indio, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida, Piedras Coloradas, Playa Larga (Monteros), Cochuna (Chicligasta), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2011)

Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros), El Sunchal (Burruyacú); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (159 y 162) 1H y 1M, Villa Nougues, 1901.
 - en pedestal: (622) 1H, Concepción, 1916.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiopagis viridicata

FIOFÍO CORONA DORADA / GREENISH ELAENIA /
GUARACAVA-DE-CRISTA-ALARANJADA

- HÁBITAT: Estrato medio y alto en bordes de selvas y bosques del norte.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y en el este de Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (201) 1M, sin localidad, sin fecha; (2305 y 2343) 1M y 1H, El Saladillo, 1946; (7715, 9359) 2M, sin localidad, 1927.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Suiriri suiriri

SUIRIRÍ COMÚN / SUIRIRI FLYCATCHER / SUIRIRI-CINZENTO

- HÁBITAT: Sabanas y bosques, monte y espinal, selva en galería.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona cordillerana, hasta Mendoza, La Pampa y sur y noreste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo);

Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), (Cruz Alta), Vipos, San Pedro de Colalao (Trancas); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (135) 1H, Las Cañitas, 1946; (189 y 192, 193) 1M y 2H, sin localidad, 1902; (194) 1M, La Aguadita, 1946; (505) 1M, Ingenio Luján, 1914; (586) 1H, Raco, 1946; (786) 1M, El Guardamonte, 1946; (1259, 2472 y 1941) 2M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (2018) 1H, Leales, 1946; (2624) 1H, Nueva España, 1946; (7713) 1M, sin localidad, 1929; (10585) 1M, Rearte Norte, 1957; (11482) 1M, Quebrada Las Cuevas, 1957; (12568) 1M, San Pedro de Colalao, 1963; (13723) 1?, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 1946; (17468) 1?, Santa Inés, 2007.
- en pedestal: (505) 1H, Concepción, 1915.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phyllomyias burmeisteri

MOSQUETA PICO CURVO / ROUGH-LEGGED TYRANNULET / POAIEIRO-DO-SUL

- HÁBITAT: Estrato medio de yungas y selvas del noroeste.

- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y en el norte de Misiones.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Cumbres del Taficillo (Tafí Viejo).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (203) 1?, sin localidad, 1901; (2325) 1H, Concepción, 1929; (2328) 1M, sin Dpto., Aconquija, 1928; (2331) 1M, sin Dpto., Aconquija, 1928.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: (203) colectado por M. I. Lillo. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phyllomyias sclateri

MOSQUETA CORONA GRIS/ SCLATER'S TYRANNULET

- **HÁBITAT:** Estrato bajo y medio en yungas.
- **DISTRIBUCIÓN:** En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Piedra Tendida (Burruyacú), Cuesta de Chasquivil (Tafí Viejo), Playa Larga, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Chasquivil (Tafí Viejo), Piedras Coloradas, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Parque Sierra de San Javier (Yerba Buena), Reserva Provincial Aguas Chiquitas (Burruyacú); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (73) 1H, sin localidad, 1898; (187) 1M, Quebrada de Vipos, 1905; (195) 1M, Quebrada de Vipos, 1905; (196) 1M, sin localidad, 1900; (197) 1M, Quebrada de Vipos, 1905; (1087) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2330) 1H, Concepción, 1928.
 - en pedestal: (688) 1M, Concepción, 1918; (688) 1H, sin localidad, sin fecha; (717) 1M, Concepción, 1925.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phaeomyias murina

PIOJITO PARDO / MOUSE-COLORED TYRANNULET / BAGAGEIRO

- **HÁBITAT:** Estrato bajo en selvas, monte, selva en galería, del noreste y yungas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta, en el este de Formosa, Chaco, Formosa y Misiones y en Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja. Observada en Sierras de Córdoba.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:** sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Mecocerculus hellmayri

PIOJITO DE LOS PINOS / BUFF-BANDED TYRANNULET

- HÁBITAT: Estrato alto de bosques y selvas montanas en noroeste.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta y Tucumán.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.*, (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Pinar Velárdez, Parque Biológico Sierra de San Javier (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: EcoRegistros. 2021. Piojito de los Pinos (*Mecocerculus hellmayri*)-Ficha de la especie. Accedido de <http://www.ecoregistros.org> el 19/05/2021. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Mecocerculus leucophrys

PIOJITO GARGANTILLA / WHITE-THROATED TYRANNULET

- HÁBITAT: En el estrato medio y bajo de las Yungas, también en quebradas boscosas.
- DISTRIBUCIÓN: Entre los 1000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Trancas); Capllonch (2007a) Las Tipas, Tapia (Trancas), Ríos Salí y Marapa (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Alderete y Capllonch (2010) Cochuna (Chicligasta), Taficillo, La Ciénaga, Cuesta de Chasquivil (Tafí Viejo), Chulca (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena), El Indio (Monteros), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Las Mesadas (Monteros),

Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Tafí del Valle (Tafí del Valle), La Ciénaga, San José de Chasquivil (Tafí Viejo), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena), Piedra Tendida, El Sunchal (Burruyacú); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (102 y 104) 1M y 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad 1900; (103) 1H, Vipos, 1905; (122) 1M, Quebrada de Vipos, 1905; (123) 1M, Vipos, Río Vipos, 1905; (131) 1H, Villa Nogués, 1903; (202) 1M, sin localidad, 1899; (400) 1M, La Cumbre, 1946; (581) 1H, Alpachiri, 1946; (898 y 902) 1H y 1M, Taficillo, 1946; (962) 1M, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (856, 1938, 2241 y 1942, 1943, 2231, 2633, 2637) 3H y 5M, San Pedro de Colalao, 1946; (2502) 1H, El Saladillo, 1946; (6576 y 6637) 1M y 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8464) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1953; (8844) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (9676) 1H, Chilca, 1955; (10519) 1M, Cerro del Campo, 1957; (10933) 1H, Dpto. Trancas, Monte Bello, 1957; (14375) 1M, Cumbres del Aconquija, 1968; (14536, 14537) 2M, Alto de La Perdiz-Cumbres de Cabra Horco, 1977.

– en pedestal: (471) 1M, Las Pavas, 1917.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: (202) colectado por M. I. Lillo. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Anairetes flavirostris

CACHUDITO PICO AMARILLO / YELLOW-BILLED TIT-TYRANT

- HÁBITAT: Sabanas, bosques y estepas arbustivas en matorrales, setos y arbustales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, sur de Buenos Aires y Chubut. En otoño/invierno, migra hasta Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) El Pichao, El Remate, El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Valle de Yocavil (Tafí del Valle), (Cruz Alta), Horco Molle (Yerba Buena); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (86) 1H, sin localidad, 1898; (99) 1M, sin localidad, 1905; (105) 1H, sin localidad, 1901; (5463, 5464, 5465) 3M, Tafí del Valle, 1948.
 - en pedestal: (434) 1H, Concepción, 1929.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Anairetes parulus

CACHUDITO PICO NEGRO/ TUFTED TIT-TYRANT

- HÁBITAT: En bordes de bosques, estepas arbustivas y patagónicas y en quebradas andinas, entre matorrales.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el oeste del país hasta los 4000 m snm desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y por el centro desde el oeste de Córdoba al sur de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alderete y Capllonch (2010) El Infiernillo, Bañados de Amaicha (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Molle, El Remate, Amaicha del Valle, Rincón de Quilmes, Fuerte Quemado, El Bañado (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (93) 1H, Ñorco, 1904; (95) 1M, Villa Nougús, 1905.
 - en pedestal: (448) 1M-1H, Iltico, 1925.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pseudocolopteryx sclateri

DORADITO COPETÓN / CRESTED DORADITO / TRICOLINO

- HÁBITAT: Juncales, pastizales anegados, arroceras y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde Corrientes hasta el norte de Buenos Aires y por el centro del país hasta Tucumán, centro de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz, Aráoz y Capllonch (2006) El Sunchal (Burrucacú), Capllonch *et al.* (2009) Río Salí (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (178) 1H, sin localidad, 1901; (17368) 1?, El Sunchal, 2005.

- LITERATURA: Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdDS y AA: NA.

Pseudocolopteryx acutipennis

DORADITO OLIVÁCEO / SUBTROPICAL DORADITO

- HÁBITAT: Vegetación palustre, matorrales y juncales, cerca del agua, en serranías, llanuras y periferias de cultivos.
- DISTRIBUCIÓN: Entre 1000 y 2000 m snm desde Jujuy y Salta, por Tucumán y Catamarca, hasta el noreste de La Rioja, Córdoba, norte de San Luis, noroeste de Santa Fe y Mendoza. Posiblemente en La Pampa y noroeste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navas (2002b) Concepción (Chicligasta), La Criolla 1500 m snm, La Hoyada, Lagunita, Cumbres de Raco (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2006) El Infiernillo; Capllonch (2007b) El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2009) El Infiernillo, Tafí del Valle, La Angostura (Tafí del Valle), Taficillo (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2010) La Angostura (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (90) 1M, Cumbre Hirajo de La Hoyada, 1902; (91) 1H, sin localidad, 1899; (9168, 9169) 2M, Tafí del Valle, 1955; (9691, 9692 y 9693) 2M y 1H, Tafí del Valle, 1956.
 - en pedestal: (259) 1M, Gastona, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdDS y AA: NA.

Pseudocolopteryx dinelliana

DORADITO PARDO / DINELLI'S DORADITO

- HÁBITAT: Sunchales y otra vegetación palustre.
- DISTRIBUCIÓN: Desde Jujuy por Salta, Tucumán, Santiago del Estero y noreste de Córdoba hasta centro de Santa Fe. Probablemente en Chaco y Formosa.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (100, 9431) 2M, sin localidad, 1927; (179, 183) 2H, sin localidad, 1900; (180) 1M, sin localidad, 1899; (184) 1M, sin localidad, 450 m snm, 1904; (204) 1M, sin localidad, 1903.
 - en pedestal: (501) 1M-1H, Concepción, 1917.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: (184) Material Tipo colectado por L. Dinelli. UICN: NT; MAyDS y AA: VU.

Pseudocolopteryx flaviventris

DORADITO COMÚN / WARBLING DORADITO

- HÁBITAT: Juncuales o matorrales y pastizales anegados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Chubut sin incluir la zona cordillerana.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2006) Km 78, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2009) Río Chico (Simoca); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) (Cruz Alta); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en pedestal: (12) 1M-1H, Concepción, 1918.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010), de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Serpophaga nigricans

PIOJITO GRIS / SOOTY TYRANNULET / JOÃO-POBRE

- HÁBITAT: En humedales entre arbustales, maleza y vegetación acuática.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta Neuquén, Río Negro y sur de Buenos Aires. Un registro en Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Alderete y Capllonch (2010) Ticucho, Puente del Río Tapia, Chulca (Trancas), San Ignacio (La Cocha), Arroyo Mista (Leales), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2013a) Río Calera (Burruyacú), Río Vipos (Trancas), Río Colorado, Río Gastona (S/Dpto.), Arroyo Mista (Leales), Las Salinas (Burruyacú), Banda del Río Salí (Cruz Alta), Quilmes (Tafí del Valle); Echevarría y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (58 y 236) 1M y 1H, sin localidad, 1928; (62) 1M, sin localidad, 1902; (63) 1H, sin localidad, 1904; (1593) 1H, El Timbó, 1946; (9675) 1M, Chilca, 1955; (15157) 1H, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986; (17226, 17227, 17228) 3H, El Vizcacheral, 1993.
 - en pedestal: (228) 1M, Concepción, 1917; (228) 1H, Iltico, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Serpophaga subcristata

PIOJITO COMÚN / WHITE-CRESTED TYRANNULET / ALEGRINHO

- HÁBITAT: Selvas, bosques, sabanas, estepas arbustivas, espinal, plantaciones y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el este de Salta, Formosa y Misiones hasta el noreste de Mendoza, La Pampa, centro de Río Negro y noreste de Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Rumboll *et al.* (2005) Reserva de Aguas Chiquitas (Burruyacú), Los Puestos (Leales); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burruyacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros), El Sunchal, El Chañar (Burruyacú), Vipos (Trancas), Valle de Yocavil (Tafí del Valle), Arroyo Mista, Agua Salada (Leales); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (66 y 83) 1H y 1?, sin localidad, 1901; (68) 1H, sin localidad, 1907; (7717) 1M, sin localidad, 1928; (10966) 1M, Agua Rosada, 1958.
 - en pedestal: (277) 1M-1H, Concepción, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: (68) colectado por M. I. Lillo. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Serpophaga munda

PIOJITO VIENTRE BLANCO / WHITE-BELLIED TYRANNULET /
ALEGRINHODE-BARRIGA-BRANCA

- **HÁBITAT:** Monte, espinal, plantaciones y setos.
- **DISTRIBUCIÓN:** Por el centro oeste del país en una estrecha faja desde Salta y Jujuy hasta La Pampa, Neuquén y Córdoba. En invierno se desplazan al centro-este, llegando al centro de Corrientes y al norte de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones-Tapia (Trancas); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal, Chulca (Trancas), San Ignacio (La Cocha), El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (64) 1?, sin localidad, 1898; (552) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (854) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1141, 1376) 2M, Las Cañitas, 1946; (1609) 1H, Nueva España, 1946; (2340 y 3148) 1M y 1H, El Saladillo, 1946; (2571) 1M, La Aguadita, 1946; (10756) 1H, San Pedro de Colalao, Las Tacanas, 1956.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010), como raza del oeste de *Serpophaga subcristata*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Serpophaga griseicapilla

PIOJITO TRINADOR / STRANECK'S TYRANNULET

- **HÁBITAT:** Bosques, montes, espinal, plantaciones y sabanas del oeste.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país por Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, oeste de Córdoba, este de San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa hasta sur de Buenos Aires, norte de Río Negro y este de Chubut. En otoño/invierno migra al este, llegando a Corrientes.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Alderete y Capllonch (2010) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna

La Florida (Monteros); Capllonch *et al.* (2015) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Amaicha del Valle (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Serpophaga griseiceps*, otro nombre en inglés: WHITE-BELLIED TYRANNULET, fue redesignada por Straneck (2007) como especie nueva con el nombre actual. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Legatus leucophaeus

TUQUITO CHICO / PIRATIC FLYCATCHER / BEM-TE-VI-PIRATA

- HÁBITAT: Estrato medio en selvas, bosques, montes, capueras y sabanas del norte.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Misiones, norte de Corrientes, este de Formosa y Chaco y en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Algunas poblaciones migran al norte en invierno, llegando al norte de Sudamérica.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucuyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) San Javier, Horco Molle (Yerba Buena), San Pedro de Colalao, Trancas (Trancas); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucuyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (231) 1H, Las Cuchillas, 1906; (7130, 7135) 2M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (11252) 1M, San Pedro de Colalao, Agua Rosada, 1959; (12339) 1M, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1961; (12340) 1H, Quebrada Los Matos, 1961; (12564, 12565) 2M, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1962.
 - en pedestal: (249) 1M-1H, Iltico, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pitangus sulphuratus

BENTEVEO COMÚN / GREAT KISKADEE / BEM-TE-VI

- HÁBITAT: Selvas, bosques, montes, periferias de humedales y arboledas, incluso con exóticas, también poblados.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el país hasta el norte de Chubut. Probablemente en Santa Cruz e Islas Malvinas.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000)

Yerba Buena (Yerba Buena), Tañí Viejo (Tañí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tañí Viejo (Tañí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tañí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tañí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tañí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tañí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tañí (Tañí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tañí del Valle); Capllonch *et al.* (2009) Arroyo Mista (Leales), Reserva de Horco Molle (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burrucacú), Monteagudo (Simoca), Ticucho (Trancas), Amaicha del Valle, Tañí del Valle (Tañí del Valle); Gómez (2010) Arroyo Tañí (Tañí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tañí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tañí Viejo); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tañí Viejo); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tañí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú).

● MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (107, 174, 183 y 2754) 3H y 1M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (118) 1H, sin localidad, 1945; (221) 1M, sin localidad, 1900; (222) 1M, sin localidad, 1901; (223) 1M, sin localidad, 1928; (402) 1H, Mariño, 1946; (639) 1H, Tranquitas, 1946; (983, 988) 2M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (1558 y 1560) 1M y 1H, La Aguadita, 1946; (1666) 1M, Santa Rosa de Leales, 1946; (2091) 1H, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (2367, 2394 y 2417) 2H y 1M, El Saladillo, 1946; (2760) 1H, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (6319, 6324, 6354, 6854 y 6365) 4H y 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (8345) 1M, El Guardamonte, 1953.
- en pedestal: (206) 1M, Concepción, 1909.
- esqueleto: (17174) 1?, Villa Carmela, 2013.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Machetornis rixosa

PICABUEY / CATTLE TYRANT / SUIRIRI-CAVALEIRO

- **HÁBITAT:** Sabanas, bosques, montes, áreas rurales y periferias de poblaciones.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la cordillera, hasta el noreste de Neuquén, norte de Río Negro y sur de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo) y San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (50) 1H, Los Sarmientos, 1911; (51, 53, 55 y 57) 3M y 1H, sin localidad, 1900; (54) 1M, Los Gómez, 1915; (91) 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (906) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, sin fecha; (1619, 1642, 2280 y 2406) 3M y 1?, El Saladillo, 1946; (2100) 1M, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (3255) 1M, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (5054) 1H, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 1947; (6331, 6357) 2H, San Pedro de Colalao, 1950.
 - en pedestal: (268) 1H, Concepción, 1914.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiodynastes maculatus

BENTEVEO RAYADO / STREAKED FLYCATCHER / BEM-TE-VI-RAJADO

- **HÁBITAT:** Estrato alto y medio en selvas y bosques.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la cordillera, hasta el sur de San Luis, este de La Pampa, norte de Córdoba, sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires. Migra al norte en otoño/invierno.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal; Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal; Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal; Capllonch (2007a) Burrucacú, Piedra Tendida (Burrucacú), San Ignacio (La Cocha), Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico), Reserva de Horco Molle (Yerba Buena), Ticucho, Las Tipas (Trancas), Piedras Coloradas (Monteros), El Cadillal, La Florida (Monteros), Las Juntas (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burrucacú); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Sunchal (Burrucacú), La Florida (Monteros), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), Vipos, Trancas (Trancas), Leales (Leales); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (21, 205, 208, 211, 212, 213 y 217) 6M y 1H, Las Cuchillas, 1906; (113, s/n°) 2M, Río Nio, 1946; (207) 1M, Tapia, 1901; (209, 216 y 215) 2H y 1M, sin localidad, 1927; (210) 1M, Vipos, 1899; (1148, 1169, 1330, 1635, 1648, 1649, 1698, 2281, 2350, 2359, 2363, 2400, 2551, 2553, 3158 y 1334, 1643, 1658, 2026, 2041, 2284, 2300, 2442, 2548, 2552, 2562, 2576 y 2554) 15M y 12H y 1?, El Saladillo, 1946; (1323, 1335, 1947 y 1350, 2277 y 2276) 3M y 2H y 1?, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (1567, 2621) 2M, Tapia, 1946; (2065) 1H, Trancas, 1946; (2213) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2440 y 2452) 1M y 1H, Yerba Buena, 1946; (2558) 1H, sin localidad, 1946; (2568) 1H, La Aguadita, 1946; (2603) 1H, Dpto. Leales, Río Colorado, 1946; (9335) 1M, Las Tacanas, 1955; (10890) 1M, San Pedro de Colalao, Agua Rosada, 1958.
 - en pedestal: (214) 1M-1H, Iltico, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Empidonomus varius

TUQUITO RAYADO / VARIEGATED FLYCATCHER / PEITICA

- **HÁBITAT:** Estrato medio y alto en selvas, bosques, capueras, sabana y poblados.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde Salta, Jujuy y Tucumán, exceptuando la cordillera, por el norte de Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones y Corrientes. Probablemente migran al norte en otoño/ invierno hasta Entre Ríos, norte de Buenos Aires y San Luis.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007a) Piedra Tendida (Burruyacú), Piedras Coloradas (Tafí del Valle), Dique El Cadillal (Tafí Viejo), Reserva de Horco Molle (Yerba Buena), Ticucho (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burruyacú); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Sunchal (Burruyacú), La Florida (Monteros), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), Vipos, Trancas (Trancas), Leales (Leales); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (275) 1M, Vipos, 1905; (276) 1M, Tafí Viejo, 1900; (277, 278 y 279, 281) 2M y 2H, Las Cuchillas, 1906; (1127) 1M, Las Cañitas, 1946; (1394) 1M, Yerba Buena, 1946; (2309, 2373, 3136 y 2318, 2550 y 2354) 3M y 2H y 1?, El Saladillo, 1946; (2588) 1?, Tapia, 1946; (2610) 1H, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1946; (3224) 1H, El Timbó, 1946; (12338) 1H, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1961; (7184) 1M, Cerros de Tafí, 1949.
 - en pedestal: (230) 1M-1H, Concepción, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Empidonomus aurantioatrocristatus

TUQUITO GRIS / CROWNED SLATY-FLYCATCHER / PEITICA-DE-CHAPÉU-PRETO

- **HÁBITAT:** Bosques, monte, espinal y sabanas de tipo chaqueño.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país exceptuando la cordillera, por el este de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza hasta el norte de Neuquén y Río Negro, sur de La Pampa y Buenos Aires. Migra al norte en otoño/ invierno.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007a) Abra Rica, Mista (Leales), Burruyacú y Piedra Tendida (Burruyacú), Viaducto Saladillo (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burruyacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Burruyacú y El Sunchal (Burruyacú), Monteros (Monteros), Leales (Leales), San Pedro de Colalao (Trancas); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (185) 1M, sin localidad, 1927; (186) 1H, Santa Rosa de Leales, 1915; (310) 1M, sin localidad, 1900; (311) 1H, sin localidad, 1905; (312) 1H, sin localidad, 1898; (313) 1H, sin localidad, 1928; (1165, 2255, 2291, 2294, 2337, 2351, 2399, 2504, 2509, 3154 y 1624, 2060, 2268, 2344, 3142, 3163, 16041) 10M y 7H, El Saladillo, 1946; (1270, 1928 y 1929) 2H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1570, 2578 y 1585, 2046) 2M y 2H, Tapia, 1946; (2008) 1M, Leales, 1946; (2049, 2050, 2051 y 2060) 3M y 1H, Trancas, 1946; (2062) 1H, Dpto. Trancas, sin localidad, 1946; (2074) 1H, El Infiernillo, 1946; (2615) 1M, Las Cañitas, 1946; (2618) 1H, Nueva España, 1946; (5363) 1M, El Guardamonte, 1948; (11245) 1M, El Guardamonte, 1959.
 - en pedestal: (218) 1M-1H, Concepción, 1910.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En del Hoyo *et al.* (2019) como *Griseotyrannus aurantioatrocristatus*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Tyrannus melancholicus

SURIRÍ REAL / TROPICAL KINGBIRD / SUIRIRI

- **HÁBITAT:** Estrato alto en bosques, sabanas, claros de selvas, arboledas y áreas rurales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Migra desde Estados Unidos hasta Mendoza, este de San Luis, norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. Posiblemente en Península Valdés e Islas Malvinas.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo

(Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burruyacú), Colombres (Cruz Alta); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (Juan Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (257) 1M, sin localidad, 1900; (258) 1M, sin localidad, 1904; (261 y 6084) 1M y 1H, sin localidad, 1928; (1556 y 1561) 1M y 1H, La Aguadita, 1946; (1617) 1M, Nueva España, 1946; (1915, 1921, 2215 y 1916) 3M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (1989) 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (2055 y 2063) 1M y 1H, Dpto. Trancas, sin localidad, 1946; (2092) 1H, Dpto. Lules, 1946; (2222, 2296, 2307, 2312, 2374, 2404, 2520, 2521, 2546, 3234 y 2320, 2321, 2430, 2506, 2574, 2706, 3243) 10M y 7H, El Saladillo, 1946; (5037) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1947; (6318, 6337 y 6347) 2M y 1H, San Pedro de Colalao, 1950; (6323) 1H, Las Tacanas, 1950; (10883) 1H, San Pedro de Colalao, Finca Buena Vista, 1958; (17214) 1H, El Vizcacheral, 1993.

- en pedestal: (223) 1M-1H, Concepción, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Tyrannus savana

TIJERETA / FORK-TAILED FLYCATCHER / TESOURINHA

- HÁBITAT: Sabanas, bosques, estepas arbustivas y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Chubut excepto en la zona cordillerana alta. Probablemente en Santa Cruz e Islas Malvinas. Las poblaciones del sur migran al norte en bandadas durante el otoño.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo

(Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Capllonch *et al.* (2009) (Cruz Alta); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (419) 1M, Santa Rosa de Leales, 1915; (2484) 1?, San Pedro de Colalao, 1946.

- en pedestal: (278) 1M, Concepción, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Tyrannus tyrannus

SURIRÍ BOREAL / EASTERN KINGBIRD

- HÁBITAT: Estrato alto en selvas y bosques del norte.

- DISTRIBUCIÓN: Desde el este de Salta y Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones hasta el norte de Córdoba, San Luis y Mendoza, La Pampa y centro de Buenos Aires. Migrador desde América del Norte, llega al país en la primavera.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (291) 1M, Santa Rosa de Leales, 1915; (292, 297) 2M, sin localidad, 1900; (294) 1M, Las Cuchillas, 1906; (295) 1M, sin localidad, 1943; (296) 1?, sin localidad, sin fecha; (418) 1M, sin localidad, 1914; (1124) 1H, Las Cañitas, 1946; (1644) 1H, El Saladillo, 1946; (1664) 1M, Santa Rosa de Leales, 1946; (1917 y 1918, 1919 y 2448) 1H y 2M y 1?, San Pedro de Colalao, 1946; (2742) 1M, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (6086) 1M, sin localidad, 1948; (6327) 1H, San Pedro de Colalao, 1950; (8327) 1M, El Guardamonte, 1953; (9187) 1M, Rearte Norte, 1954; (10383) 1H, San Pedro de Colalao, 1956; (10422) 1M, La Angostura, 1957; (11279) 1M, San Pedro de Colalao, Finca Buena Vista, 1958; (15315) 1M, S/Dpto., El Cadillal, 1992; (17264) 1H, Horco Molle, 2015.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Casiornis rufus

BURLISTO CASTAÑO / RUFIOUS CASIORNIS / MARIA-FERRUGEM

- HÁBITAT: Estrato medio en selvas, bosques y sabanas del norte.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta, Formosa y Misiones hasta Tucumán, Chaco y norte de Corrientes. Probablemente en el norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Trancas, San Pedro de Colalao (Trancas).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2015 y 2022) 1M y 1H, El Saladillo, 1946; (2559) 1?, sin localidad, 1946.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiarchus tuberculifer

BURLISTO CORONA NEGRA / DUSKY-CAPPED FLYCATCHER /
MARIA-CAVALEIRA-PEQUENA

- HÁBITAT: Selvas en Misiones y en las Yungas.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y en el extremo noroeste de Misiones.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) El Indio (Monteros), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), Chasquivil (Tafí Viejo), Cochuna (Chicligasta); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tafí del Valle (Tafí del Valle), El Siambón, San José de Chasquivil (Tafí Viejo), La Banderita (Chicligasta), Sierra de Medina, El Sunchal (Burruyacú), Horco Molle (Yerba Buena), Los Chorizos en el Parque Nacional Campos de Los Alisos (Chicligasta); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (299, 300) 2M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (1074, 1254) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (9172) 1M, Tafí del Valle, 1955.

- en pedestal: (216) 1H, Las Pavas, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiarchus swainsoni

BURLISTO PICO CANELA / SWAINSON'S FLYCATCHER / IRRÉ

- HÁBITAT: Bosques y montes chaqueños, espinal y selva.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Mendoza, norte de La Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe y Río Negro y norte de Buenos Aires. Migran al norte en otoño.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Capllonch (2007a) Piedra Tendida (Burrucacú); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Sunchal (Burrucacú), Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (20) 1M, Dpto. Simoca, Monteagudo, 1914; (270 y 274) 1M y 1H, Tapia, 1901; (1151, 1622, 1645, 1656, 2040, 2285, 2322, 2329, 2365, 2420, 2436, 3141, 3160 y 1636, 1638, 2031, 2057, 2058, 2059, 2282, 2310, 2315, 2349, 2352, 2353, 2372, 2412, 3229) 13H y 15M, El Saladillo, 1946; (1434) 1H, Leales, 1946; (1632) 1?, Nueva España, 1946; (2557) 1M, El Timbó, 1946; (2606) 1M, Dpto. Leales, Río Colorado, 1946; (12335) 1M, Chulca 1961; (12562) 1M, Quebrada Los Matos, 1962.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiarchus tyrannulus

BURLISTO COLA CASTAÑA / BROWN-CRESTED FLYCATCHER /

MARIA-CAVALEIRA-DE-RABO-ENFERRUJADO

- HÁBITAT: Selvas, selvas en galería, bosques y sabanas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta el norte de Neuquén, centro de San Luis y Córdoba y norte de Santa Fe y Corrientes.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2007a) La Florida, Playa Larga (Monteros), Piedra Tendida, Burruyacú (Burruyacú), Río Piedras (Yerba Buena), San Miguel de Tucumán (Capital), Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (18) 1H, sin localidad, 1928; (19, 7781) 2M, sin localidad, 1927; (171) 1M, sin localidad, 1938; (263) 1M, Tapia, 1901; (264) 1M, sin localidad, 1907; (267) 1H, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1903; (268) 1M, sin localidad, 1898; (881, 1271) 2H, San Pedro de Colalao, 1946; (913) 1H, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1035, 1102, 1133, 1160, 1327, 1620, 2381, 2416 y 1038, 1384, 2062) 8M y 3H, El Saladillo, 1946; (1118 y 1168) 1M y 1H, Las Cañitas, 1946; (1435) 1M, Leales, 1946; (1580) 1M, Tapia, 1946; (1613) 1H, Nueva España, 1946; (2061) 1H, Trancas, 1946; (2271) 1M, Yerba Buena, 1946; (2579) 1M, El Saladillo, 1959; (11281) 1M, Quebrada Los Cainzos, 1959.
 - en pedestal: (221) 1M-1H, Concepción, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiophobus fasciatus

MOSQUETA ESTRIADA / BRAN-COLORED FLYCATCHER / FILIPE

- HÁBITAT: A baja y media altura en bosques, selvas, espinal, selva en galería y arboledas, a menudo cerca del agua.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando zona montañosa del oeste, por el este de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, en San Luis, norte de La Pampa hasta el sur de Buenos Aires. La población del sur migra al norte en otoño/ invierno.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2010) Horco Molle (Yerba Buena).

Buena), El Sunchal (Burruyacú), Colombres (Cruz Alta), Monteagudo (Simoca); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burruyacú); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Arroyo Mista (Leales), Vipos, San Pedro de Colalao (Trancas), Chilcas, El Sunchal (Burruyacú), Horco Molle (Yerba Buena), Las Talitas, Banda del Río Salí (Cruz Alta); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (245) 1M, sin localidad, 1928; (334) 1M, sin localidad, 1903; (335) 1M, sin localidad, 1900; (336) 1H, sin localidad, 450 m snm, 1899; (1936, 1940 y 2235, 2240) 2H y 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (7657) 1M, sin localidad, 1929; (8343) 1?, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1953; (8478) 1H, Laguna Calimayo, La Reducción, 1953; (9135) 1H, Rearte Norte, 1954; (9365) 1M, sin localidad, 1927; (9707) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Cerro San Javier, 1955; (12570) 1M, San Pedro de Colalao, 1962; (15154) 1M, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986; (17480) 1?, Barrio Santa Inés, 2006.

- en pedestal: (209) 1M, Concepción, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Ochthoeca oenanthoides

PITAJO CANELA / D'ORBIGNY'S CHAT-TYRANT

- HÁBITAT: Prepuna y estepas arbustivas altoandinas del noroeste en quebradas áridas con poca vegetación e incluso viviendas aisladas con arboleda.

- DISTRIBUCIÓN: Entre los 2000 y 3500 m snm, desde Jujuy, oeste de Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja hasta el norte de San Juan.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Ampimpa, Sierra de Quilmes, El Remate, Colalao del Valle, Tafí del Valle, Cerro Muñoz (Tafí del Valle); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (393) 1M, Colalao del Valle, quebrada, 1916; (8977) 1M, entre El Infiernillo y Amaicha del Valle, 1955.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Ochthoeca leucophrys

PITAJO GRIS / WHITE-BROWED CHAT-TYRANT

- **HÁBITAT:** Cercanías de bosques montanos, quebradas húmedas arboladas y arbustadas y periferias de poblados con árboles dispersos y cercas vivas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Entre 2000 y 3000 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Quebrada del Blanquito, Quebrada del Churqui (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Indio (Monteros), El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) La Ciénaga (Tafí Viejo), Mula Muerta, El Infiernillo (Tafí del Valle), La Banderita (Chicligasta), Sierras de Medina, Río Nio, Piedra Tendida, Chorrillos (Burrucacú), Horco Molle (Yerba Buena), Las Juntas (Trancas), Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Salvador (2015) El Infiernillo 3000 m snm (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (383) 1H, Villa Nogués, 1905; (382) 1M, sin localidad, 1898; (384, 385) 2M, La Ciénaga, 1903; (1054 y 1055, 4055) 1H y 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (2052) 1H, El Infiernillo, 1946; (4778) 1M, Cerros de Tafí, 1947; (5048) 1H, Tafí del Valle, 1947; (5218) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1947; (8593) 1H, El Infiernillo, 1954; (10400) 1H, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1957; (17047) 1M, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.
 - en pedestal: (248) 1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1911.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sublegatus modestus

SUIRIRÍ PICO CORTO / SOUTHERN SCRUB-FLYCATCHER / GUARACAVA-MODESTA

- **HÁBITAT:** Sabanas, arbustales, bosques y estepas arbustivas, siempre dentro de la vegetación.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la zona cordillerana, por el este de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza hasta centro de Neuquén y Río

Negro, sur de Buenos Aires, este de la Pampa y desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Amaicha del Valle, Colalao del Valle (Tafí del Valle), Leales (Leales), Burruyacú (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (15276) 1M, Campo Norte, 1991.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyS y AA: NA.

Pyrocephalus rubinus

CHURRINCHE / VERMILION FLYCATCHER / PRÍNCIPE

- HÁBITAT: Sabanas, bosques, estepas arbustivas, espinal, y áreas rurales semiarboladas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Neuquén y Río Negro, las poblaciones más australes se desplazan al norte en invierno, llegando hasta el norte de Sudamérica.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Capllonch *et al.* (2009) Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), San Miguel de Tucumán (Capital), Agua Salada (Leales); Alderete y Capllonch (2010) Agua Salada (Leales); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (322, 324 y 327) 2M y 1H, sin localidad, 1929; (323) 1M, sin localidad, 1903; (329) 1H, Laguna de Malvinas, 1902; (330) 1H, sin localidad, 1901; (822) 1M, El Guardamonte; 1946; (1599) 1M, Nueva España, 1946; (2010) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (5315) 1M, El Guardamonte, 1948; (8329) 1M, El Guardamonte, 1953; (9670) 1M, Las Tacanas, 1955.
 - en pedestal: (229) 1M-1H, Concepción, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAdyS y AA: NA.

Fluvicola albiventer

VIUDITA BLANCA / BLACK-BACKED WATER-TYRANT /
LAVADEIRA-DE-CARA-BRANCA

- **HÁBITAT:** Sabanas y arbustales inundados, esteros, bañados y lagunas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país hasta Tucumán y Santiago del Estero, norte de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Algunas poblaciones migran al norte en otoño/ invierno.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Río Calera (Burruyacú), Monteagudo (Simoca), Arroyo Mista (Leales), (Cruz Alta), Dique El Cadillal (Tafí Viejo).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (116 y 121) 1M y 1 H, Laguna de Malvinas, 1903; (2540) 1H, Malvinas (6 km SE de San Pablo), 1946; (11372) 1M, Laguna de los Aguirre, 1959; (15152) 1H, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986.
 - en pedestal: (204) 1M y 1H, Gastona, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) como subespecie de *Fluvicola pica*, ahora son especies separadas, en inglés PIED WATER-TYRANT. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Lessonia rufa

SOBREPUESTO / AUSTRAL NEGRITO

- **HÁBITAT:** Áreas abiertas con praderas húmedas y pedregullo, bordes de lagunas y campos arados, generalmente cerca del agua, incluso en costas marinas y lagunas altoandinas del noroeste.
- **DISTRIBUCIÓN:** Como residente en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, Tierra del Fuego e islas Malvinas, en otoño/ invierno migran al norte llegando a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Formosa, Corrientes y centro de Entre Ríos.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007a) El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) El Cadillal (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Río Salí (S/Dpto.), Monteagudo (Monteros), Leales, Los Gómez, Arroyo Mista (Leales), Dique El Cadillal (Tafí Viejo), Río Calera (Burruyacú); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse

Escaba (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (13 y 15) 1H y 1M, sin localidad, 1900; (223) 1M, Tafí Viejo, 1946; (514, 1008) 2M, Río Salí, 1946; (4531) 1?, El Timbó, 1947; (s/nº) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946.

- en pedestal: (234) 1M, Dpto. Chicligasta, Santa Cruz, 1910; (234) 1H-1?, Concepción, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés ROFOUS-BACKED NEGRITO. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Lessonia oreas

SOBREPUESTO ANDINO / ANDEAN NEGRITO

- HÁBITAT: Áreas abiertas con suelos desnudos o vegetación muy dispersa, costas de lagos.

- DISTRIBUCIÓN: Entre 2000 y 4000 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca hasta San Juan.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) Cerro Muñoz, cumbres de Tafí, La Angostura (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Huaca Huasi (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres del Aconquija (S/Dpto.), Cumbres Calchaquíes y de Quilmes, Dique La Angostura (Tafí del Valle), Río Los Sosa (Monteros), Raco (Tafí Viejo).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (213) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (9027) 1M, Casa de Piedra, 1954.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida como subespecie de *Lessonia rufa*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Hymenops perspicillatus

PICO DE PLATA / SPECTACLED TYRANT / VIUVINHA-DE-ÓCULOS

- HÁBITAT: Humedales y sus cercanías, pajonales y pastizales densos anegables, tanto en llanuras como en quebradas de altura y serranías.

- DISTRIBUCIÓN: En todo el país hasta el sur de Santa Cruz, como residente desde el

norte del país, excepto Misiones, hasta el norte de Neuquén y sur de Buenos Aires. En la patagonia como migrante que se mueve al norte en otoño/ invierno.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Cuenca del Río Salí (S/Dpto.), Cuenca del Río Santa María (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (3) 1M, sin localidad, 1902; (4) 1M, sin localidad, 1901; (8) 1M, sin localidad, 1904; (11) 1H, sin localidad, 1938; (594 y 646) 1M y 1H, Río Salí, 1946.
 - en pedestal: (205) 1M-1?, Dpto. Chicligasta, Santa Cruz, 1910; (205) 1H, Iltico, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Knipolegus signatus

VIUDITA PLOMIZA / JELSKI'S BLACK-TYRANT

- HÁBITAT: Estrato medio en selvas, bosques montanos y sus cercanías.
- DISTRIBUCIÓN: Entre 1000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) El Indio, Playa Larga (Monteros), Cochuna (Chicligasta), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), Chasquivil (Tafí Viejo), Sierra del Cajón (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz *et al.* (2013a) Chasquivil, El Taficillo (Tafí Viejo), La Banderita (Chicligasta), Sierra de Medina (Burruyacú), Río Los Sosa, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Parque Sierra de San Javier (Yerba Buena), San Pedro de Colalao (Trancas); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (381) 1M, La Hoyada, 1902; (390) 1?, Villa Nougues, 1901; (391) 1M, Villa Nougues, San Pablo, 1901; (3168) 1M, Cumbres de Tafí, 1946; (6104) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (6573, 6574, 6577, 6591 y 6581) 4M y 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (7716) 1H, sin localidad, 1929; (9704) 1?, Tafí del Valle, 1956; (14538, 14539) 2H, Alto de La Perdiz, Cumbres de Cabra Horco, 1977; (17390) 1H, Cuesta de Chasquivil, 2004.
 - en pedestal: (217) 1M-1H, Las Pavas, 1911.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Knipolegus striaticeps

VIUDITA CHAQUEÑA / CINEREOUS TYRANT

- HÁBITAT: Bosques y montes chaqueños.
- DISTRIBUCIÓN: Desde Jujuy, Salta y Formosa, por el este de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja hasta el norte de San Luis, norte de Córdoba y Santa Fe.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007a) El Cadillal, Ticucho, Río Tapia, Ruta 9 (Trancas), Monteagudo (Simoca); Alderete y Capllonch (2010) Ticucho, Tapia (Trancas), Monteagudo (Simoca) Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Remate, El Pichao, en los Bañados de Amaicha (Tafí del Valle), Monteagudo (Simoca), Vipos, Ticucho (Trancas), Burreuyacú (Burreuyacú), Horco Molle (Yerba Buena); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burreuyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (63) 1M, Tapia, 1946; (244) 1M, Colalao del Valle, 1916; (259) 1M, Los Romanos, 1946; (367) 1M, Tapia, 1902; (368) 1M, El Manantial, 1902; (369 y 372) 1H y 1M, Tapia, 1901; (910) 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (4786) 1M, Los Herrera, 1947; (5316) 1M, El Guardamonte, 1948; (6096) 1M, S/Dpto. El Cadillal, 1951; (9849) 1M, Agua Rosada, 1956.
 - en pedestal: (666) 1M, Concepción, 1918; (666) 1H, Concepción, 1917.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Knipolegus aterrimus

VIUDITA COMÚN / WHITE-WINGED BLACK-TYRANT / MARIA-PRETA-BATE-RABO

- HÁBITAT: Monte y espinal, arboledas exóticas bajas y dispersas.
- DISTRIBUCIÓN: En una faja por el centro del país, exceptuando cordillera, desde Jujuy, Salta y Formosa hasta Santa Cruz y sur de Buenos Aires. En otoño/ invierno se desplazan al este del país, llegando hasta la Mesopotamia y el norte de Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2010) Las Juntas (S/Dpto.), Ticucho (Trancas), Bañado de Amaicha (Tafí del Valle), La Banderita (Chicligasta); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Las Juntas, Ticucho, Río Tapia (Trancas), bañados de Amaicha del Valle (Tafí del Valle), La Banderita (Chicligasta), Horco Molle (Yerba Buena), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Monteagudo (Simoca); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (196, 1581) 2M, Tapia, 1946; (399) 1M, Dpto. Burruyacú, sin localidad, 1946; (401) 1?, Ancajuli, 1902; (403, 410) 2M, sin localidad, 1901; (408) 1M, Las Cuchillas, 1906; (617, 1096 y 619,1097) 2M y 2H, San Pedro de Colalao, 1946; (1123) 1H, Las Cañitas, 1946; (5038) 1M, Tafí del Valle, 1947; (5311) 1M, El Guardamonte, 1948; (5343) 1M, San Pedro de Colalao, 1948; (5357) 1M, El Infiernillo, 1948; (5461) 1M, Tafí del Valle, 1948; (9173) 1H, Tafí del Valle, 1955; (10349) 1M, Dpto. Trancas, sin localidad, 1956; (11229) 1H, Amaicha del Valle, 1958.
 - en pedestal: (210) 1H, Ingenio Luján, 1914.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Knipolegus hudsoni

VIUDITA CHICA / HUDSON'S BLACK-TYRANT / MARIA-PRETA-DO-SUL

- HÁBITAT: Bosques y estepas arbustivas, también cerca del agua.
- DISTRIBUCIÓN: Centro-sur del país, en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos. En otoño-invierno la especie migra al norte, llegando a Perú, Bolivia y Paraguay.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch *et al.* (2014) El Arbolar 8 Km al N de El Pichao, 15 Km al O de Colalao del Valle, Amaicha del Valle (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Narosky e Yzurieta (2010); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: VU.

Satrapa icterophrys

SUIRIRÍ AMARILLO / YELLOW-BROWED TYRANT / SUIRIRI-PEQUENO

- **HÁBITAT:** En sabanas, bosques montanos, selvas en galería, monte, espinal y arboledas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta San Luis, noreste de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Tapia, Trancas); Capllonch (2007b) La Quebradita, Río Blanquito (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Capllonch *et al.* (2009) Los Romanos (Leales), Chulca (Trancas), El Sunchal (Burruyacú), Tafí del Valle, La Ciénaga (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2010) El Sunchal (Burruyacú), La Ciénaga (Tafí Viejo), Dique La Angostura (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burruyacú); Capllonch *et al.* (2011) El Infiernillo (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (248) 1M, Los Romanos, 1946; (376, 378) 2M, sin localidad, 1902; (1433) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (2230) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (17045) 1M, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.
 - en pedestal: (224) 1M-1H, Concepción, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Muscisaxicola maculirostris

DORMILONA CHICA / SPOT-BILLED GROUND-TYRANT

- **HÁBITAT:** Estepas altoandinas y altoserranas, prepuna y valles cordilleranos. En invierno también en serranías.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde Jujuy hasta el sur de Tierra del Fuego. Como residente en el noroeste del país hasta San Juan y serranías de Córdoba y con poblaciones migrantes en la zona cordillerana desde Neuquén hasta Tierra del Fuego.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2007a) El Infiernillo, Tafí del Valle (Tafí del Valle), Río Los Sosa altura del Indio, Piedras Coloradas (Monteros), Río Chulca (Trancas); Capllonch (2007b) Cumbres del Aconquija, Cumbres Calchaquíes, Tafí del Valle (Tafí del Valle), Río Los Sosa, El Indio, Piedras Coloradas (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) El Indio (Monteros); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Río de La Ciénaga en Tafí del Valle, Río Amaicha, Río Santa María, El Molle (Tafí del Valle), Piedras Coloradas, El Indio (Monteros).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (39) 1M, Río Salí, 1904; (41) 1H, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1903; (947, 974) 2H, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1070, 1099 y 1079) 2H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (5045, 5051 y 5045, 5052, 5053) 2H y 3M, Tafí del Valle, 1947; (5469, 5479, 5480) 3M, Tafí del Valle, 1948; (8606) 1H, Amaicha del Valle, 1954; (11143) 1?, Amaicha del Valle, 1958.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAdyS y AA: NA.

Muscisaxicola cinereus

DORMILONA CENICIENTA / CINEREOUS GROUND-TYRANT

- **HÁBITAT:** Estepas altoandinas, prepuna y cercanías de arroyos montanos con vegetación dispersa y pedregullo, costas de lagunas altoandinas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. Entre 3500 y 4000 m snm, desde Jujuy por el este de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén. También en sierras de Córdoba y San Luis.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007a) Huaca-Huasi (Tafí del Valle), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta); Capllonch (2007b) Lagunas de Huaca-Huasi en Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Huaca-Huasi (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo, Lara, Laguna Los Amaicheños, Sierra de Quilmes (Tafí del Valle), La Ciudadita (Chicligasta), Lagunas de Huaca-Huasi, La Ciénaga (Tafí Viejo); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (34) 1M, Dpto. Lules, Cumbres de Mala Mala, 1901; (35) 1M, Dpto. Lules, Cumbres de Mala Mala, 1904; (5423, 5355) 2M, El Infiernillo, 1948.
 - en pedestal: (467) 1M-1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1912.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Muscisaxicola flavinucha

TIJERILLA / OCHRE-NAPED GROUND-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas altoandinas y altoserranas con roqueríos, pastizal disperso y pedregullo, también en arroyos de montaña.
- DISTRIBUCIÓN: Por la zona cordillerana, desde Salta hasta Tierra del Fuego. En otoño migran al norte hasta Jujuy, Salta, Tucumán, centro de Catamarca, La Rioja y San Juan.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007a) Lagunas de Huaca-Huasi en el Cerro El Negrito (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Laguna de Huaca-Huasi (Tafí Viejo), Laguna los Amaicheños (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (23) 1M, Cerro del Pabellón, 1903.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés WHITE-NAPED XENOPSARIS. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Muscisaxicola rufivertex

DORMILONA GRIS / RUFIOUS-NAPED GROUND-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas altoandinas, prepuna, arroyos de montaña y pastizales altoserranos.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre 3000 y 4000 m snm desde norte de Jujuy por el oeste de Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y norte de Mendoza. También en Sierras de Córdoba y San Luis.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007a) La Ciénaga (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) La Ciénaga, Lagunas de Huaca-Huasi (Tafí Viejo), Cerro Muñoz (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (7155) 1M, Laguna El Negrito, 1948.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Muscisaxicola maclovianus

DORMILONA CARA NEGRA / DARK-FACED GROUND-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas andinas, bosque araucano en roqueríos y arbustales cerca del agua, costas de mar y praderas húmedas. En migración se la puede observar en planicies y arboledas abiertas. Se posa en topes de árboles y construcciones.
- DISTRIBUCIÓN: Desde sur de Mendoza y San Luis, este de Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En otoño migra al centro y norte de Jujuy, Salta, norte de Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: sin registros.
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (27) 1H, Dpto. Lules, Cumbres de Mala Mala, 1904.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Muscisaxicola albilora

DORMILONA CEJA BLANCA / WHITE-BROWED GROUND-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas altoandinas y altoserranas con vegetación dispersa y pedregullo. Cercanías de arroyos montanos.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el oeste de Neuquén hasta Santa Cruz por la zona cordillerana. En otoño migra al norte hasta Catamarca, Tucumán y sudoeste de Santiago del Estero. También en Islas Malvinas.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007a) Tafí del Valle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Lagunas de Huaca-Huasi (Tafí Viejo).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (5060) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1947; (5189) 1H, Laguna Calchaquí, 1947; (15308) 1M, Laguna El Negrito, 1948.
 - en pedestal: (718) 1M, Las Pavas, 1925.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Muscisaxicola capistratus

DORMILONA CANELA / CINNAMON-BELLIED GROUND-TYRANT

- **HÁBITAT:** Estepas húmedas en la Patagonia andina. En invierno pastizales altoandinos y altoserranos.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde Neuquén hasta Chubut por la zona cordillerana. Desde Santa Cruz a Tierra del Fuego llegando a la costa. En otoño migra hacia el este hasta el centro de Río Negro y al norte hasta Jujuy, Chaco, oeste de Santiago del Estero y Tucumán.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2005) Cumbres de Tafí (S/Dpto.), Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.), Altiplanicie de Huaca-Huasi (S/Dpto.), Ciénaga Grande (S/Dpto.); Capllonch (2007a) Lagunas de Huaca-Huasi, La Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch (2007b) La Ciénaga (Tafí Viejo), Cumbres de Tafí, Lagunas de Huaca-Huasi en las Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Lagunas de Huaca-Huasi (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo (Tafí del Valle), Lagunas de Huaca-Huasi, La Ciénaga (Tafí Viejo).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (28) 1M, Cerro Muñoz, 1906; (2076) 1?, El Infiernillo, 1946.
 - en pedestal: (235) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Muscisaxicola frontalis

DORMILONA FRENTE NEGRA / BLACK-FRONTED GROUND-TYRANT

- **HÁBITAT:** Estepas pedregosas, altoandinas y altoserranas.
- **DISTRIBUCIÓN:** En Mendoza, Neuquén y Río Negro. En otoño migra por el Noroeste del país.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** sin registros.
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (31) 1M, Cerro Muñoz, 1906.
 - en pedestal: (9) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1918.
- **LITERATURA:** de la Peña (2019c).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Xolmis irupero

MONJITA BLANCA / WHITE MONJITA / NOIVINHA

- **HÁBITAT:** Sabanas, bosques y áreas rurales con arbustales y arboledas dispersas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, excepto Misiones, hasta al norte de Río Negro, Chubut y Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alderete y Capllonch (2010) Los Puestos (Leales); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) 7 de Abril (Burruyacú), Ticucho, Vipos (Trancas), Monteagudo (Simoca), Arroyo Mista (Leales), Quilmes (Tafí del Valle); Echevarría y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (287 y 288) 1M y 1H, Los Gómez, 1946; (468) 1H, Río Salí, 1902; (469) 1M, Los Sarmientos, 1911; (472) 1M, sin localidad, 1901; (473) 1M, Concepción, 1914; (574 y 991) 1M y 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (614 y 1927) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2084) 1H, Amaicha del Valle, 1946; (2747) 1H, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (9124) 1M, Las Juntas, 1954; (10386 y 10387) 1H y 1M, Las Tipas, 1956.
 - en pedestal: (202) 1M-1H, Concepción, 1911.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Nengetus cinereus

MONJITA GRIS / GRAY MONJITA / PRIMAVERA

- **HÁBITAT:** Sabanas, palmares, bosques y plantaciones. En áreas abiertas y cerca del agua.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde Jujuy, Salta, Formosa y Misiones hasta el norte de Catamarca y Córdoba, sur de Santa Fe y el norte y la costa de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Ortiz *et al.* (2013a) Leales (Leales).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (488) 1?, sin localidad, 1899.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta, 2010 como: *Xolmis cinereus*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Neoxolmis coronatus

MONJITA CORONADA / BLACK-CROWNED MONJITA

- HÁBITAT: Bosques, estepas arbustivas y áreas abiertas con arbustales y matorrales dispersos, campos con arboledas.
- DISTRIBUCIÓN: En el centro del país, desde La Rioja y Córdoba hasta sur de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, sur de Buenos Aires, norte de Chubut. En otoño/ invierno migra al norte hasta Salta, Formosa y Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alderete y Capllonch (2010) Agua Salada (Leales); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Tapia (Trancas), (Cruz Alta), Leales, Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca), La Cocha (La Cocha), Amaicha del Valle (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (253) 1H, Los Romanos, 1946; (345) 1H, Mariño, 1946; (484, 485) 2M, sin localidad, 1902; (486) 1H, sin localidad, 1900; (7291) 1H, Tapia, 1911.
 - en pedestal: en pedestal: (236) 1M-1H, Concepción, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta, 2010 como: *Xolmis coronatus*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Agriornis montanus

GAUCHO SERRANO / BLACK-BILLED SHRIKE-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas altoandinas, inclusive en áreas cultivadas, prepuna y pastizales alto serranos.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre 2000 y 4000 m snm en Jujuy, Salta, este de Tucumán por el este de San Juan y Mendoza, Río Negro y Chubut hasta el sur de Santa Cruz. También en las sierras de Córdoba y San Luis. Probablemente en Islas Malvinas.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2005) Cumbres de Tafí (S/Dpto.), Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.),

Altiplanicie de Huaca-Huasi (S/Dpto.), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch (2007a) La Angostura, El Infiernillo, Tafí del Valle (Tafí del Valle), La Ciénaga, Anfama (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.), Cerro el Negrito, Lara, El Infiernillo (Tafí del Valle), La Ciénaga, Anfama (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo, Tafí del Valle, Piedras Blancas, Lara, El Pichao, Mula Muerta (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (491) 1M, La Ciénaga, 1903; (495) 1M, Cuesta de Mala Mala, 1901; (496) 1M, La Ciénaga, 1901; (2048 y 2085) 1H y 1M, El Infiernillo, 1946; (5501 y 5502) 1M y 1H, El Infiernillo, 1948; (7137) 1?, Tafí del Valle, 1948; (9688, 9690) 2H, Tafí del Valle, 1956; (15052) 1M, El Infiernillo, 1987.

- en pedestal: (356) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910; (356) 1H, Concepción, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Agriornis albicauda

GAUCHO ANDINO / WHITE-TAILED SHRIKE-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas altoandinas en el Aconquija, en roqueríos y arbustales dispersos.

- DISTRIBUCIÓN: Entre 3500 y 4500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2005) Cumbres de Tafí (S/Dpto.), Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.), Altiplanicie de Huaca-Huasi (S/Dpto.), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch (2007a) La Ciénaga, Valle de Tafí ruta 307 (Tafí del Valle), Anfama (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres del Aconquija (S/Dpto.), Cumbres Calchaquíes, La Ciénaga (Tafí del Valle), Anfama (Tafí Viejo); Moschione (2007) Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Parque Provincial Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle/Trancas), El Infiernillo (Tafí del Valle), Cuesta del Clavillo (Chicligasta), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/Monteros), Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres del Aconquija (S/Dpto.), Cumbres Calchaquíes, Cerro El Pabellón, Piedras Blancas, La Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (474) 1M, Cerro Muñoz, 1906; (7969, 7972) 2M, Tafí del Valle, 1952.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) y en Brandán y Navarro (2009) como: *Agriornis andicola*. UICN: VU; MAyDS y AA: EN.

Agriornis micropterus

GAUCHO COMÚN / GRAY-BELLIED SHRIKE-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas arbustivas, patagónicas y altoandinas, en sitios abiertos con pastizales y roqueríos. En invierno en campos y sabanas.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre 2000 y 4000 m snm en Jujuy, oeste de Salta, Catamarca y Tucumán y en el sur de Neuquén, La Pampa, Buenos Aires hasta el sur de Santa Cruz. En otoño la población del sur migra al norte hasta Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007a) La Ciénaga, Tafí Viejo (Tafí Viejo), Tapia (Trancas), La Angostura, El Infiernillo, Cerro Muñoz (Tafí del Valle); Capllonch (2007b) Cumbres Calchaquíes, La Angostura, El Infiernillo (Tafí del Valle), La Ciénaga (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres del Aconquija (S/Dpto.), Cumbres Calchaquíes, Cumbres de Quilmes, El Infiernillo (Tafí del Valle), Chasquivil, La Ciénaga (Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (494) 1H, sin localidad, 1929; (497) 1H, sin localidad, 1902; (498) 1M, sin localidad, 1899; (499) 1M, sin localidad, 1900; (1056) 1M, San Pedro de Colalao, 1943; (5444) 1H, El Infiernillo, 1948; (7805) 1M, Vipos, 1923.
 - en pedestal: (350) 1H, Toro Muerto, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Agriornis murinus

GAUCHO CHICO / LESSER SHRIKE-TYRANT

- HÁBITAT: Estepas arbustivas áridas y pastizales con arbustal, en campos y sabanas durante el invierno.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el sur de La Rioja por el este de San Juan, Mendoza, y por el oeste de San Luis hasta Neuquén y de ahí por el norte de Río Negro, sur de La Pampa y sur de Buenos Aires hasta Santa Cruz. En otoño/ invierno migra al norte hasta Jujuy, Salta, Formosa y Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007a) Amaicha del Valle, Tafí del Valle (Tafí del Valle), San Javier (Yerba Buena), Dique San Ignacio (La Cocha) y Dique El Cadillal (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2010) Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Ticucho (Trancas); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), San Pedro de Colalao

(Trancas), márgenes del Río Salí (S/Dpto.), Tafí del Valle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2015) Río Santa María, Amaicha del Valle (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (97, 118) 2H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (436 y 477) 1H y 1M, sin localidad, 1900; (476 y 482) 1M y 1H, sin localidad, 1902; (480 y 481) 1H y 1M, sin localidad, 1929; (485) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (569) 1H, Barranca Colorada, 1946; (888 y 889) 1H y 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1366) 1M, Las Cañitas, 1946; (4803) 1?, Río Salí, 1947; (5430, 5433, 5449, 5468 y 5452) 4M y 1H, Tafí del Valle, 1948; (12341) 1H, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1962.

– en pedestal: (267) 1M-1H, Concepción, 1910.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiotheretes striaticollis

BIRRO GRANDE / STREAK-THROATED BUSH-TYRANT

● HÁBITAT: Yungas.

● DISTRIBUCIÓN: Entre 500 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tafí del Valle (Tafí del Valle), La Ciénaga, Raco, Chasquivil, Anfama (Tafí Viejo), San Pedro de Colalao, Chulca (Trancas); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (483) 1M, Barranca Colorada, 1902; (492) 1H, sin localidad, 1898; (493) 1M, sin localidad, 1902; (1057, 1059) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (9171) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1955; (9697) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1956; (10743) 1H, Hualinchay, 1952; (12334) 1H, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1962.

– en pedestal: (220) 1M-1H, Iltico, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Lathrotriccus euleri

MOSQUETA PARDA / EULER'S FLYCATCHER / ENFERRUJADO

- HÁBITAT: Estrato bajo y medio en capueras, selvas, selvas en galería, arboledas y bosques.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta el este de La Rioja, norte de Córdoba, Santa Fe, sur de Entre Ríos hasta el norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Rumboll *et al.* (2005) Reserva de Aguas Chiquitas (Burruyacú); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena), Reserva Santa Ana, Río Chico (Río Chico), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida, Parque Provincial Cochuna, El Indio (Monteros), Reserva Aguas Chiquitas (Tafí Viejo), Parque Biológico Sierra de San Javier (S/Dpto.), Monteagudo (Simoca); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), El Indio, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Reserva Aguas Chiquitas (Burruyacú), Parque Nacional Los Alisos, Cochuna (Chicligasta), Reserva Santa Ana (Río Chico); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (316) 1M, Villa Nougés, San Pablo, 1901; (317, 318) 2M, Quebrada de Vipos, 1905; (319) 1?, Vipos, 1905; (496, 946) 2M, Timbó Viejo, 1946; (1149, 1150) 1M, El Saladillo, 1946; (1349, 1353) 2M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sayornis nigricans

VIUDITA DE RÍO / BLACK PHOEBE

- HÁBITAT: Ríos y arroyos pedregosos en yungas.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Rumboll *et al.* (2005) Reserva de Aguas Chiquitas (Burruyacú); Cocimano, Chani, Echevarria y Marano (2005) Río Los Sosa (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) arroyos del valle de Tafí (Tafí del Valle), Río Los Sosa (Monteros); Alderete y Capllonch (2010) Reserva Aguas Chiquitas (Tafí Viejo), Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico), El Indio, Playa Larga (Monteros), Piedra Tendida (Burruyacú), Chulca (Trancas), San Ignacio (La Cocha), Horco Molle (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Río Los Sosa, La Horqueta, Pueblo Viejo (Monteros), Río Las Pavas (Chicligasta), San Ignacio (La Cocha), Río Vipos, Choromoro, Tapia (Trancas), Río Calera (Burruyacú); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (413 y 416) 1H y 1M, La Hoyada, 1901; (417) 1M, Río Vipos, 1905; (6417) 1M, S/Dpto., El Cadillal, 1950; (8014) 1H, Cerro Negro, 1952; (12700) 1M, Río Chulca, 1964.
 - en pedestal: (212) 1M, Concepción, 1910; (212) 1H, Concepción, 1916.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Empidonax alnorum

MOSQUETA BOREAL / ALDER FLYCATCHER

- HÁBITAT: Selvas del noroeste y noreste.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. llega como migrante desde Norteamérica hasta Jujuy, Salta y Tucumán y por el este hasta Misiones y Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (15149) 1M, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986.
- LITERATURA: Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Contopus fumigatus

BURLISTO COPETÓN / SMOKE-COLORED PEWEE

- **HÁBITAT:** Yungas, bosques y sus ecotonos.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. En Jujuy, Salta y Tucumán y en las serranías de Córdoba.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle, Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), El Sunchal, Burruyacú (Burruyacú); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (303) 1M, Río Vipos, 1905; (314) 1H, Quebrada de Vipos, 1905; (12560, 12561) 2M, Quebrada Los Matos, 1962.
 - en pedestal: (219) 1M, Iltico, 1909.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés GREATER PEWEE. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Contopus cinereus

BURLISTO CHICO / TROPICAL PEWEE / PAPA-MOSCAS-CINZENTO

- **HÁBITAT:** Selvas, bosques y capueras.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. Desde Jujuy y Salta hasta Tucumán y otra en Misiones. Existen registros aislados en el noreste de Buenos Aires y el oeste de La Pampa.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Trancas, San Pedro de Colalao, Ticucho (Trancas), Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (340) 1M, Vipos, 1905; (341) 1M, sin localidad, 1898; (623) 1H, Concepción, 1917; (1108) 1M, La Reducción, 1946; (9440) 1M, San Pedro de Colalao, 1955; (10876) 1H, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1957; (10877) 1M, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1957; (12567) 1H, San Pedro de Colalao, 1962.
 - en pedestal: (623) 1M, Concepción, 1918.

- LITERATURA: Howard y Moore (2003); López-Lanús (2017); de la Peña (2019c); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

8. Familia Vireonidae

Tres especies en Argentina y dos en Tucumán.

Cyclarhis gujanensis

JUAN CHIVIRO / RUFIOUS-BROWED PEPPERSHRIKE / PITIGUARI

- HÁBITAT: Estrato alto en selvas, selvas en galería, bosques y arboledas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando zona montañosa del oeste, por el este de Catamarca, La Rioja y San Luis hasta el centro de La Pampa, sur de Santa Fe y Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), La Florida (Monteros), El Sunchal (Burruyacú), Vipos, Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (149) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (347) 1M, El Sunchal, 1948; (370 y 1922 y 2226) 1? y 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (391) 1H, Alpachiri, sin fecha; (601) 1M, Barranca Colorada-Río Salí, 1946; (815, 816) 2H, El Guardamonte, 1946; (936) 1H, El Saladillo, 1946; (1034) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (1508) 1M, sin localidad, 1898; (1514) 1M, sin localidad, 1927; (1515) 1M, sin localidad; 1902; (1516) 1?, Santa Bárbara, 1928; (2032) 1H, Dpto. Yerba Buena,

sin localidad, 1946; (7119) 1M, El Timbó, 1946; (9028, 9029) 2M, La Angostura, 1954; (9613) 1M, Chilca, 1955; (9615 y 9616) 1M y 1H, Hualinchay, 1955; (10493) 1M, Cerro del Campo, 1957; (10608) 1H, Rearte Norte, 1957; (11484) 1H, Quebrada Las Cuevas, 1959; (15324) 1M, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1993; (17216, 17217) 2M, El Vizcacheral, 1993.

– en pedestal: (276) 1M-1H, Iltico, 1909.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Vireo olivaceus

CHIVÍ COMÚN / RED-EYED VIREO

● HÁBITAT: Estrato medio y alto de selvas, bosques y arboledas.

● DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta San Juan norte de San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe y noreste de Buenos Aires. Algunas poblaciones migran hasta el norte de Sudamérica en otoño.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Rumboll *et al.* (2005) Piedra Tendida (Burrucacú), Dique San Ignacio (La Cocha); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burrucacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (1414 y 1973, 2438) 1H y 2M, Yerba Buena, 1946; (1521, 1526) 2M, Cerro de Tucumán, 1900; (2021) 1H, El Saladillo, 1946; (2047) 1H, Tapia, 1946; (2233 y 2476) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (2556) 1M, sin localidad, 1946; (2629) 1M, Las Cañitas, 1946; (6298, 6307) 2H, San Pedro de Colalao, 1950; (6590) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8462) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1953; (9441) 1?, Las Tacanas, 1955; (9629) 1M, Taficillo, 1955; (10930) 1M, Dpto. Trancas, Monte Bello, 1957; (10965) 1M, Agua Rosada, 1958.

– en alcohol: (17608) 1?, Los Chorizos, Parque Nacional Campo de los Alisos, 2011.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

9. Familia Corvidae

Tres especies en Argentina y una en Tucumán.

Cyanocorax chrysops

URRACA COMÚN / PLUSH-CRESTED JAY / GRALHA-PICAÇA

- **HÁBITAT:** Selvas, incluso en galería, monte chaqueño, isletas de monte, capueras y bosques.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta Catamarca, norte de La Rioja, sur de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, sur de Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burrucacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Trancas, Las Tipas (Trancas), Los Gómez (Leales); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (176) 1H, Tapia, 1946; (206) 1M, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1946; (548) 1H, Tranquitas, 1946; (588) 1H, Raco, 1946; (846, 3217) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (935) 1H, Los Nogales, 1946; (939, 1328, 1603, 2108, 2316, 2328, 2425, 2431, 2432, 2563 y 1324, 1601, 2427, 2429) 10H y 4M, El Saladillo, 1946; (1143) 1H, Las Cañitas, 1946; (1609, 1669) 2M, Yerba Buena, 1946; (2464) 1?, sin Dpto., Aconquija, 1946; (2483) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (2564) 1H, sin localidad, 1946; (2766) 1?, El Cajón, sin fecha; (2780) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (2909 y 2910) 1M y 1H, Cerro del Campo, 1940; (2912) 1H, Santa Bárbara, 1928; (2913) 1H, sin localidad, 1948; (9075) 1H, Las Juntas, 1954; (10845) 1M, Río Chulca, San Pedro de Colalao, 1958; (10846) 1M, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1957; (10938) 1M, Chilca, 1958; (14378) 1?, Cumbres del Aconquija, 1968.
 - en pedestal: (353) 1M, Iltico, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

10. Familia Hirundinidae

15 especies en Argentina y 12 en Tucumán.

Pygochelidon cyanoleuca

GOLONDRINA BARRANQUERA / BLUE-AND-WHITE SWALLOW /
ANDORINHA-PEQUENA-DE-CASA

- HÁBITAT: Diversos ambientes, incluso poblados y selvas.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el país.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital) y Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Cocimano *et al.* (2005) Río Los Sosa (S/Dpto.); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) El Infiernillo y Cerro Muñoz (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tafí del Valle, El Infiernillo (Tafí del Valle), Chasquivil y La Ciénaga (Tafí Viejo); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1286 y 1290) 1H y 1M, sin localidad, 1900; (5240) 1M, El Infiernillo, 1947; (5314) 1M, El Guardamonte, 1948; (7773) 1M, sin localidad, 1929; (8601, 8603 y 8602) 2M y 1H, El Infiernillo, 1954; (8604) 1H, El Infiernillo, 1953; (9373) 1?, sin localidad, 1927; (10979) 1H, Las Tipas, 1958.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Alopochelidon fucata

GOLONDRINA CABEZA ROJIZA / TAWNY-HEADED SWALLOW /
ANDORINHA-MORENA

- HÁBITAT: Sabanas, áreas rurales y humedales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta norte de Neuquén y Río Negro, sur de La Pampa y Buenos Aires. Posiblemente en Islas Malvinas.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Brandán (2005) Los Gutiérrez (Cruz Alta); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca), Río Salí (S/Dpto.), Dique El Cadillal (Tafí Viejo), Río Tapia (Trancas); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1282) 1M, sin localidad, 1899; (2000) 1H, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1946; (2101) 1M, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (2538 y 2543) 1M y 1H, Malvinas (6 km SE de San Pablo), 1946; (4811) 1M, Río Salí, 1947; (7772) 1M, sin localidad, 1929; (9368 y 9405) 1M y 1H, sin localidad, 1927.
 - en pedestal: (617) 1M-1H, Concepción, 1916.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Stelgidopteryx ruficollis

GOLONDRINA RIBEREÑA / SOUTHERN ROUGH-WINGED SWALLOW /
ANDORINHA-SERRADORA

- **HÁBITAT:** Cerca de ríos, arroyos y bañados.
- **DISTRIBUCIÓN:** Todo el norte del país desde Jujuy y Salta, hasta Tucumán, Chaco, sur de Santa Fe, Entre Ríos y noroeste de Buenos Aires. Las poblaciones de Entre Ríos migran al norte en invierno.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Río Calera (Burruyacú), El Cadillal (Tafí Viejo), Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena).
- **MATERIAL ESTUDIADO:** sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Progne tapera

GOLONDRINA PARDA / BROWN-CHESTED MARTIN / ANDORINHA-DO-CAMPO

- **HÁBITAT:** Bosques, sabanas y áreas rurales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país hasta Chubut y Santa Cruz sin incluir la zona cordillerana, por la costa llega a las Islas Malvinas. Algunas poblaciones del sur migran hasta Centroamérica en otoño.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) 7 de Abril, El Sunchal (Burruyacu), Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1268, 1270) 2M, sin localidad, 1900; (1272) 1M, sin localidad, 1904; (1597) 1M, Nueva España, 1946; (2217) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2428 y 2444) 1M y 1?, El Saladillo, 1946; (3490) 1M, Cerro del Campo, 1946; (9200) 1M, Zárate, 1954; (12345) 1M, San Pedro de Colalao, Las Tacanas, 1961; (17452) 1M, Santa Inés, 2008.

- en pedestal: (250) 1M, Iltico, 1911.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Progne subis

GOLONDRINA PURPÚREA / PURPLE MARTIN / ANDORINHA-AZUL

- HÁBITAT: campos abiertos, bordes de bosques, poblados, zonas áridas cerca del agua.
- DISTRIBUCIÓN: migran desde Norteamérica llegando hasta el norte de Buenos Aires mayormente en primavera/verano.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Aráoz y Ortiz (2008) Yerba Buena (Yerba Buena), San Miguel de Tucumán (Capital).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017), de la Peña (2019d).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Progne chalybea

GOLONDRINA DOMÉSTICA / GRAY-BREASTED MARTIN /
ANDORINHA-DOMÉSTICA-GRANDE

- HÁBITAT: Serranías, sabanas, áreas rurales, poblados y costas marinas, en acantilados y construcciones.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Algunas poblaciones del sur migran al norte en otoño.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Progne elegans

GOLONDRINA NEGRA / SOUTHERN MARTIN / ANDORINHA-DO-SUL

- HÁBITAT: Serranías, sabanas, áreas rurales, poblados y costas marinas, en acantilados y construcciones.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país excepto en la zona cordillerana alta, hasta Santa Cruz e Islas Malvinas. En otoño/ invierno algunas poblaciones se desplazan más al norte.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) San Ignacio (La Cocha), Chulca, Las Juntas (Trancas), Tafí del Valle, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1263) 1M, sin localidad, 1900; (1264 y 1266) 1M y 1H, Tapia; 1901; (1267) 1H, sin localidad, 1901; (3507) 1H, Cerro del Campo, 1946; (9377) 1M, Tapia; 1911; (9384) 1H, Tapia, 1911; (12572, 12573) 2M, San Pedro de Colalao, 1962.
 - en pedestal: (252) 1H, Concepción, 1910.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Brandán y Navarro (2009) como *P. modesta*. UICN: LC; MA-yDS y AA: NA.

Tachycineta leucorrhoa

GOLONDRINA CEJA BLANCA / WHITE-RUMPED SWALLOW /
ANDORINHA-DE-SOBRE-BRANCO

- **HÁBITAT:** Sabanas, bosques, campos abiertos, lagunas, áreas rurales y poblados.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta el sur de Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí

del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (545) 1M, Tranquitas, 1946; (905) 1M, Tiro Argentino, 1946; (1278) 1H, sin localidad, 1900; (4804) 1H, Bella Vista, 1947.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Tachycineta leucopyga

GOLONDRINA PATAGÓNICA / CHILEAN SWALLOW

- HÁBITAT: Bosque araucano y estepa patagónica, campos abiertos y sabanas con monte y arboledas dispersas.
- DISTRIBUCIÓN: Residente en la Patagonia desde sur de Mendoza, La Pampa y Buenos Aires hasta sur de Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En otoño/ invierno migra al norte, llegando a Corrientes y Misiones en el noreste y a Tucumán, oeste de Salta, Chaco y Formosa en el norte.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Dique el Cadillal (Tafí Viejo); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (9376) 1?, sin localidad, sin fecha.
 - en pedestal: (255) 1M-1H, Dpto. Chichigasta, Santa Cruz, 1910; (721) 1M-1H, Concepción, 1927.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: Para algunos autores como *T. meyeni*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Riparia riparia

GOLONDRINA ZAPADORA / BANK SWALLOW / ANDORINHA-DO-BARRANCO

- HÁBITAT: Sabanas, campos abiertos y áreas rurales, cerca de grandes humedales.
- DISTRIBUCIÓN: Migrante de Norteamérica, excepto Misiones y altas cumbres, llega en primavera/ verano hasta Santa Cruz y probablemente a Islas Malvinas.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2013a) Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Las Talitas (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (11145) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1958.
 - en pedestal: (706) 1M, Concepción, 1925; (706) 1H, sin localidad, sin fecha.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Hirundo rustica

GOLONDRINA TIJERITA / BARN SWALLOW / ANDORINHA-DE-BANDO

- HÁBITAT: Sabanas con monte y arboledas dispersas, áreas rurales y palustres.
- DISTRIBUCIÓN: Migrante desde Norteamérica a todo el país, incluso Islas Malvinas. Hay una población que cría en Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista, Leales (Leales), Dique El Cadillal (Tafí Viejo), Yerba Buena (Yerba Buena), (Cruz Alta), Lules (Lules), Montegudo (Simoca).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1288) 1?, San Felipe, 1902; (1293) 1H, Dpto. Graneros, sin localidad, 1914; (7767) 1M, sin localidad, 1930; (7769) 1H, sin localidad, 1931; (9386) 1H, Río Salí, 1914; (9413) 1?, Río Salí, 1931.
 - en pedestal: (722) 1M, Concepción, 1927; (722) 1H, Concepción, 1926.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Petrochelidon pyrrhonota

GOLONDRINA RABADILLA CANELA / CLIFF SWALLOW /
ANDORINHA-DE-DORSO-ACANELADO

- HÁBITAT: En sabanas, campos abiertos, áreas rurales y palustres.

- **DISTRIBUCIÓN:** Migrante desde América del Norte en primavera y verano hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Banda del Río Salí, (Cruz Alta), Arroyo Mista (Leales), Monteagudo (Simoca), San Miguel Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1276, 1289) 2H, sin localidad, 1900; (2535, 2536, 2539 y 2541) 3M y 1H, Malvinas (6 km SE de San Pablo), 1946; (7775) 1M, sin localidad, 1930; (10972 y 10973) 1H y 1M, Dpto. Trancas, Los Pocitos, 1958; (11361, 11362 y 11363) 2H y 1?, La Angostura, 1959; (17484) 1?, Santa Inés, 2006.
 - en pedestal: (253) 1M, Toro Muerto, 1910.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

11. Familia Troglodytidae

Cuatro especies en Argentina y tres en Tucumán.

Troglodytes aedon

RATONA COMÚN / HOUSE WREN / CORRUIRA-DE-CASA

- **HÁBITAT:** Diversos ambientes, con vegetación mediana y baja densa.
- **DISTRIBUCIÓN:** En todo el país e Islas Malvinas.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle), La Ciénaga (Tafí Viejo); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital);

Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes y Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1303 y 1305) 1M y 1H, sin localidad, 1900; (5277) 1M, Marco Paz, 1947; (8485) 1M, Tafí del Valle, 1953; (10931) 1H, Dpto. Trancas, Monte Bello, 1957; (12351) 1M, San Pedro de Colalao, Cruz Cañada, 1962; (15263) 1M, San Miguel de Tucumán, Zona Sur, 1986.

- en alcohol: (17501) 1?, La Junta, 1999; (17536) 1?, Los Chorrillos, 13 km al NO, límite norte de Estancia Los Chorrillos, 1998; (17708) 1?, Villa Batiruan, 2018.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Troglodytes solstitialis

RATONA CEJA BLANCA / MOUNTAIN WREN

- HÁBITAT: Estrato bajo y medio en selvas y bosques montanos.

- DISTRIBUCIÓN: Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Sierra de Medina (Burrucacú), Horco Molle, San Javier (Yerba Buena), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida, Río Los Sosa (Monteros), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (477, 4777) 2M, Cerros de Tafí, 1947; (1296) 1M, Cerros de Tucumán, 1900; (1298) 1H, Villa Nougues, 1901; (1299) 1M, San Pablo, 1905; (5306) 1H, Cerro

de Tafí Viejo, 1948; (6594 y 6620) 1M y 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8048 y 8049) 1H y 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1952.

– en pedestal: (279) 1M-1H, Las Pavas, 1911.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Cistothorus platensis

RATONA APERDIZADA / SEDGE WREN / CORRUÍRA-DO-CAMPO

● HÁBITAT: Pastizales y pajonales.

● DISTRIBUCIÓN: En todo el país e Islas Malvinas, excepto Misiones.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) El Infiernillo, Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Río Santa María, El Infiernillo, Dique La Angostura (Tafí del Valle), Monteagudo (Simoca), Los Gómez (Leales), Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (1090) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1299) 1?, Villa Nogués, 1900; (1300) 1M, La Tipa, 1899; (10398, 10399) 2H, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956; (10879) 1M, San Pedro de Colalao, Alto La Totorá, 1958; (11240) 1H, Amaicha del Valle, 1958; (11274 y 11275) 1? y 1M, San Pedro de Colalao, Alto de la Laguna, 1958; (12352) 1M, San Pedro de Colalao, Cruz Cañada, 1962; (12353) 1M, San Pedro de Colalao, Alto La Totorá, 1962.

– en pedestal: (564) 1M-1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1911.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés GRASS WREN. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

12. Familia Polioptilidae

Dos especies en Argentina, una en Tucumán.

Polioptila dumicola

TACUARITA AZUL / MASKED GNATCATCHER / BALANÇA-RABO-DE-MÁSCARA

- **HÁBITAT:** Copas de arbustos en bosques, espinal, sabanas y arboledas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta San Juan, este de Mendoza, San Luis, norte de La Pampa y sur Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules), Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, San Pedro de Colalao (Trancas), 7 de Abril, El Sunchal, Burruyacú (Burruyacú), Arroyo Mista (Leales), Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Horco Molle (Yerba Buena), Banda del Río Salí (Cruz Alta); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (128) 1M, S/Dpto. El Cadillal, 1946; (275, 277 y 276) 2H y 1M, Los Gómez, 1946; (285, 609 y 296, 297, 606, 2042) 2H y 4M, Tapia, 1946; (344 y 372) 1H y 1M, Mariño, 1946; (498, 1944) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (1938) 1M, sin localidad, 1899; (1939) 1M, sin localidad, 1901; (1941) 1M, El Manantial, 1902; (1942) 1H, Tapia, 1901; (2013) 1M, Vipos, 1946; (2438, 3235 y 3146) 2M y 1H, El Saladillo, 1946; (9038) 1M, La Angostura, 1954; (9044) 1M, Zárate, 1954; (9109) 1H, Las Vertientes, 1954; (9110 y 9212) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1954; (9329) 1H, San Pedro de Colalao, 1955; (9871) 1H, La Angostura, 1956; (10597) 1M, Dpto. Trancas, Monte Bello, 1957; (17229 y 17230, 17231) 1H y 2M, El Vizcacheral, 1993.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

13. Familia Cinclidae

Una especie en Argentina y en Tucumán.

Cinclus schulzii

MIRLO DE AGUA / RUFIOUS-THROATED DIPPER

- **HÁBITAT:** Cursos de aguas rápidos y caudalosos en bosques montanos del noroeste. En invierno se la puede observar en selvas.
- **DISTRIBUCIÓN:** En Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Cocimano *et al.* (2005) Río Los Sosa (S/Dpto.); Rumboll *et al.* (2005) El Indio (Monteros), Valle de Tafí (Tafí del Valle), La Ciénaga (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Río Los Sosa, entre El Indio y Km 49 (Monteros), Arroyo Morales en La Ovejería, Río El Churqui (Tafí del Valle); Moschione (2007) Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Río Los Sosa (Monteros/ Tafí del Valle), Cuesta del Clavillo (Chicligasta), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Parque Provincial Los Ñuñorcós y Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/ Monteros), Reserva Provincial Santa Anta (Río Chico); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Río Los Sosa (Monteros), Río Las Pavas, Río Jaya (Chicligasta), Río La Horqueta (Monteros), Río El Durazno Grande, Río Mula Muerta en el Cerro Pabellón, Río El Churqui, Arroyo Morales (Tafí del Valle), Valle de la Ciénaga (Tafí Viejo), Río Vipos (Trancas); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1565, 1569 y 1568) 2M y 1H, Anfama, 1906; (1566) 1H, La Ciénaga, 1904; (1567) 1M, Vipos, Puesto Viejo, Ñorco, 1908; (5416) 1H, La Quebradita, 1948; (8017) 1H, Cerro Negro, 1952; (9156) 1H, Tafí del Valle, 1955; (12427) 1M, San Pedro de Colalao, 1963.
 - en pedestal: (424) 1M, Las Pavas, 1910.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: VU; MArDS y AA: AM.

14. Familia Turdidae

13 especies en Argentina y siete en Tucumán.

Catharus maculatus

ZORZALITO OVERO / SPECKLED NIGHTINGALE-THRUSH

- HÁBITAT: Yungas.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta y Tucumán.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Álvarez, Capllonch, Cerezo, Ortiz y Zelaya (2007) Río Piedras, Parque Biológico Sierra de San Javier, Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta, 2010 como: *Catharus dryas*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Catharus ustulatus

ZORZALITO BOREAL / SWAINSON'S THRUSH

- HÁBITAT: Selvas, bosques y yungas con sotobosque cerrado.
- DISTRIBUCIÓN: Migratorio de Norteamérica, desde Jujuy y Salta hasta el norte de San Juan, Córdoba y Santa Fe. Registros aislados en el sudoeste de Entre Ríos, centro de Buenos Aires y noreste de San Luis.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), Río Los Sosa, La Florida (Monteros), El Sunchal (Burrucacú), Vipos, Ticucho (Trancas); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1898) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1915; (7132) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (10887) 1M, San Pedro de Colalao, Agua Rosada, 1958; (14549) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1977; (17206) 1M, El Vizcacheral, 1993.
 - en pedestal: (280) 1M, Concepción, 1911; (280) 1H, sin localidad, sin fecha.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Turdus rufiventris

ZORZAL COLORADO / RUFIOUS-BELLIED THRUSH / SABIÁ-LARANJEIRA

- HÁBITAT: Selvas, bosques, arboledas y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta Mendoza, norte de San Luis, sur de Córdoba y noreste de Buenos Aires y de Río Negro. En expansión hacia el sur, hasta el sur de La Pampa y Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Rumboll *et al.* (2005) Horco Molle (Yerba Buena), Río Salí (S/Dpto.), Cochuna (Chicligasta), Reserva Aguas Chiquitas (Burrucacú); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007a) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarría *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Soria, Aveldaño y Capllonch (2008) Río Piedras Horco Molle, Río Anta Yacu, Senda del Pluviómetro, Senda del Cedro Grande (Yerba Buena), Reserva Provincial Aguas Chiquitas (S/Dpto.); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarría (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarría *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Lomáscolo, Monmay, Malizia, Martín (2010) Sierra de San Javier (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarría (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarría y Fanjul (2016)

Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (239) 1H, Río Cochuna, 1946; (320) 1M, Alpachiri, 1946; (351, 362) 2H, Mariño, 1946; (365, 457) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (524) 1H, Zárate Norte, 1946; (919) 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (942, 943) 2M, Timbó Viejo, 1946; (1003) 1M, Leales; 1946; (1176) 1M, Lules, 1946; (1332, 2104, 2261, 2441, 2594 y 1354, 2301, 2330, 2387, 2507) 5M y 5H, El Saladillo, 1946; (1400, 1981) 2H, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (1401 y 1317, 1406, 1661, 1979, 2026 y 1946, 1982) 1? y 5M y 2H Yerba Buena, 1946; (1555) 1H, Dique La Aguadita, 1946; (1869) 1M, sin localidad, 1899; (1871) 1H, El Manantial, 1902; (1872) 1H, sin localidad, 1901; (1994) 1M, Dpto. Trancas, El Cadillal, 1946; (2461 y 2463) 1H y 1?, sin Dpto., Aconquija, 1946; (3256) 1M, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (6146) 1H, Manchalá, 1942; (6595) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (7627) 1?, sin localidad, 1948; (10720) 1H, Rearte, 1957; (17153) 1?, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 2011; (17205) 1M, El Vizcacheral, 1993; (17303) 1?, Yerba Buena, calle Jonas Salk 2880, 2008; (17346) 1?, Parque Biológico Sierra de San Javier, Anta Yacu, 1997; (17356) 1M, Parque Biológico Sierra de San Javier, Río Piedras, 2005; (17361) 1?, Colombres, 2004.

– en pedestal: (347) 1M-1H, Concepción, 1910.

– en alcohol: (17268) 1?, El Corte, Barrio El Típal, 2012; (17516) 1?, Reserva Provincial La Florida, 7 Km al O de Ibatín, en Río Pueblo Viejo, 1998; (17664, 17665, 17666, 17667 y 17668) 4M y 1?, Villa Batiruaná, 2018.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Turdus amaurochalinus

ZORZAL CHALCHALERO / CREAMY-BELLIED THRUSH / SABIÁ-POCA

- HÁBITAT: Selvas, selva en galería, bosques, arboledas y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Neuquén, noreste de Río Negro, La Pampa, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas

(Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Soria, Aveldaño y Capllonch (2008) Horco Molle (Yerba Buena), Monteagudo (Simoca), El Sunchal (Burruyacú); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burruyacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Ortiz y Araújo (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), El Sunchal (Burruyacú), Vipos, Ticucho (Trancas), Leales, Arroyo Mista (Leales), Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Monteagudo (Simoca); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (94) 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (98) 1H, Dpto. Capital, sin localidad, 1946; (177 y 304) 1H y 1M, La Ramada, 1946; (317) 1M, Alpachiri, 1946; (804) 1M, El Guardamonte, 1946; (1135) 1H, Las Cañitas, 1946; (1326, 1650, 2247, 2402, 2499 y 1333) 5M y 1H, El Saladillo; 1946; (1574) 1H, El Timbó, 1946; (1612) 1H, Nueva España, 1946; (1876, 1878) 2H, sin localidad, 1899; (1877) 1M, sin localidad, 1904; (1879) 1H, Río Salí, 1902; (1883) 1H, sin localidad, 1901; (1912) 1M, sin localidad, 1911; (1946 y 2275 y 1396, 2454) 1H y 1M y 2?, Yerba Buena, 1946; (2607) 1M, sin Dpto., Aconquija, 1946; (9064) 1H, Tafí del Valle, 1955; (17203 y 17204) 1M y 1H, El Vizcacheral, 1993; (17378) 1?, Arroyo Mista, 2003.
- en pedestal: (344) 1M, Concepción, 1909.
- en alcohol: (17267) 1?, Ticucho, Camping de la Universidad Nacional de Tucumán, 2016.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Turdus nigriceps

ZORZAL CABEZA NEGRA / ANDEAN SLATY THRUSH

- HÁBITAT: Yungas y quebradas con bosques y arboledas incluso exóticas en el noroeste.
- DISTRIBUCIÓN: Desde Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, oeste de Santiago del Estero, este de La Rioja hasta las sierras de Córdoba y noreste de San Luis.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) La Angostura (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Soria *et al.* (2008) Pinar de Velárdez, Senda del Pluviómetro (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (214) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (1319, 1320, 1342, 1347, 1356, 1357, 1395, 1413, 1424, 1953, 2025) 11M, Yerba Buena, 1946; (1344) 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (1404) 1M, Las Cañitas, 1940; (1405) 1H, Las Cañitas, 1946; (1899) 1M, Tafí Viejo, 1902; (1900) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1911; (1903) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (1904) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1902; (2068) 1?, Río Salí, 1946; (2456) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1946; (2459 y 2462) 1M y 1H, sin Dpto., Aconquija, 1946; (9065) 1M, Tafí del Valle, 1955; (12423) 1H, Campo Las Chuñas, 1963; (17185) 1H, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., sin fecha; (17382) 1M, Horco Molle, Parque Sierra de San Javier, Anta Yacu, 1997; (17395) 1?, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 2012.

- en pedestal: (346) 1M-1H y 1?, Las Pavas, 1911.

- en alcohol: (17596) 1M, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 2008; (17607) 1?, Parque Nacional Campo de los Alisos, Los Chorizos, 2011; (17641) 1M, Reserva Provincial Aguas Chiquitas, El Cadillal, 1993; (17669, 17670 y 17671) 2M y 1?, Villa Batiruaná, 2018.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés BLACK-CAPPED THRUSH. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Turdus chiguanco

ZORZAL CHIGUANCO / CHIGUANCO THRUSH

- HÁBITAT: Bosques, pastizales y quebradas en los cerros, en arbustales y en arboledas exóticas.

- DISTRIBUCIÓN: Desde Jujuy, por San Juan y Mendoza, y por el oeste de Santiago del Estero y Córdoba hasta Neuquén, el sur de Buenos Aires, Río Negro y Chubut.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Capllonch y Moyano Wagner (2010) Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Molle, La Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres Calchaquies, Amaicha del Valle, El Pichao, Colalao del Valle, Tafí del Valle, Sierras de Quilmes (Tafí del Valle), Cumbres del Aconquija (S/Dpto.), El Sunchal, Sierra de Medina (Burruyacú), Horco Molle, San Javier (Yerba Buena), Banda del Río Salí, (Cruz Alta), Arroyo Mista (Leales), San Miguel de Tucumán (Capital), Ticucho (Trancas); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (184) 1H, sin localidad, 1894; (63) 1H, Los Gómez, 1946; (303, 406, 558) 3H, Tafí Viejo, 1946; (379) 1M, Mariño, 1946; (543) 1H, Dpto. Burruyacú, sin localidad, 1946; (556) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (592) 1H, Caspinchango, 1945; (1262) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (1884, 1886) 2M, sin localidad, 1899; (1885) 1M, sin localidad, 1927; (1887) 1H, sin localidad, 1904; (1888) 1M, sin localidad, 1901; (1889) 1H, sin localidad, 1930; (4550) 1M, Valle de Tafí, 1947; (7628) 1M, sin localidad, 1929; (7971) 1H, Tafí del Valle, 1952; (9004) 1M, Río Chilca, 1954; (9650) 1H, Hualinchay, 1955; (10103) 1H, Río Las Tipas, 1956; (17362) 1M, La Ciénaga, 2003; (s/nº) 1?, Amaicha del Valle, 1946.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Turdus serranus

ZORZAL NEGRO / GLOSSY-BLACK THRUSH

- HÁBITAT: Yungas y áreas muy boscosas.
- DISTRIBUCIÓN: Jujuy, norte de Salta y Tucumán.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019d).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

15. Familia Mimidae

Cinco especies en Argentina y cuatro presentes en Tucumán.

Mimus patagonicus

CALANDRIA MORA / PATAGONIAN MOCKINGBIRD

- HÁBITAT: Estepas arbustivas andinas y patagónicas, matorrales y monte.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país por el oeste hasta el sur de Santa Cruz. Probablemente en Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Las poblaciones australes migran en otoño al norte hasta Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y sur de Entre Ríos.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Ampimpa, Amaicha del Valle, Colalao del Valle, El Pichao, Quilmes (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña, 2019e; del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Mimus saturninus

CALANDRIA GRANDE / CHALK-BROWED MOCKINGBIRD / SABIÁ-DO-CAMPO

- HÁBITAT: Sabanas, monte, espinal, arbustales, bordes de bosques, áreas rurales y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta el este de Mendoza y Neuquén, norte de Río Negro y extremo noreste de Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) entre El Infiernillo y Amaicha (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Ampimpa, El Pichao,

Quilmes, El Molle, Amaicha del Valle, El Remate (Tafí del Valle), Monteagudo (Simoca).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (857) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1917) 1M, Río Salí, 1906; (1920) 1M, Tapia, 1901; (5443 y 5446) 1M y 1H, Tafí del Valle, 1948; (8321) 1M, El Guardamonte, 1953; (11131, 11132, 11238) 3M, Amaicha del Valle, 1958.
 - en pedestal: (349) 1M, Toro Muerto, 1918; (349) 1H, Concepción, 1909.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Mimus triurus

CALANDRIA REAL / WHITE-BANDED MOCKINGBIRD /
CALHANDRA-DE-TRÊS-RABOS

- HÁBITAT: Sabanas, espinal, matorrales, estepas arbustivas y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Como residente en una franja central evitando la zona cordillerana alta, desde Jujuy y Salta hasta Neuquén, norte de Río Negro y norte de Chubut. La población más austral migra al norte y al este en otoño.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital) y Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho, Vipos, San Pedro de Colalao (Trancas), Burruyacú (Burruyacú), La Cocha (La Cocha) Leales (Leales), (Cruz Alta), Yerba Buena, Horco Molle (Yerba Buena), Amaicha del Valle (Tafí del Valle), El Cadillal (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (284) 1?, Los Gómez, 1947; (587) 1H, Zárate Norte, 1946; (1905, 1907) 2M, sin localidad, 1900; (1906) 1H, sin localidad, 1903; (1918) 1H, sin localidad, 1900; (9507) 1H, Laguna Jangallo, 1955; (10480) 1H, Chilca, 1957; (17606) 1?, Campo Grande, Las Calandritas, 1996.
 - en pedestal: (351) 1M, Concepción, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Mimus dorsalis

CALANDRIA CASTAÑA / BROWN-BACKED MOCKINGBIRD

- HÁBITAT: Estepas y quebradas arbustivas en la puna y prepuna.
- DISTRIBUCIÓN: hasta 3000 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz, Martínez Pastur, Moreno Ten (2017) Talapazo (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (2019e).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

16. Familia Sturnidae

Tres especies en Argentina, una de ellas en Tucumán.

Sturnus vulgaris

ESTORNINO PINTO / COMMON STARLING / ESTORNINHO-MALHADO

- HÁBITAT: Ambientes urbanizados, bordes de bosques, arboledas, áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (2019e).
- OBSERVACIONES: UICN: LC. Especie exótica, recientemente introducida.

17. Familia Passeridae

Una especie también presente en Tucumán.

Passer domesticus

GORRIÓN / HOUSE SPARROW / PARDAL

- **HÁBITAT:** Áreas rurales y poblados.
- **DISTRIBUCIÓN:** En todo el país, incluso Islas Malvinas.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo) y San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Capllonch (2007b) Tafí del Valle (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1188) 1M, Las Cañitas, 1946; (1484, 1486, 1485) 3H, sin localidad, 1928; (2217) 1M, Dpto. Capital, sin localidad, 1908; (2218) 1H, sin localidad, 450 m snm, sin fecha; (6306) 1M, San Pedro de Colalao, 1950.
 - en alcohol: (17572) 1M, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA. Especie exótica.

18. Familia Motacillidae

Siete especies en Argentina y cinco en Tucumán.

Anthus lutescens

CACHIRLA CHICA / YELLOWISH PIPIT / CAMINHEIRO-ZUMBIDOR

- **HÁBITAT:** Áreas rurales y pastizales cerca del agua, en suelos bajos semihúmedos de planicies inundables.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país en una franja que exceptúa la Cordillera, por el este de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza hasta el sur de La Pampa y sur de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) La Angostura (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burrucacú); Capllonch *et al.* (2011) El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo, Tafí del Valle, Km 78 de la ruta 307, Dique La Angostura (Tafí del Valle), San Pedro de Colalao (Trancas), El Cadillal (Tafí Viejo), (Cruz Alta), Horco Molle (Yerba Buena), Monteagudo (Simoca), Los Gómez (Leales); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (803) 1H, Río Salí, 1930; (1926) 1M, sin localidad, 1899; (1932) 1M, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1903; (9863) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956; (9864) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956; (17219, 17220) 2M, El Vizcacheral, 1993; (1931) 1H, La Ciénaga, 1905; (5231) 1M, El Infiernillo, 1947.
 - en pedestal: (545) 1M-1H, Concepción, 1924.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Anthus furcatus

CACHIRLA UÑA CORTA / SHORT-BILLED PIPIT

- **HÁBITAT:** Pastizales cortos, estepas, áreas rurales y campos arados.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta Neuquén y el norte de Chubut.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burrucacú); Capllonch *et al.* (2011) El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Los Gómez (Leales), Monteagudo (Simoca), Dique El Cadillal (Tafí Viejo), Dique El Frontal (S/Dpto.).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en pedestal: (260) 1M, Concepción, 1924.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Anthus correndera

CACHIRLA COMÚN / CORRENDERA PIPIT

- HÁBITAT: Estepas, pastizales húmedos y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el país, excepto Misiones, también en las Islas Malvinas.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) Ruta 307 (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Capllonch *et al.* (2011) El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Infiernillo, Dique La Angostura (Tafí del Valle), Monteagudo, Simoca (Simoca); Salvador (2015) El Infiernillo 3000 m snm (Tafí del Valle); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (7974) 1M, Tafí del Valle, 1952.
 - en pedestal: (261) 1M, Dpto. Chicligasta, Santa Cruz, 1910; (445) 1M-1H, Concepción, 1929.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Anthus hellmayri

CACHIRLA PÁLIDA / HELLMAYR'S PIPIT / CAMINHEIRO-DE-BARRIGA-ACANELADA

- HÁBITAT: Estepas, pastizales bajos y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre 3000 y 4000 m snm como residente en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y norte de San Juan y en sur de Mendoza, Neuquén y Río Negro hasta el sur de Santa Cruz. La población del sur migra al este a las provincias de la Mesopotamia.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2013a) Dique La Angostura, Tafí del Valle, Lara, El Infiernillo (Tafí del Valle), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Cuenca del Salí (S/Dpto.), Dique El Cadillal (Tafí Viejo); Salvador (2015) El Infiernillo 3000 m snm (Tafí del Valle); Echevarria

y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (568 y 579) 1H y 1M, Río Salí, 1946; (1072, 1073, 1078, 1098 y 1075) 4H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1928) 1?, sin localidad, sin fecha; (1933) 1M, sin localidad, 1899; (5047, 5059) 2M, Tafí del Valle, 1947; (5185, 5245 y 5196, 5209, 5238, 5417) 2H y 4M, El Infiernillo, 1947; (8466) 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1953; (9209 y 9210, 9211) 1H y 2M, Cóndor Huasi, 1954; (9695) 1M, Tafí del Valle, 1956.

- en pedestal: (444) 1M-1H, Concepción, 1918; (707) 1H, Concepción, 1924; (707) 1H, Concepción, 1918.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Anthus bogotensis

CACHIRLA ANDINA / PARAMO PIPIT

- HÁBITAT: Pastizales y estepas altoandinas. Puna.

- DISTRIBUCIÓN: Entre 3000 y 4000 m snm en Tucumán y Catamarca. Un registro en Jujuy.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2005) Cumbres de Tafí (S/Dpto.), Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.), Altiplanicie de Huaca-Huasi (S/Dpto.), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres Calchaquíes y del Aconquija (Tafí del Valle); Moschione (2007) Parque Provincial Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle/ Trancas), El Infiernillo (Tafí del Valle), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Ciénaga Grande (Tafí Viejo), La Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres Calchaquíes, El Infiernillo, Piedras Blancas, Sierra de Quilmes (Tafí del Valle), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), La Ciénaga (Tafí del Valle), Cumbres del Aconquija (S/Dpto.).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1924) 1H, Aconquija, 1918; (1927) 1M, sin Dpto., Aconquija, 1918.

- en pedestal: (697) 1M-1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1918.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

19. Familia Fringillidae

13 especies en Argentina y cinco presentes en Tucumán.

Spinus crassirostris

CABECITANEGRA PICUDO / THICK-BILLED SISKIN

- **HÁBITAT:** Matorrales montanos y quebradas.
- **DISTRIBUCIÓN:** En una faja por el oeste del país, desde Jujuy hasta Neuquén.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) entre Km 78 y 98, ruta 307 (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, El Infiernillo (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:** sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- **LITERATURA:** López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) como *Carduelis crassirostris*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Spinus magellanicus

CABECITANEGRA COMÚN / HOODED SISKIN / PINTASSILGO

- **HÁBITAT:** Diversos ambientes, bosques, montes, espinal, áreas rurales, arboledas y poblados.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el norte del país hasta centro de Neuquén y Río Negro.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Infiernillo (Tafí del Valle); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital);

Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) sin localidades especificadas; Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (909) 1H, Tafí Viejo, 1946; (1121 y 1125, 1142 y 1416) 1? y 2M y 1H, Las Cañitas, 1946; (1137 y 3157) 1H y 1M, El Saladillo, 1946; (2192) 1M, sin localidad, 1907; (2191) 1M, El Manantial, 1902; (5349) 1?, Tafí del Valle, 1948; (6297 y 6299, 6359) 1H y 2M, San Pedro de Colalao, 1950; (8086) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1953; (8847) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (9123, 9131) 2H, Las Tacanas, 1954; (9125 y 9132) 1M y 1H, Zárate, 1954; (10967) 1M, Agua Rosada, 1958; (11021) 1?, Quebrada Los Cainzos, 1958; (11392) 1M, Quebrada Los Cainzos, 1959; (12585 y 12589, 12590) 1H y 2M, San Pedro de Colalao, 1962; (12703) 1H, Cruz Cañada, 1961; (17483) 1?, El Sunchal, 2005.
- en pedestal: (295) 1M-1H, Concepción, 1911.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como: *Carduelis magellanica*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Spinus atratus

NEGRILLO / BLACK SISKIN

- HÁBITAT: Estepas altoandinas, prepuna y pastizales dispersos en laderas rocosas.
- DISTRIBUCIÓN: En Jujuy, Salta, oeste de Tucumán y Catamarca hasta el noroeste de Mendoza.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) El Infiernillo, Ampimpa (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Tafí del Valle, Ampimpa, La Ciénaga, Sierras de Quilmes (Tafí del Valle), Huaca-Huasi (Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2185) 1M, Cerro Muñoz, 1905; (5056) 1H, Tafí del Valle, 1947; (11144 y 11143) 1H y 1M, Amaicha del Valle, 1958.
 - en pedestal: (296) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.

- LITERATURA: Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Carduelis atrata*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Chlorophonia cyanocephala

TANGARÁ CABEZA CELESTE / GOLDEN-RUMPED EUPHONIA / GATURAMO-REI

- HÁBITAT: Selvas, selva en galería y borde de bosques.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana, hasta Tucumán y Catamarca, Chaco, Corrientes y norte de Entre Ríos. Una cita para las sierras de San Luis.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, San Pedro de Colalao, Trancas (Trancas), San Javier, Horco Molle (Yerba Buena), Taficillo (Tafí Viejo), La Florida (Monteros), Dique San Ignacio (La Cocha), Villa Padre Monti (Burrucacú); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1417) 1H, Vipos, 1905; (1418) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1915; (1433) 1M, Tafí Viejo, 1916; (3487) 1H, Cerros de Tafí, La Cumbre, 1946; (8051) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (12357, 12358, 12581 y 12580) 3H y 1M, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1962.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *E. musica* y perteneciente a la Familia Thraupidae, en del Hoyo *et al.* (2019) como *E. aureata*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Euphonia chlorotica

TANGARÁ COMÚN / PURPLE-THROATED EUPHONIA / FIM-FIM

- HÁBITAT: Selvas, selva en galería, borde de bosques, montes, sabanas y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana, hasta Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y norte de Entre Ríos.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de

Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Amaicha del Valle, Tafí del Valle (Tafí del Valle), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), Monteagudo (Simoca), La Cocha (La Cocha), San Pedro de Colalao (Trancas), El Sunchal (Burruyacú); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (320) 1M, sin localidad, 1947; (394) 1M, Tafí Viejo, 1946; (490, 491 y 493) 3H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (973) 1H, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1431) 1M, sin localidad, 1909; (1432 y 6071) 1M y 1?, sin localidad, 1948; (1434) 1M, sin localidad, 1930; (1435) 1H, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1903; (1445) 1M, sin localidad, 1900; (2306) 1M, El Saladillo, 1946; (8046 y 8047) 1H y 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1952; (8084) 1H, San Miguel de Tucumán, 1953; (12359 y 12361) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, Arroyo Cruz Cañada, 1962; (15102) 1H, sin localidad, 1985; (17448) 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 2005.

- en pedestal: (321) 1M-1H, Toro Muerto, 1910; (321) 1?, Toro Muerto, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) perteneciente a la Familia Thraupidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

20. Familia Passerellidae

Todas las especies del Nuevo Mundo que antes pertenecían a la Familia Emberizidae y que no fueron trasladadas a la Familia Thraupidae han sido transferidas a esta nueva familia. Nueve especies en Argentina, seis de ellas en Tucumán. Una de las cuales es endémica.

Chlorospingus flavopectus

FRUTERO YUNGUEÑO / COMMON CHLOROSPINGUS

- HÁBITAT: Estrato medio en Yungas.
- DISTRIBUCIÓN: Entre 1000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí

Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Rumboll *et al.* (2005) Horco Molle (Yerba Buena), Piedra Tendida (Burrucacú); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Sierra de San Javier (Yerba Buena), Aguas Chiquitas, El Sunchal, Río Nio (Burrucacú), El Cadillal (Trancas), Cochuna, La Florida (Monteros), Escaba (Juan B. Alberdi), Taficillo (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuerilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (219 y 220) 1M y 1H, Tafí Viejo, 1946; (596) 1M, Alpachiri, 1946; (1088) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (4595) 1M, Cerros de Tafí, 1947; (8777) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (14373, 14380, 14381) 3M, Cumbres del Aconquija, 1968; (17445) 1?, Ruta 307, Km 21 camino a Tafí del Valle, 2000; (17455) 1?, Ruta 307, Km 21 camino a Tafí del Valle, 2006.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Chlorospingus ophthalmicus* perteneciente a la Familia Thraupidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Rhynchospiza strigiceps

CACHILO CORONA CASTAÑA / CHACO SPARROW

● HÁBITAT: Bosques y sabanas, también en pastizales serranos, espinales y arbustales con ramajes densos.

● DISTRIBUCIÓN: En el norte y centro del país desde Salta y Formosa hasta San Juan, noreste de San Luis, centro de Córdoba y de Santa Fe. Probablemente en Entre Ríos y Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Capllonch (2007b) La Angostura (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2012) Agua Salada (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Agua Salada, Abra Rica, Leales (Leales), Vipos, Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca), La Cocha (La Cocha), El Molle, Tafí del Valle (Tafí del Valle); Salvador y Digiacomio (2014) Tafí del Valle (Tafí del Valle); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2213) 1M, Tapia, 1901; (2214) 1M, San Pedro de Colalao, 1917; (2215) 1H, Tapia, 1902; (9152) 1H, Dique Tacanas, 1954; (9639) 1M, Las Tacanas, 1955; (9640, 9641) 2M, Hualinchay, 1955.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Aimophila strigiceps* con otro nombre en inglés: STRIPE-CAPPED SPARROW, perteneciente a la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Ammodramus humeralis

CACHILO CEJA AMARILLA / GRASSLAND SPARROW / TICO-TICO-DO-CAMPO

- HÁBITAT: Sabanas, pastizales y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta el noreste de Neuquén, norte de Río Negro y sur de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burrucacú); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Ticucho, Trancas (Trancas), Abra Rica (Leales), Monteagudo (Simoca); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2195, 2197) 2M, sin localidad, 1900; (9791) 1H, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956.
 - en pedestal: (693) 1M, Concepción, 1919.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) perteneciente a la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Arremon flavirostris

CERQUERO DE COLLAR / SAFFRON-BILLED SPARROW / TICO-TICO-DE-BICO-AMARELO

- **HÁBITAT:** Selvas, selvas en galería, isletas de bosque y Yungas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja y en Misiones, Corrientes y este de Chaco y Formosa.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Rumboll *et al.* (2005) Piedra Tendida (Burruyacú); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Piedras Coloradas, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Horco Molle, Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Ticucho (Trancas), Piedra Tendida (Burruyacú), Dique San Ignacio (La Cocha), Taficillo (Tafí Viejo), Cochuna (Chicligasta), El Saltón en Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico); El Aserradero (S/Dpto.); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) La Florida (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena), El Sunchal (Burruyacú), Vipos, Ticucho, El Cadillal (Trancas); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (405) 1H, Arroyo Cainzo, 1946; (875 y 1930) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (982) 1M, Los Nogales, 1946; (1032, 1037, 2260 y 1040) 3M y 1H, El Saladillo, 1946; (1116, 1119, 1120) 3M, Las Cañitas, 1946; (1186) 1H, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (1324) 1H, Los Sarmientos, 1911; (1325) 1M, sin localidad, 1899; (1327) 1M, Cerros de Tafí, 1900; (1332) 1H, Villa Nogués, 1903; (1351) 1H, Yerba Buena, 1846; (2029 y 2583) 1M y 1H, Yerba Buena, 1946; (5305) 1H, Cerro de Tafí Viejo, 1948; (6582) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8469) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1953; (8776) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (9145) 1M, Las Tipas, 1954; (15310) 1H, Horco Molle, 1991; (17272) 1?, Ticucho, Camping de la UNT, 2016; (17335, 17344) 2?, Parque Biológico Sierra de San Javier, Arroyo Anta Yacu, 1997; (17440) 1M, Reserva Provincial La Florida, 2009.
 - en pedestal: (289) 1M-1H, Iltico, 1909.

– en alcohol: (17507 al 17513, 171517 al 17524) 15 ♀, Reserva Provincial La Florida, 7 Km al O de Ibatín, en Río Pueblo Viejo, 1998; (17599) 1♀, Reserva Experimental Horco Molle, 2008; (17636) 1♀, Reserva Provincial Aguas Chiquitas, El Cadillal, 1992; (17650) 1♀, Alrededores del Dique El Cajón, 2 km hacia el N, 2000; (17675) 1M, Villa Batiruaná, 2018.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como perteneciente a la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Zonotrichia capensis

CHINGOLO / RUFIOUS-COLLARED SPARROW / TICO-TICO

- HÁBITAT: Casi todos los ambientes, incluso poblados.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el país e Islas Malvinas.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Haro (2002) Tucumán; Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarría *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Soria *et al.* (2010) Ticucho (Trancas), Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena); Capllonch *et al.* (2011) Ciénaga Grande (Tafí Viejo), La Ciénaga, El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida, Playa Larga (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena), La Angostura, Rancho del Hombre Solo, El Bañado en Amaicha del Valle, El Remate, Río Santa María (Tafí del Valle), El Sunchal, Piedra Tendida, (Burruyacú).

yacú), Dique San Ignacio (La Cocha), Cochuna (Chicligasta), los Puestos (Leales), Ticucho, Chulcas, Las Juntas (Trancas), Taficillo (Tafí Viejo), El Cadillal (S/Dpto.); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (20) 1H, Tafí del Valle, 1946; (105) 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (291) 1M, Tapia, 1946; (516) 1H, Raco, 1946; (1020) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (1478) 1M, Santa Bárbara, 1928; (1479) 1M, Santa Rosa de Leales, 1915; (2035) 1M, Río Salí, 1946; (2210) 1H, sin localidad, 1898; (2212) 1M, sin localidad, 1900; (2498) 1M, El Saladillo, 1946; (5450, 5458 y 5457, 5459, 5460, 5475, 5477) 2H y 5M, Tafí del Valle, 1948; (8037) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1952; (11142) 1M, Amaicha del Valle, 1958; (17194, 17202 y 17201) 2M y 1H, El Vizcacheral, 1993; (17333, 17337, 17373, 17374, 17375) 5?, La Ciénaga, 2005; (17371) 1?, Santa Inés, 2004; (17372) 1?, Cuesta de Chasquivil, 2006.

– en alcohol: (17503, 17504) 2?, Reserva Provincial La Florida, 7 Km al O de Ibatín en Río Pueblo Viejo, 1998; (17537) 1?, Río Nio, 4 Km al O, Camino hacia Altos de Medina, 1998.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como perteneciente a la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Atlapetes citrinellus

CERQUERO AMARILLO / YELLOW-STRIPED BRUSHFINCH

● HÁBITAT: Yungas.

● DISTRIBUCIÓN: Entre 1000 y 2500 m snm en el sureste de Jujuy, sur de Salta, Tucumán y Catamarca.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Rumboll *et al.* (2005) Taficillo (Tafí Viejo); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Moschione (2007) Sierra de San Javier (Yerba Buena/ Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Río Los Sosa (Monteros/ Tafí del Valle), Cuesta del Clavillo (Chicligasta), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida

(Monteros), Reserva Natural La Angostura (Tafí del Valle), Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/Monteros), Reserva Provincial Santa Anta (Río Chico); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Horco Molle, Río Piedras, Río Anta Yacu (Yerba Buena), Taficillo, Pinar Velárdez (Tafí Viejo), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida, Playa Larga, El Indio (Monteros), Piedra Tendida (Burrucacú), Cochuna (Chicligasta), La Ciénaga (Tafí del Valle), Chulcas (S/Dpto.); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Río Los Sosa, Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Parque Nacional Campo de los Alisos, La Banderita (Chicligasta), Chasquivil (Tafí Viejo), Sierra de San Javier, Horco Molle (Yerba Buena), Villa Padre Monti, El Sunchal (Burrucacú), (Cruz Alta), La Ciénaga (Tafí del Valle); Capllonch, Ortiz, Núñez Montellano y Blendinger (2014) Río Nio, Chorrillos, Piedra Tendida, Viaducto El Saladillo (Burrucacú), Chulca, Tichuco (Trancas), Río Lisquimayo en Chasquivil, Las Agüitas en Taficillo, Pinar de Velárdez en Taficillo (Tafí Viejo); Senda de la Horqueta, Senda del Pluviómetro, Río Anta Yacu, Arroyo Las Cañas, Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), barrio Santa Inés en Colombres (Cruz Alta), El Indio, Km 43-Ruta 307, Piedras Coloradas, Monteros, Playa Larga-Ruta 307 y Reserva Provincial La Florida (Monteros), Los Chorizos, Parque Nacional Campo de Los Alisos, Cuesta del Clavillo, La Banderita, Laguna del Tesoro, Cochuna (Chicligasta), Reserva Santa Ana (Río Chico), Dique San Ignacio (La Cocha); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (348) 1M, El Sunchal, 1946; (598) 1M, Tafí, 1946; (848, 864 y 1092) 2H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (959 y 964) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1117, 1317) 2M, Taficillo, 1929; (1316) 1H La Hoyada, 1901; (1318) 1H, Cumbre La Hoyada, 1902; (1322, 1323) 2M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (8062 y 8063, 8064, 8066) 1M y 3H, La Angostura, 1952; (8490 y 8491) 1H y 1M, Tafí del Valle, 1953; (8608) 1M, La Ciénaga, 1953; (10510, 10540) 2M, Cerro del Campo, 1957; (12009) 1M, Agua Rosada, 1960; (13320) 1M, Laguna del Tesoro, 1972; (14541) 1M, Alto de La Perdiz, Cumbres de Cabra Horco, 1977; (17493) 1?, Quebrada del Portugués, 2009.

– en pedestal: (288) 1M-1H, Las Pavas, 1909.

– en alcohol: (17615) 1?, Cochuna, Camping Samay, 2008; (17674) 1M, Villa Bati ruana, 2018.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: Especie endémica. En Narosky e Yzurieta (2010) como perteneciente a la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: VU.

21. Familia Icteridae

23 especies en Argentina y 10 presentes en Tucumán.

Dolichonyx oryzivorus

CHARLATÁN / BOBOLINK

- **HÁBITAT:** Bañados, pajonales higrófilos en campos altos, arroceras, siempre en cercanías del agua.
- **DISTRIBUCIÓN:** Migrante desde América del Norte hasta Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y la Mesopotamia. Probablemente hasta el norte de Buenos Aires y Córdoba.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Sin registros.
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (2918, 2929) 2M, sin localidad, 1904.
 - en pedestal: (723) 1M-1H, Concepción, 1928.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f).
- **OBSERVACIONES:** No se reproduce en el país. Se considera una especie en disminución. UICN: LC; MAyDS y AA: VU.

Leistes superciliaris

PECHO COLORADO / WHITE-BROWED MEADOWLARK /

POLÍCIA-INGLESA-DO-SUL

- **HÁBITAT:** Pastizales y áreas rurales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana, hasta el norte de Neuquén, Río Negro y sur de Buenos Aires y en Tierra del Fuego.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho, Vapos (Trancas), Ranchillos, Banda del Río Salí (Cruz Alta), Horco Molle (Yerba Buena), Arroyo Mista, La Florida, Leales (Leales), Montegudo (Simoca), Dique la Angostura (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1173) 1M, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (1380) 1?, El Saladillo, 1946; (2856) 1H, Dpto. Graneros, Los Vázquez, 1903; (2890) 1M, sin localidad, 1900; (2892 y 2895) 1? y 1M, sin localidad, sin fecha; (2938) 1M, sin localidad, 1902; (2952) 1M, sin localidad, 1929; (4479, 4483) 2M, San Felipe, 1947; (6631) 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8925) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1954; (17430) 1?, Colombes, 2008.
 - en pedestal: (336) 1M-1H, Concepción, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Sturnella superciliaris* y en inglés WHITE-BROWED BLACKBIRD. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Leistes loyca

LOICA COMÚN/ LONG-TAILED MEADOWLARK

- HÁBITAT: Pastizales abiertos, arbustados o rocosos, estepas andinas, patagónicas y altoserranas.
- DISTRIBUCIÓN: Hasta los 2500 m snm. Desde Jujuy, por el oeste de Tucumán, Catamarca y La Rioja, hasta el norte de Mendoza, San Luis, oeste de Córdoba sur de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Probablemente en Santa Fe y sur de Entre Ríos.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2013a) Amaicha del Valle, El Remate, Colalao del Valle, El Bañado, Pichao, Tío Punco, Quilmes (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1386) 1M, El Saladillo, 1946; (11127, 11129, 11130, 11227, 11228) 5M, Amaicha del Valle, 1958; (12014, 12015 y 12016) 1H y 2M, Amaicha del Valle, 1960.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Sturnella loyca*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Cacicus chrysopterus

BOYERO ALA AMARILLA / GOLDEN-WINGED CACIQUE / TECELÃO

- HÁBITAT: Selvas, selva en galería y bosques.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona de cordillera, hasta Tucumán, norte de Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe y Corrientes. Probablemente en Entre Ríos y norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle, San Javier (Yerba Buena), La Florida (Monteros), El Sunchal (Burrucacú), Dique Escaba (Juan B. Alberdi), Chasquivil (Tafí Viejo), Vipos, Ticucho,

Las Tipas, San Pedro de Colalao (Trancas); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (624, 854, 859, 860) 4?, San Pedro de Colalao, 1946; (844, 894) 2?, Quebrada de Lules, 1946; (2853) 1H, Taficillo, Sierra de San Javier, 1929; (2953, 2956 y 2957) 2H y 1M, Villa Nougues, 1901; (2954) 1M, sin localidad, sin fecha; (2955) 1M, Villa Nougues, sin fecha; (2959) 1H, Las Cuchillas, sin fecha; (6583 y 6633) 1H y 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8846) 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (9623, 9628 y 9627) 2M y 1H, Río Las Tacanas, 1955; (9624) 1M, Rearte Sur, 1955; (9625 y 9626) 1M y 1H, Chilca, 1955; (10731) 1H, La Isla, Río Las Tipas, 1957; (12347) 1H, Dpto. Trancas, Monte Bello, 1962; (12574, 12575) 2H, Quebrada Los Matos, 1962.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Icterus pyrrhopterus

BOYERITO / VARIABLE ORIOLE / ENCONTRO

- HÁBITAT: Bosques, orillas de selvas, sabanas y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana alta hasta el este de San Juan, norte de San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo) y San Pablo (Lules); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental

de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), El Sunchal, 7 de Abril, Río Urueña (Burruyacú), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Ticucho (Trancas), Monteagudo (Simoca), Leales (Leales), El Bañado, Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (324) 1H, El Sunchal, 1946; (554) 1H, Caspinchango, 1946; (622, 2639) 2H, San Pedro de Colalao, 1946; (907) 1H, Tiro Argentino, 1946; (1130, 1146, 1161, 2279 y 2110) 4M y 1H, El Saladillo, 1946; (1187) 1H, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (1955) 1H, Tapia, 1946; (2948) 1M, Santa Bárbara, 1928; (2949) 1M, sin localidad, 1928; (2950) 1H, Cerro de Tucumán, 1900; (2951) 1H, sin localidad, 1901; (2960) 1H, Medinas, 1914; (4478) 1H, sin localidad, 1947; (9034) 1H, Río Chilca, 1954; (9450 y 9617) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1955; (9618) 1M, Chilca, 1955; (9619) 1M, Río Tacanas, 1955; (9705) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Cerro San Javier, 1955; (9844) 1M, Cerro Dos Pozos, 1956; (10443) 1M, Cerro Dos Pozos, 1957.

- en pedestal: (340) 1M-1H, Concepción, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *I. cayanensis*. Actualmente se cree que ambas especies son simpátricas en el Norte de Bolivia (del Hoyo *et al.* (2019). La distribución de *I. cayanensis* se extiende al norte de Sudamérica. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Molothrus rufoaxillaris

TORDO PICO CORTO / SCREAMING COWBIRD / VIRA-BOSTA-PICUMÃ

- HÁBITAT: Sabanas, áreas abiertas con arbustales, bosques y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana alta, hasta Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Sin localidad específica; Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1250) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1565, 1576) 2M, El Timbó, 1946; (1667) 1H, Santa Rosa de Leales, 1946; (2410) 1?, El Saladillo, 1946; (2854) 1M, sin

localidad, 1927; (2867, 2922) 2M, sin localidad, 1902; (2869) 1M, San Felipe, 1914; (2880) 1?, sin localidad, 1900; (2919) 1M, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1903; (2921) 1H, sin localidad, 1928; (2934 y 2963) 1H y 1M, sin localidad, 1901; (3258) 1M, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (6312 y 6352) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (8845) 1M, Cerro del Campo, 1954; (8981) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1954; (9174) 1M, San Pedro de Colalao, 1954; (9451) 1H, San Pedro de Colalao, 1955; (9620 y 9621) 1M y 1H, Rearte Sur, 1955; (17428, 17429) 2M, Colombres, 2008.

– en pedestal: (332) 1M-1H, Concepción, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Molothrus bonariensis

TORDO RENEGRIDO / SHINY COWBIRD / VIRA-BOSTA

- HÁBITAT: Diversos ambientes con arbustales, bañados y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el país excepto la zona cordillerana alta, hasta el sur de Santa Cruz.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo) y San Pablo (Lules); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarría *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarría *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarría (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burrucacú); Soria *et al.* (2010) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Echevarría *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Sin localidad específica; Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Echevarría y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano

et al. (2017) El Cadillal (Burruyacú); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (162) 1M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (258) 1M, Los Gómez, 1946; (1105) 1M, La Reducción, 1946; (1251 y 1263) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (1975) 1M, Yerba Buena, 1946; (2089) 1H, Lules, 1946; (2096, 2098) 2M, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (2740 y 2764) 1M y 1H, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (2920) 1M, sin localidad, 1899; (2924) 1H, Tapia, 1901; (6325) 1M, La Junta, 1950; (6364) 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (8834) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (8836, 8838 y 8837) 2H y 1M, Cerro del Campo, 1954; (8986) 1H, Las Tacanas, 1954; (9147 y 9150) 1H y 1M, Dique Tacanas, 1954; (9622) 1M, Rearte Sur, 1955; (10376, 10377) 2M, Dique Tacanas, 1956; (10378) 1H, San Pedro de Colalao, 1956; (10439) 1H, La Angostura, 1957; (14432) 1M, Colombres, 2008; (17046) 1H, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998; (17215) 1H, El Vizcacheral, 1993; (17392) 1M, El Infiernillo, 2013; (17423, 17425, 17427) 3M, Colombres, 2008.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Agelaioides badius

TORDO MÚSICO / GRAYISH BAYWING / ASA-DE-TELHA

- HÁBITAT: Sabanas, bosques, áreas rurales y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: En todo el país hasta el sur de Chubut, exceptuando la zona cordillerana alta.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro *et al.* (2007) Parque

Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Soria *et al.* (2010) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (367) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1625 y 2251, 2298, 2333, 2361, 2392, 3156) 1H y 6M, El Saladillo, 1946; (1671 y 1971, 1990) 1H y 2M, Yerba Buena, 1946; (2881, 2914) 2M, Medinas, 1914; (2885) 1H, sin localidad, 1899; (2915) 1M, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1901; (6305, 6308, 6332, 6334, 6335, 6350) 6M, San Pedro de Colalao 1950; (6311) 1M, San Pedro de Colalao, 1960; (8840, 10363 y 10361) 2M y 1H, Cerro del Campo, 1954; (8983) 1M, Las Tacanas, 1954; (9198) 1M, Las Vertientes, 1954; (9202) 1M, Rearte Norte, 1954; (9664) 1M, Chilca, 1955; (10380) 1M, San Pedro de Colalao, 1956.

- en pedestal: (352) 1H, Concepción, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) otro nombre en inglés BAY-WINGED COWBIRD. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Agelasticus thilius

VARILLERO ALA AMARILLA / YELLOW-WINGED BLACKBIRD / SARGENTO

- HÁBITAT: Juncuales y esteros con vegetación acuática alta.

- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, excepto la zona cordillerana alta y Misiones, hasta el sur de Santa Cruz.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Los Gómez, Arroyo Mista (Leales), Río Vipos (Trancas), Río Santa María (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (2946) 1H, sin localidad, 1904; (8341) 1M, Dpto. Famailá, Río Colorado, 1953.

- en pedestal: (335) 1M-1H, Dpto. Chicligasta, Santa Cruz, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Agelaius thilius*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Chrysomus ruficapillus

VARILLERO CONGO / CHESTNUT-CAPPED BLACKBIRD / GARIBALDI

- HÁBITAT: Vegetación acuática y cercanías.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta el norte de Neuquén y Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) El Chañar (Burruyacú), Alderete, Banda del Río Salí, (Cruz Alta), Río Santa María (Tafí del Valle); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (896) 1M, Río Salí, 1920; (2455) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1946; (2874) 1M, sin localidad, 1920; (17424, 17426 y 17431) 2M y 1H, Colombres, 2008.
 - en pedestal: (334) 1M, Gastona, 1909; (334) 1H, Gastona, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Agelaius ruficapillus*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

22. Familia Parulidae

13 especies en Argentina y cinco en Tucumán.

Geothlypis aequinoctialis

ARAÑERO CARA NEGRA / MASKED YELLOWTHROAT / PIA-COBRA

- HÁBITAT: Bañados, capueras, bosques, pajonales y juncuales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta el este de Mendoza, norte de La Pampa y norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó

Nuevo (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burruyacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) bañados de Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1558) 1H, sin localidad, 1928; (1561) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1904; (1564) 1M, Las Tipas, Aguadas, 1899; (2245 y 2636) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2297) 1M, El Saladillo, 1946; (3040) 1M, Cumbres de Tafí, 1946; (7129) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (8467) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1953; (9854) 1H, Agua Rosada, 1956; (10438) 1M, La Angostura, 1957; (12364) 1M, San Pedro de Colalao, Quebrada Los Matos, 1961; (15153 y 15153) 1M y 1?, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986; (17309) 1H, San Miguel de Tucumán, Calle Don Bosco 4608, 2011.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Setophaga pitiayumi

PITIAYUMÍ / TROPICAL PARULA / MARIQUITA

- HÁBITAT: Estrato alto y medio en selva, bosques y arboledas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta Mendoza, La Pampa y el este de Buenos Aires. Posiblemente en el resto de Buenos Aires, noreste de Río Negro y norte de Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani

(2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Tapia, Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria, Marano y Fanjul (2008b) Escaba (J. Bautista Alberdi); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) Horco Molle (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuerrilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (224) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (368, 864, 869 y 626, 2471) 3H y 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (396) 1M, Alpachiri, 1946; (636) 1M, Leales, 1946; (1543) 1M, Tapia, 1901; (1553) 1M, Leales, 1915; (2039) 1M, Yerba Buena, 1946; (3151) 1M, El Saladillo, 1946; (6597) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (9678) 1H, Chilca, 1955; (10479) 1H, El Simbolar, 1957; (10746) 1M, Agua Rosada, 1956.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Parula pitiayumi*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myiothlypis bivittata

ARAÑERO CORONADO GRANDE / TWO-BANDED WARBLER

- HÁBITAT: Cerca del agua en matorrales de selva montana.
- DISTRIBUCIÓN: Coincidente con las Yungas, desde Salta hasta Tucumán.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2013b) Río Loro (Trancas); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Basileuterus bivittatus*. No citado para la provincia. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Basileuterus culicivorus

ARAÑERO CORONADO CHICO / GOLDEN-CROWNED WARBLER

- **HÁBITAT:** Estratos medio y bajo en selvas, capueras y bosques.
- **DISTRIBUCIÓN:** Desde el centro norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, por Tucumán hasta el norte de La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba y noreste de Santa Fe, oeste de Entre Ríos y norte de Buenos Aires.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Rumboll *et al.* (2005) Piedra Tendida (Burruyacu); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Las Tipas (Tafí Viejo), San Pedro de Colalao (Trancas); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (1531) 1H, sin localidad, 1900; (1532) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (1540) 1M, Cerros de Tucumán, 1900; (13313) 1?, San Miguel de Tucumán, B° El Bosque, 1971; (14562) 1?, Dique El Cadillal, 1976.
 - en pedestal: (256) 1M, Concepción, 1909.
 - en alcohol: (17505, 17506, 17514) 3?, Reserva Provincial La Florida, 7 Km al O de Ibatín en Río Pueblo Viejo, 1998; (17637 y 17638) 2?, Reserva Provincial La Florida, 7 Km al O de Ibatín en Río Pueblo Viejo, 1993; (17672) 1H, Villa Batiruaná, 2018.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Myioborus brunniceps

ARAÑERO CORONA ROJIZA / BROWN-CAPPED REDSTART

- **HÁBITAT:** Selvas, bosques, quebradas y arboledas del noroeste.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde Jujuy y Salta, por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca hasta San Juan, San Luis y Córdoba.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital) y Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Rumboll *et al.* (2005) Piedra Tendida (Burrucacú); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Tapia, Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Yerba Buena, Horco Molle (Yerba Buena), Vipos, Ticucho (Trancas), Arroyo Mista (Leales), San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Aráoz, Ortiz y Barbosa (2017) Río San Javier (Yerba Buena), Santa Lucía, Río Los Sosa (Monteros); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (68 y 78) 1H y 1M, El Timbó, 1946; (314) 1H, Alpachiri, 1946; (388) 1H, Arroyo Cainzo, 1946; (572) 1M, Tiro Argentino, 1946; (876) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1546, 1550) 2M, Taficillo, 1929; (1547) 1M, Cerro de Tafí Viejo, 1900; (1548) 1?, sin localidad, 1962; (1549) 1?, sin localidad, 1902; (1556) 1M, sin localidad, 1898; (6580, 6596) 2M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (6611, 6613) 2?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8056) 1M, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1952; (8853 y 8855) 1H y 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (9043) 1M, Puente del indio, 1954; (9045 y 9052) 1H y 1M, Las Juntas, 1954; (9046 y 9048) 1M y 1H, La Angostura, 1954; (9677) 1?, Las Tacanas, 1955; (14563) 1M, Dique El Cadillal, 1976; (15103) 1?, San Miguel de Tucumán, Zona Sur; 1995; (17176) 1?, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., sin fecha.

- en pedestal: (272) 1H, Iltico, 1909.
- en alcohol: (17283) 1?, Dpto. Capital, sin localidad, 1987.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En expansión. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

23. Familia Cardinalidae

Seis especies en Argentina y tres presentes en Tucumán.

Piranga flava

FUEGUERO COMÚN / HEPATIC TANAGER / SANHAÇU-DE-FOGO

- HÁBITAT: Bordes de selvas, capueras, bosques y sabanas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando cordillera, hasta San Juan, norte de San Luis, Córdoba, Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) El Mollar, Tafí del Valle (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tapia, Vipos, Trancas (Trancas), Amaicha del Valle (Tafí del Valle), El Sunchal (Burrucacú), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Monteagudo (Simoca), San Javier (Yerba Buena); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Sierra de San Javier (Yerba Buena), Finca Las Higuierillas (J. Bautista Alberdi), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (366) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (566) 1M, Tiro Argentino, 1945,

(640) 1M, Los Nogales, 1946; (1029) 1M, El Saladillo, 1946; (1334) 1M, sin localidad, 1904; (1335, 1346) 2M, sin localidad, 1898; (1336) 1H, Tapia, 1902; (1337) 1H, Río Salí, 1902; (1347) 1M, Cerro de Tucumán, 1900; (1348 y 1349) 1M y 1?, sin localidad, 1902; (1563, 1569) 2M, Tapia, 1946; (6616) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8618) 1M, San Pedro de Colalao, 1952; (8850) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1957; (10346) 1M, Dpto. Trancas, sin localidad, 1956; (10576) 1M, Rearte Norte, 1957; (10753) 1M, San Pedro de Colalao, 1957; (12331) 1H, San Pedro de Colalao, Cruz Cañada, 1962; (12332) 1M, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1962.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como perteneciente a la Familia Thraupidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pheucticus aureoventris

REY DEL BOSQUE / BLACK-BACKED GROSBEAK

- HÁBITAT: Yungas, Chaco Serrano y quebradas húmedas.
- DISTRIBUCIÓN: Por el norte y centro del país, exceptuando la cordillera y la Mesopotamia. Entre 1000 y 2500 m snm, desde el este de Jujuy y Formosa hasta San Juan, norte de San Luis y Córdoba. Posiblemente en La Pampa.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Quebradas del Río Blanquito, de los Alisos, de la Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Chulcas (Trancas), Cuesta de Chasquivil (Tafí Viejo), Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), El Taficillo (Tafí Viejo), El Sunchal, Sierra de Medina (Burruyacú), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Vipos, Tapia (Trancas), Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (649) 1H, El Timbó, 1946; (75) 1H, Timbó Viejo, 1946; (329) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (342) 1H, El Sunchal, 1946; (541) 1M, Tranquitas, 1946; (861, 862, 2466, 3214) 4M, San Pedro de Colalao, 1946; (1058) 1M, Taficillo, 1929; (1238) 1H, El Saladillo, 1946; (2103) 1M, Cerros de Tafi-700 m snm, sin fecha; (2104) 1H, Cumbre de los Nogales, 1901; (2106) 1H, El Timbó, 1929; (2108) 1H, Dpto. Tafi Viejo, sin localidad, 1902; (2109) 1M, sin localidad, 1898; (2530) 1M,

San Miguel de Tucumán, 1946; (6617) 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, sin fecha; (8034 y 8036 y 8085) 1? y 1H y 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (9630) 1H, Taficillo, 1955; (9646) 1M, Hualinchay, 1955; (12425) 1M, San Pedro de Colalao, 1963; (12576 y 12579) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, junta de los Ríos, 1963; (12578) 1M, San Pedro de Colalao, 1962; (17397) 1H, Yerba Buena, Calle Jonás Salk 2880, 2012.

– en pedestal: (304) 1M, La Calera, 1909.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como perteneciente a la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Cyanoloxia brissonii

REINAMORA GRANDE / ULTRAMARINE GROSBEAK / AZULAO-VERDADEIRO

- HÁBITAT: Selvas, bosques, selvas en galería y monte chaqueño.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta San Juan, norte de San Luis, Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) barrio Costas II (Tafí del Valle); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Soria *et al.* (2010) El Bañado (Tafí del Valle); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Dique San Ignacio (La Cocha), Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Los Puestos (Leales), Piedra Tendida, El Sunchal, Burruyacú (Burruyacú), Ticucho (Trancas), El Bañado (Tafí del Valle); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, San Pedro de Colalao (Trancas), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena), Arroyo Mista (Leales), El Sunchal, 7 de Abril, Río Urueña (Burruyacú), Valle de Yocavil (Tafí del Valle); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (80 y 7822) 1M y 1H, El Timbó, 1946; (125) 1M, S/Dpto., El Cadillal, 1946; (130) 1H, Las Pavitas, 1946; (373, 403) 2M, Mariño, 1946; (642) 1H, Zárate Norte, 1946; (1024, 2009 y 2020) 2M y 1H, Leales, 1946; (1144, 1183, 1621, 2293 y 1647, 2109, 2265, 2407, 2421 y 2313) 4M y 5H y 1?, El Saladillo, 1946; (1172) 1M,

Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (1390 y 1412) 1M y 1H, Las Cañitas, 1946; (1985 y 1993) 1M y 1H, Yerba Buena, 1946; (2088, 2097) 2M, sin localidad, 1898; (2090) 1M, sin localidad, 1899; (2091 y 2093, 2094) 1M y 2H, sin localidad, 1928; (2092) 1M, sin localidad, 1929; (2099) 1H, sin localidad, 1900; (2100) 1M, sin localidad, 456 m snm, 1898; (2101) 1H, sin localidad, 450 m snm, 1900; (2102) 1H, sin localidad, 1907; (2732 y 2736) 1H y 1M, S/Dpto., Río Colorado, 1946; (6353) 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (9039) 1M, La Angostura, 1954; (9040, 9042) 2M, Zárate, 1954; (9041) 1M, Río Chilca, 1953; (9191, 9194) 2H, Rearte Norte, 1954; (9443) 1M, San Pedro de Colalao, 1955; (9447) 1M, Dpto. Trancas, sin localidad, 1955; (14829) 1H, Amaicha del Valle-Finca El Chañaral, 1985; (17471, 17474) 2M, Arroyo Mista, 2005.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019f); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Cyanocompsa brisonii* perteneciente a la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

24. Familia Thraupidae

105 especies en Argentina y 51 presentes en Tucumán. Tres de las cuales son endémicas. Tres especies incluidas en el Apéndice 2, de las que se necesitan datos para confirmar su presencia en la provincia.

Hemithraupis guira

SAÍRA DORADA / GUIRA TANAGER / SAÍRA-DE-PAPO-PRETO

- HÁBITAT: Estrato alto y medio en selvas y bosques.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En Jujuy, Salta y Tucumán y en Misiones y extremo norte de Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1406) 1M, sin localidad, 1904.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Conirostrum speciosum

SAÍ COMÚN / CHESTNUT-VENTED CONEBILL / FIGUINHA-DE-RABO-CASTANHO

- HÁBITAT: Estrato medio y alto en selvas, selvas en galería, monte, capueras y bosques del norte.

- **DISTRIBUCIÓN:** Todo el norte del país, excepto la zona cordillerana, desde Jujuy a Tucumán y este de Santiago Estero, en Formosa, norte de Chaco, Corrientes y Misiones.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Navarro y Marigliano (2009) Km 11 Ruta 341 (Trancas).
- **MATERIAL ESTUDIADO:** sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- **LITERATURA:** Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e).
- **OBSERVACIONES:** UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sicalis citrina

JILGUERO COLA BLANCA / STRIPE-TAILED YELLOW-FINCH / CANÁRIO-RASTEIRO

- **HÁBITAT:** Alisales, estepas altoserranas y laderas escarpadas.
- **DISTRIBUCIÓN:** En una angosta faja en el NOA, desde Salta a Tucumán.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Moschione (2007) Parque Provincial Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle/ Trancas), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz *et al.* (2013a) Tafí del Valle (Tafí del Valle), Piedra Tendida, Sierra de Medina (Burruyacú).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (2269) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Cumbres de Mala Mala, 1901; (10744) 1H, Hualinchay, 1957.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** (2269) colectado por Miguel I. Lillo. En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: IC.

Sicalis uropygialis

JILGUERO CARA GRIS / BRIGHT-RUMPED YELLOW-FINCH / CHIRIGÜE

- **HÁBITAT:** Puna, prepuna y estepas altoandinas con pastizales y arbustales dispersos y en construcciones.
- **DISTRIBUCIÓN:** Entre 3000 y 4000 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) Huaca Huasi (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Huaca-Huasi (Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Cumbres Calchaquíes y de Quilmes (Tafí del Valle), Cumbres del Aconquija (S/Dpto.).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2172) 1M, Lagunas, 4500 m snm, 1903.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sicalis auriventris

JILGUERO GRANDE / GREATER YELLOW-FINCH

- HÁBITAT: Estepas andinas, en pastizales y arbustales dispersos.
- DISTRIBUCIÓN: En la zona cordillerana desde Salta hasta Santa Cruz. Las poblaciones del sur se desplazan al norte en invierno.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Alderete y Capllonch (2012) El Molle (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: López-Lanús (2017), de la Peña (2019e).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sicalis olivascens

JILGUERO OLIVÁCEO / GREENISH YELLOW-FINCH

- HÁBITAT: Estepas altoandinas, puna y prepuna. En sectores con matas dispersas.
- DISTRIBUCIÓN: En el oeste del país, desde Jujuy y Salta por Catamarca, Tucumán y La Rioja hasta el norte de Neuquén.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Lagunas de Huaca-Huasi, Cerro Muñoz, Ampimpa, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Huaca-Huasi (Tafí Viejo), El Molle (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2012) El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle), Huaca Huasi (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Huaca-Huasi, La Ciénaga (Tafí Viejo), Laguna de Los Amaicheños, Sierra de Quilmes, El Infiernillo, El Remate, El Pichao (Tafí del Valle), La Ciudadita (Chicligasta); Salvador y Di Giacomo (2014) Tafí del Valle (Tafí del Valle); Salvador (2015) El Infiernillo 3000 m snm (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1483) 1M, Colalao del Valle, 1912; (2262) 1H, Dpto. Lules, Cumbres de Mala Mala, 1904; (2266) 1M, Cerro Muñoz, 1905; (8614) 1H, El Infiernillo, 1954; (8615, 8617) 2M, Amaicha del Valle, 1954; (8616) 1M, El Infiernillo, Los Cardones, 1953, 1954; (17336) 1M, Ampimpa, 2004.

- MATERIAL ESTUDIADO, posiblemente de *S. mendozae*:
 - en piel: (9364 y 9414) 1H y 1M, Colalao del Valle, 1916; (11234) 1?, Amaicha del Valle, 1958; (15061) 1M, El Infiernillo, a 9 Km antes de Los Cardones, 1987.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: Hasta hace poco considerado conespecífico con *S. mendozae*, pero muy recientemente separado por rango de especie (del Hoyo *et al.* (2019). En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sicalis flaveola

JILGUERO DORADO / SAFFRON FINCH / CANÁRIO-DA-TERRA-VERDADEIRO

- HÁBITAT: Bosques, espinales, áreas rurales y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y el noreste de Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Colalao del Valle, El Bañado (Tafí del Valle), Chulcas (Trancas), Agua Salada (Leales); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Leales (Leales), Horco Molle (Yerba Buena); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (221) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1946; (521) 1M, Caspinchango, 1946; (584) 1M, Alpachiri, 1946; (597) 1?, Arroyo Cainzo, 1914; (784, 809, 821 y 824) 3M y 1H, El Guardamonte, 1946; (855) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (958) 1M,

San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1117, 1365) 2M, Las Cañitas, 1946; (1481) 1M, sin localidad, 1929; (1502) 1M, Leales, 1915, (1639, 2380, 2386, 2385 y 2018, 2336, 2494, 2757, 3153) 4H y 5M, El Saladillo, 1946; (1956) 1M, Tapia, 1946; (2011) 1M, Leales, 1946; (2033, 2034, 2453 y 2272, 2293) 3H y 2M, Yerba Buena, 1946; (2177) 1M, sin localidad, 1899; (2178 y 2183) 1M y 1H, sin localidad, 1900; (2180) 1M, Dpto. Capital, sin localidad, 1900; (2186) 1M, Colalao del Valle, 1912; (2735) 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (3486) 1M, Cerros de Tañi, 1947; (6317) 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (6575, 6585) 2M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (7126) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (8477 y 8480) 1H y 1M, Laguna Calimayo, La Reducción, 1953; (9026) 1M, Casa de Piedra, 1954; (9115) 1H, Las Tacanas, 1954; (9213) 1M, San Pedro de Colalao, 1954; (9708) 1H, Dpto. Tañi Viejo, Cerro San Javier, 1955; (10436 y 10437) 1H y 1M, La Angostura, 1957; (17186) 1H, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., sin fecha; (17225) 1M, El Vizcacheral, 1993; (17461) 1H, Santa Inés, 2006.

– en pedestal: (297) 1M-1H, Dpto. Chicligasta, Santa Cruz, 1910; (625) 1H, Concepción, 1916.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sicalis luteola

MISTO / GRASSLAND YELLOW-FINCH / TIPIO

- HÁBITAT: Sabanas, pastizales y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta el norte de Santa Cruz. Probablemente hasta Tierra del Fuego.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) Tañi Viejo (Tañi Viejo), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2000) Tañi Viejo (Tañi Viejo), Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tañi Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tañi Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tañi Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tañi (Tañi del Valle); Capllonch y Araoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tañi del Valle); Gómez (2010) Arroyo Tañi (Tañi Viejo); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burruyacú); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental

de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tafi del Valle (Tafi del Valle), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Chormoro (Trancas); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafi del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (2174) 1H, sin localidad, 1898; (2175, 2176 y 2182) 2M y 1H, sin localidad, 1899; (9914, 9915, 9941) 3M, Dpto. Tafi Viejo, Los Pocitos, 1956.

– en pedestal: (725) 1?, Concepción, 1908; (725) 1M, Concepción, 1928.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phrygilus atriceps

COMESEBO CABEZA NEGRA / BLACK-HOODED SIERRA-FINCH

● HÁBITAT: Estepas arbustivas altoandinas.

● DISTRIBUCIÓN: entre 3000 y 4000 m snm desde Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja hasta el sudoeste de San Juan.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) El Infiernillo y Valles Calchaquíes (Tafi del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.

● LITERATURA: de la Peña (2019e).

● OBSERVACIONES: Incluida anteriormente en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Phrygilus gayi

COMESEBO ANDINO / GRAY-HOODED SIERRA-FINCH

● HÁBITAT: En terrenos áridos, andinos y patagónicos con arbustales dispersos.

● DISTRIBUCIÓN: Como residente en una franja, hasta 3000 m snm, por la zona montañosa del oeste desde Jujuy hasta Mendoza y desde Neuquén y Río Negro, llegando a Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En otoño/ invierno desciende a menores altitudes. Las poblaciones de Santa Cruz que migran al norte, llegan hasta Tucumán.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafi Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres Calchaquíes, La Ciénaga (Tafi del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafi del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Huaca-Huasi (Tafi Viejo), El Molle (Tafi del Valle); Alderete y Capllon-

ch (2012) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres Calchaquíes, del Aconquija y de Quilmes, El Remate, El Molle, Km 95 de la Ruta 307, El Pichao, Amaicha del Valle (Tafí del Valle), La Ciénaga (Tafí Viejo).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1062) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1497) 1M, Colalao del Valle, 1913; (1498) 1M, Colalao del Valle, 1912; (2081) 1M, El Infiernillo, 1946; (2240 y 2246) 1H y 1M, Colalao del Valle, 1916; (8978) 1H, Entre El Infiernillo y Amaicha, Aconquija, 1955; (11232) 1M, Amaicha del Valle, 1958; (11388) 1?, Amaicha del Valle, Tío Punco, 1959.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Geospizopsis unicolor

YAL PLOMIZO / PLUMBEOUS SIERRA-FINCH

- HÁBITAT: Estepas altoandinas, arbustales y pastizales de altura.

- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En una franja por el oeste del país. Entre 2000 y 3000 m snm desde Jujuy al norte de Tierra del Fuego y en las sierras de Córdoba y San Luis. Registros aislados en el centro de Río Negro y en Chubut.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Valle de Tafí, Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo) y El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Piloni y Camperi (2011) Aconquija, Amaicha del Valle, El Infiernillo, Huaca Huasi, La Ciénaga, Laguna del Negrito, Lara (Tafí del Valle), Cuesta de Mala Mala (Lules), Las Pavas (Chicligasta), San Pedro de Colalao (Trancas); Alderete y Capllonch (2012) Ciénaga Grande 2500 m snm, Puesto Las Bolsitas y Piedras Blancas en Cerro Pabellón (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Molle (Tafí del Valle), Ciénaga Grande (Tafí Viejo).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (2072, 2079, 2086) 3H, El Infiernillo, 1946; (2273) 1M, La Ciénaga, 1903; (2303) 1M, La Ciénaga, 1901; (2304) 1M, Cuesta de Mala Mala, 1901; (5190, 5192, 5206, 5267 y 5217, 5235) 4M y 2H, El Infiernillo, 1947; (5195) 1M, Laguna Calchaquí, 1947; (5356) 1M, Cerro El Negrito, 1948; (8611) 1M, La Ciénaga, 1953; (10766) 1M, Valles Calchaquíes, 1957; (15057, 15058) 2M, El Infiernillo, 1987.

- en pedestal: (292) 1M-1?, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Phrygilus unicolor*, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Geospizopsis plebejus

YAL CHICO / ASH-BREASTED SIERRA-FINCH

- **HÁBITAT:** Estepas altoandinas y pastizales altoserranos.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. Entre 3000 y 4000 m snm desde Jujuy al sur de Mendoza y en las sierras de Córdoba y San Luis.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) El Infiernillo, Ampimpa (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Huaca Huasi (Tafí Viejo), El Molle (Tafí del Valle); Salvador (2015) El Infiernillo 3000 m snm (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (2055, 2080 y s/nº) 2H y 1M, El Infiernillo, 1946; (2271 y 2282) 1H y 1M, La Ciénaga, 1903; (5207) 1M, El Infiernillo, 1947; (8609) 1M, Amaicha del Valle, 1954; (8610) 1H, El Infiernillo, 1954; (10745) 1H, Valles Calchaquíes, 1957; (10749) 1H, Valles Calchaquíes, 1956; (s/nº) 1M, Camino entre Tafí del Valle y Amaicha, 1946.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) como *Phrygilus plebejus*, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Rhopospina fruticeti

YAL NEGRO / MOURNING SIERRA-FINCH

- **HÁBITAT:** Estepas andinas y patagónicas y quebradas boscosas, en arbustales, matorrales y setos.
- **DISTRIBUCIÓN:** Por el oeste del país desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza se extiende hasta el este llegando al sur de Buenos Aires y ocupando toda la Patagonia e Islas Malvinas. En invierno llega a Tucumán, Córdoba y San Luis.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Huaca-Huasi (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2012) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) La Ciénaga (Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Lara, Sierra de Quilmes, El Remate, El Pichao (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (2254) 1M, Lara, 1912; (2611) 1?, El Infiernillo, 1946; (8613) 1M, Amaicha del Valle, 1953.
 - en pedestal: (310) 1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1909.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Phrygilus fruticeti*, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Rhopospina alaudina

YAL PLATERO / BAND-TAILED SIERRA-FINCH

- HÁBITAT: Estepas altoandinas y pastizales altoserranos con arbustales bajos y dispersos.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre 3000 y 4000 m snm en Jujuy, Salta, Catamarca, oeste de Tucumán, La Rioja y San Juan y en las sierras de Córdoba y San Luis. Registros aislados en el centro de Río Negro y en Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2008c) La Angostura (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2012) Puesto Las Bolsitas en el Cerro Pabellón (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres Calchaquíes, del Aconquija y de Quilmes, La Quebradita, El Infiernillo, Puesto Las Bolsitas y Piedras Blancas en Cerro Pabellón (Tafí del Valle), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Echevarria y Martínez (2018) La Angostura (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (978) 1H, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1064, 1100 y 1084) 2H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2045, 2075, 2077, 2515 y 2073) 4M y 1H, El Infiernillo, 1946; (2274) 1M, Tafí del Valle, 1907; (2301) 1H, La Ciénaga, 1902; (4542, 5176, 5208, 5224, 5268 y 5227) 5M y 1H, El Infiernillo, 1947; (7975) 1M, Tafí del Valle, 1952; (12354) 1M, San Pedro de Colalao, Alto La Totorá, 1962; (17048) 1M, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.
 - en pedestal: (469) 1M-1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1912.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Phrygilus alaudinus*, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Rhopospina carbonaria

YAL CARBONERO / CARBONATED SIERRA FINCH

- HÁBITAT: Estepas arbustivas y patagónicas, arbustales, matorrales y salitrales.

- **DISTRIBUCIÓN:** Desde sur de Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, por el este de Neuquén, Río Negro y Chubut hasta el norte de Santa Cruz. También en Sierras de Córdoba. En otoño la población más austral migra hasta Tucumán, Santiago del Estero y sur de Santa Fe.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Quiroga (2018) Lomas de Tafí (Dpto. Tafí Viejo); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (2299) 1M, sin localidad, 1900; (12362) 1H, San Pedro de Colalao, Tierra Colorada, 1962.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** Especie endémica. En Narosky e Yzurieta (2010) como *Phrygilus carbonarius* incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Idiopsar dorsalis

COMESEBO PUNEÑO / RED-BACKED SIERRA-FINCH

- **HÁBITAT:** Estepas altoandinas y pastizales dispersos en laderas rocosas.
- **DISTRIBUCIÓN:** Entre 4000 y 4500 m snm en Jujuy, oeste de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. También en Sierras de Córdoba.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Huaca-Huasi, Cumbres Calchaquies (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Huaca-Huasi (Tafí Viejo), El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Huaca-Huasi (Tafí Viejo), Laguna de Los Amaicheños, El Infiernillo, Sierra de Quilmes (Tafí del Valle), La Ciudadita (Chicligasta).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (2326) 1M, Lagunas, Cerro de la Laguna, 1913, (5248) 1M, Laguna El Negrito, 1947; (5353) 1M, Cerro El Negrito, 1948; (8595) 1M, Cerro Muñoz, 1954; (2306) 1M, Las Lagunas, 1903; (2307) 1H, Laguna de Pasayán, 1905; (17300) 1?, Huaca Huasi, 2004; (17465, 17481) 2?, Huaca Huasi, Vega matadero, 2005.
 - en pedestal: (283) 1M, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) como *Phrygilus dorsalis*, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Idiopsar brachyurus

YAL GRANDE / BOULDER FINCH

- **HÁBITAT:** Estepas altoandinas y quebradas rocosas con matorrales y pastizales.
- **DISTRIBUCIÓN:** Entre 2000 y 3000 m snm en Jujuy, Salta, este de Tucumán y Catamarca.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2005) Cumbres de Tafí (S/Dpto.), Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.), Altiplanicie de Huaca-Huasi (S/Dpto.), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) El Infiernillo (Tafí del Valle), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Moschione (2007) Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Parque Provincial Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle/ Trancas), El Infiernillo (Tafí del Valle), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/ Monteros); Capllonch y Moyano Wagner (2010) Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2012) Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Ciénaga Grande (Tafí Viejo), La Cascada en Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Cumbres Calchaquíes, del Aconquija y de Quilmes (S/Dpto.).
- **MATERIAL ESTUDIADO:**
 - en piel: (5236) 1M, El Infiernillo, 1947.
 - en pedestal: (458) 1M-1H, Las Pavas, 1924.
- **LITERATURA:** de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- **OBSERVACIONES:** En Narosky e Yzurieta (2010) nombre en inglés SHORT-TAILED FINCH, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: IC.

Catamenia analis

PIQUITODEORO COMÚN / BAND-TAILED SEEDEATER

- **HÁBITAT:** Estepas altoandinas, quebradas, Chaco Serrano y pastizales de altura.
- **DISTRIBUCIÓN:** Disyunta. Entre 2000 y 3000 m snm desde Jujuy por el oeste hasta el sur de Mendoza. También en las sierras de Córdoba y San Luis y en las sierras de La Ventana en Buenos Aires. En invierno migra hacia las llanuras del este del país.
- **LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN:** Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) La Ovejera, Cerro Muñoz, El Mollar (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga, El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) Ciénaga Grande, Huaca- Huasi (Tafí Viejo), La Ciénaga, El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012)

La Ciénaga, El Remate en Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres Calchaquíes, Amaicha del Valle, Cumbres de Quilmes (Tafí del Valle), Cumbres del Aconquija (S/Dpto.), Arroyo Mista, Leales (Leales), Yerba Buena, Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (169) 1M, Tafí Viejo, 1946; (865 y 874) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (968, 975 y 977) 2H y 1M, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1140) 1H, Las Cañitas, 1946; (1276 y 2242) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2279, 2283, 2284) 3M, sin localidad, 1900; (2285) 1H, Tapia, 1915; (2294) 1?, Tafí Viejo, 1915; (5470, 5473, 5482 y 5471) 3M y 1H, Tafí del Valle, 1948; (3147) 1H, Dpto. Tafí Viejo, El Saladillo, 1946; (8055) 1M, Los Pocitos, 1952; (8596) 1M, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1953; (9116) 1M, Dique Tacanas, 1954; (15070) 1H, El Infiernillo, 1987.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Catamenia inornata

PIQUITODEORO GRANDE / PLAIN-COLORED SEEDEATER

● HÁBITAT: Estepas altoandinas y altoserranas con pastizales y arbustales dispersos en suelos rocosos.

● DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre 3500 y 4000 m snm desde Jujuy, Salta, noroeste de Tucumán y Catamarca hasta el oeste de La Rioja y San Juan y en las sierras de Córdoba y San Luis.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Cumbres de Tafí, Cerro Muñoz, Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga, Ciénaga Grande (Tafí Viejo), El Infiernillo, El Molle (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2012) Puesto las Bolsitas en Cerro Pabellón, El Infiernillo, Rancho del Hombre Solo (Tafí del Valle), Ciénaga Grande (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2013a) Valle de Yocavil (Tafí del Valle); Salvador (2015) El Infiernillo 3000 m snm (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (2275 y 9418, 9419) 1M y 2H, Colalao del Valle, 1916; (2276, 2286) 2M, La Ciénaga, 1903; (9685, 9702) 2M, Tafí del Valle, 1955; (17084) 1?, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.

– en pedestal: (305) 1H, Dpto. Tafí del Valle, Aconquija, 1910.

– en alcohol: (17571) 1M, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Diglossa sittoides

PAYADOR CANELA / RUSTY FLOWERPIERCER

- HÁBITAT: Estrato bajo y medio en selvas y bosques montanos del noroeste.
- DISTRIBUCIÓN: Entre 1800 y 2500 m snm en Jujuy, Salta y Tucumán. Posiblemente en Catamarca y La Rioja.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) El Mollar, Tafí del Valle (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), La Banderita (Chicligasta), Taficillo, Tafí Viejo, La Ciénaga (Tafí Viejo), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena); Soria y Barboza (2016) El Infiernillo (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1437) 1H, Puesto Viejo, 1906; (1438) 1M, La Ciénaga, 1905; (1439) 1H, Villa Nougés, 1903; (7352) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Volatinia jacarina

VOLATINERO / BLUE-BLACK GRASSQUIT / TIZIU

- HÁBITAT: Sabanas, pastizales, bordes de monte y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta este de Mendoza, sur de San Luis, centro de Córdoba y Santa Fe y noreste de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Ortiz y Capllonch (2010) Colombres (Cruz Alta); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Colombres (Cruz Alta); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Tafí del Valle (Tafí del Valle); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2281) 1M, sin localidad, 1900; (2289) 1M, sin localidad, 1899; (9772, 9773, 9777, 9808) 4M, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956; (10008) 1H, San Pedro

de Colalao, 1956; (12584, 12586) 2M, San Pedro de Colalao, 1962; (15309) 1M, San Miguel de Tucumán, 1991.

– en pedestal: (470) 1M-1H-1?, Concepción, 1917.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Coryphospingus cucullatus

BRASITA DE FUEGO / RED-CRESTED FINCH / TICO-TICO-REI-VERMELHO

- HÁBITAT: Selvas, capueras, bosques, espinales, arboledas y sabanas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste, hasta San Juan, norte de San Luis, sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. Probablemente también en el sur de Buenos Aires y La Pampa.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) El Cadillal (S/Dpto.), Ticucho (Trancas), Río Anta Yacu, Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Los Puestos, Arroyo Mista (Leales), Piedra Tendida (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho, Trancas (Trancas), Río Urueña (Burruyacú), Leales (Leales), Monteagudo (Simoca), Horco Molle (Yerba Buena), (Cruz Alta); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Capllonch (2015) Trancas (Trancas); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (156, 1417 y 164, 165, 1409, 1415, 2628) 2H y 5M, Las Cañitas, 1946; (222) 1M, Tafí Viejo, 1946; (280) 1M, Los Gómez, 1946; (395) 1M, Alpachiri, 1946; (546, 561) 2M, Tranquitas, 1946; (604) 1H, Tapia, 1946; (931, 1653, 2106, 3152 y 2023, 2038, 2342, 3140) 4M y 4H, El Saladillo, 1946; (970) 1M, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (1258, 1935, 2465 y 1273 y 1934) 3M y 1H y 1?, San Pedro de Colalao,

1946; (1500) 1M, Quilmes, 1920; (1501) 1H, Los Sarmientos, 1931; (2295) 1H, Tapia, 1901; (2296, 2298) 2M, sin localidad, 1898; (9118) 1M, Dique Tacanas, 1954; (9671) 1M, Las Tacanas, 1955; (10603 y 10703) 1M y 1H, El Simbolar, 1957; (14940) 1M, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 1986.

– en pedestal: (282) 1M, Alpachiri, 1909; (282) 1H, Concepción, 1909.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Tersina viridis

TERSINA / SWALLOW Tanager / Saí-ANDORINHA

- HÁBITAT: Selvas y bordes de selvas en galería.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. En el norte de Salta y en Misiones. Registros aislados en Tucumán, Corrientes, noreste de Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz (2009) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Araújo (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (17451) 1?, Reserva Experimental Horco Molle, 2009.
- LITERATURA: López-Lanús (2017); de la Peña (2019e).
- OBSERVACIONES: Especie vagante. Se observó por primera vez en el noroeste en la provincia de Salta (Di Giacomo, Di Giacomo, López-Lanús y Caradonna, 1995) y luego en Tucumán (Ortiz, 2009). Existen algunos registros para Buenos Aires (Holland, 1891, 1892; Dabbene, 1910; Narosky y Di Giacomo, 1993) y La Pampa (Darrieu, 1994). Zelaya, Salvador, Giraudo y Klavins (2013) dieron a conocer los primeros registros para la ecoregión chaqueña. En San Juan, se colecta el ejemplar informado por Francisco Lucero (EcoRegistros Revista, 3(14): 52-63. 2013). En Corrientes se corrobora la presencia mediante nota y fotografías (Franzoy, A. V. 2016. Presencia de *Tersina (Tersina viridis)* en la provincia de Corrientes, Argentina. EcoRegistros Revista, 6(5): 16-19). UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sporophila lineola

CORBATITA OVERO / LINED SEEDEATER / BIGODINHO

- HÁBITAT: Sabanas y bosques en el norte.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país hasta Tucumán, norte de Santiago del Estero, centro de Santa Fe y Corrientes.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Horco Molle (Yerba Buena), El Sunchal (Burruyacú); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Mari-gliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (10874 y 10878) 1M y 1H, San Pedro de Colalao, 1958; (10955) 1H, La Higuera, 1958; (12245, 12246, 12446) 3M, La Mesadas, 1962.
 - en pedestal: (626) 1M, Concepción, 1917; (626) 1H, sin localidad, sin fecha.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sporophila leucoptera

CORBATITA BLANCO/ WHITE-BELLIED SEEDEATER/ CHORÃO

- HÁBITAT: Sabanas, pastizales y humedales.
- DISTRIBUCIÓN: En el norte y centro del país, hasta Tucumán, norte de Santa Fe y Corrientes, probablemente llega a Santiago del Estero.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch *et al.* (2005) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sporophila hypoxantha

CAPUCHINO CANELA / TAWNY-BELLIED SEEDEATER

- HÁBITAT: Pastizales en áreas rurales, praderas, sabanas y bañados.
- DISTRIBUCIÓN: Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Sante Fe, este de Córdoba y Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2013a) (Cruz Alta), Horco Molle (Yerba Buena), Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro

(2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: VU.

Sporophila ruficollis

CAPUCHINO GARGANTA CAFÉ / DARK-THROATED SEEDEATER /
CABOCLINHO-DE-PAPO-ESCURO

- HÁBITAT: Sabanas, pastizales, bordes de espinal, cardales y áreas rurales.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera y Misiones, hasta Tucumán, norte de Catamarca, Santiago del Estero, este de Córdoba y norte de Buenos Aires. Algunas poblaciones migran al norte en invierno.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Ticucho, Trancas (Trancas), Río Urueña (Burruyacú), Leales (Leales), Monteagudo (Simoca), Horco Molle (Yerba Buena), (Cruz Alta).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2123) 1M, sin localidad, 1901; (2140) 1M, Laguna de Malvinas, 1903; (2141) 1M, sin localidad, 1900; (9202, 9395, 9603, 9770, 9793, 9794, 9795, 9801, 9802, 9811 y 9792, 9810, 9916) 10M y 3H, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956.
 - en pedestal: (667) 1M-1H, Concepción, 1918.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: NT; MAyDS y AA: VU.

Sporophila caerulescens

CORBATITA COMÚN / DOUBLE-COLLARED SEEDEATER / COLEIRINHO

- HÁBITAT: Sabanas, matorrales, estepas arbustivas, áreas rurales y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la zona cordillerana, hasta Chubut. Algunas poblaciones del sur migran en invierno al norte del país.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarría y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarría y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarría y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Ortiz y Capllonch

(2007) Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena), Dique San Ignacio (La Cocha), Arroyo Mista (Leales), Monteros (Monteros); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burruyacú); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Amaicha del Valle (Tafí del Valle); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (2111, 2114, 7870 y 2112) 3M y 1H, sin localidad, 1929; (2113) 1H, sin localidad, 1898; (2121) 1H, sin localidad, 1903; (2135) 1M, sin localidad, 1899; (2143) 1M, sin localidad, 1901; (6309) 1M, San Pedro de Colalao, Puesto del Alto, 1950; (6348) 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (6367) 1H, Tranquitas, 1950; (7701) 1H, sin localidad, 1938; (9408) 1H, sin localidad, 1930; (9774, 9804 y 9809, 9812) 2M y 2H, Dpto. Tafí Viejo, Los Pocitos, 1956; (9866 y 9870) 1M y 1H, La Angostura, 1956; (15156 y 15158) 1H y 1M, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986; (15167) 1H, Campo Norte, 1986; (15168) 1M, Campo Norte, 1988; (17433, 17460 y 17476) 2H y 1M, Santa Inés, 2006; (17497) 1H, El Naranjo, 2004.

- en pedestal: (307) 1M-1H-1?, Concepción, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Sporophila collaris

CORBATITA DOMINÓ / RUSTY-COLLARED SEEDEATER / COLEIRO-DO-BREJO

- HÁBITAT: Pastizales, sabanas y matorrales asociados a humedales.

- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones, por el este de Tucumán, Catamarca y La Rioja hasta el noreste de Mendoza y La Pampa, y desde Córdoba y sur de Santa Fe hasta el norte de Buenos Aires. En invierno migran al norte luego de reproducirse.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Arroyo Mista, Los Gómez (Leales).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (2131) 1H, El Manantial, 1903.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Saltatricula multicolor

PEPITERO CHICO/ MANY-COLORED CHACO-FINCH

- HÁBITAT: Bosques y sabanas de tipo chaqueño.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones hasta noreste de Neuquén, Río Negro, La Pampa y sur de Buenos Aires y desde el norte de Corrientes hasta el norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital) y Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Tapia, Trancas); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Alderete y Capllonch (2012) Ticucho (Trancas); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, 7 de Abril, El Sunchal (Burruyacú), Monteagudo (Simoca), Leales, Los Gómez (Leales), Ticucho (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena), Escaba (J. Bautista Alberdi), La Ciénaga (Tafí Viejo); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2224) 1M, Campo Azul, 1915; (2226) 1M, sin localidad, 1900; (2227) 1M, sin localidad, 1899; (2228) 1H, Los Gómez, 1915; (2229) 1H, Tapia, 1901; (9518) 1M, El Guardamonte, 1955.
 - en pedestal: (318) 1M-1H, Toro Muerto, 1910.
 - en alcohol: (17612) 1?, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 2009.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Saltator coerulescens

PEPITERO GRIS / GRAYISH SALTATOR / SABIÁ-GONGÁ

- HÁBITAT: Capueras, sabanas, bordes de bosques y sus alrededores.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera hasta el norte de La Rioja, noreste de San Luis, centro de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) Reserva Experimental Horco Molle (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) El Cadillal (S/Dpto.), Río Tapia (S/Dpto.), El Sunchal, Piedra Tendida (Burruyacú), Los Puestos, Arroyo Mista (Leales), Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales), Yerba Buena (Yerba Buena), El Bañado en Amai-cha del Valle (Tafí del Valle); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (106) 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (178) 1M, La Ramada, 1946; (273) 1M, Los Romanos, 1946; (289) 1H, Los Gómez, 1946; (306) 1M, Tapia, 1946; (458) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (900) 1H, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (986) 1M, Los Nogales, 1946; (1129, 1388 y 1392) 2M y 1H, Las Cañitas, 1946; (1174, 1175, 1177 y 2065, 2090) 3M y 2H, Dpto. Lules, sin localidad, 1946; (1321, 2451 y 1429) 2H y 1?, Yerba Buena, 1946; (1419) 1H, Dique La Aguadita, 1946; (1463) 1H, El Manantial, 1902; (1464) 1M, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1903; (1465) 1H, sin localidad, 1938; (1466) 1H, sin localidad, 1901; (1468) 1M, Santa Bárbara, 1928; (1553) 1H, La Aguadita, 1946; (1602, 2248, 2362, 2496, 7111 y 1630) 5M y 1H, El Saladillo, 1946; (1948) 1M, Yerba Buena, 1946; (2093 y 2097) 1H y 1M, sin localidad, 1946; (3484) 1M, Cerros de Tafí, 1947; (6340) 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (6592 y 6632) 1H y 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8979, 8982) 2H, La Angostura, 1954; (9635) 1M, Chilca, 1955; (17212 y 17213) 1H y 1M, El Vizcacheral, 1993; (17326) 1?, Dpto. Leales, sin localidad, sin fecha; (17463) 1?, Arroyo Mista, 2005.

– en pedestal: (315) 1M-1H, Concepción, 1909.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Saltator aurantirostris

PEPITERO DE COLLAR / GOLDEN-BILLED SALTATOR / BICO-DURO

- HÁBITAT: Bosques, sabanas, selvas en galería y sus áreas aledañas.
- DISTRIBUCIÓN: Desde norte del país, exceptuando la cordillera y Misiones hasta el sur de Mendoza, La Pampa, costa de Río Negro y noreste de Chubut y desde Corrientes y Entre Ríos hasta el norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Aráoz (2007) Horco Molle, Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Piedra Tendida, El Sunchal (Burruyacú), Los Puestos (Leales), Reserva Provincial Santa Ana, Río Chico (Río Chico), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Ticucho, El Aserradero (Trancas), Arroyo Mista (Leales); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Valle de Yocavil (Tafí del Valle); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (115) 1M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (199, 1969 y 2575) 2M y 1H, Tapia, 1946; (666) 1M, Los Nogales, 1946; (1145 y 1189) 1H y 1?, Las Cañitas,

1946; (1331, 1654 y 1623, 1629) 2M y 2H, El Saladillo, 1946; (1470) 1M, Tapia, 1901; (1471) 1M, sin localidad, 1928; (1474) 1H, sin localidad, 1900; (1631) 1M, Nueva España, 1946; (2206) 1H, San Pedro de Colalao, 1946; (2602) 1H, Dpto. Leales, Río Colorado, 1946; (7859) 1H, El Timbó, 1929; (8317) 1M, El Guardamonte, 1953; (14828) 1H, El Carmen, 13 km al O de Fuerte Quemado, 1985; (17200, 17211) 2H, El Vizcacheral, 1993; (s/nº) 1M, sin Dpto., Aconquija, 1946.

– en pedestal: (316) 1M-1H, Concepción, 1909.

– en alcohol: (17626) 1M, Campo Grande, Las Calandritas, 1996.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Embernagra platensis

VERDÓN/ GREAT PAMPA-FINCH/ SABIÁ-DO-BANHADO

● HÁBITAT: Sabanas, pastizales de altura y de llanura y juncales.

● DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta el sur de Neuquén y Río Negro.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Aráoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Marigliano *et al.* (2010) La Ramada de Abajo (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) El Bañado-Amaicha del Valle (Tafí del Valle), Colombres (Cruz Alta), Ticucho (Trancas); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Banda del Río Salí (Cruz Alta), Leales (Leales), Río Urueña (Burrucacú), Vipos, Tapia (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (95) 1H, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (216) 1H, Tafí Viejo, 1946; (517) 1H, Zárate Norte, 1946; (590) 1H, Ingenio Fronterita, 1946; (1000) 1M, Río Salí, 1946; (1109) 1M, Las Cañitas, 1946; (2006) 1H, Aconquija, 1946; (2232) 1H, sin localidad, 1901; (2235) 1H, Río Salí, 1902; (2408) 1M, El Saladillo, 1946; (2606) 1M, sin Dpto., Aconquija, 1946; (6639) 1?, Dique La Aguadita, 1950; (17470) 1H, Amaicha del Valle, El Bañado; 2008; (17479) 1?, sin localidad, Vipos, 2009.

- en pedestal: (317) 1M, Toro Muerto, 1910; (317) 1H, Iltico, 1910.
- en alcohol: (17535) 1?, 13 km al NO, en el límite Norte de la Estancia Los Chorrillos, Los Chorrillos, 1998.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Poospiza ornata

MONTERITA CANELA / CINNAMON WARBLING FINCH

- HÁBITAT: Estepas arbustivas, arbustales, matorrales y bosques.
- DISTRIBUCIÓN: En el centro del país exceptuando la cordillera, desde Tucumán y sur de Santiago del Estero por el norte de Córdoba y San Luis hasta el este de Neuquén, sur de La Pampa y norte de Río Negro. En invierno migra al norte y al este del país llegando a Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) El Remate, Amaicha del Valle, El Molle (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2153) 1M, Vipos, 1906; (2154) 1M, sin localidad, 1900.
 - en pedestal: (724) 1H, Concepción, 1929.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: Especie endémica. En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Poospiza whitii

SIETEVESTIDOS SERRANO / BLACK-AND-CHESTNUT WARBLING FINCH

- HÁBITAT: Bosques serranos, arbustales y matorrales cerca del agua.
- DISTRIBUCIÓN: Hasta 2500 m snm desde Jujuy, centro de Salta, Tucumán, hasta el oeste de Córdoba, norte de San Luis, noreste de Mendoza.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí

Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) El Sunchal (Burrucuyacú), Colombres (Cruz Alta), Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Escaba (Juan B. Alberdi), Ticucho, San Pedro de Colalao (Trancas), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), Monteagudo (Simoca), Alderete (Cruz Alta), Las Talitas, Tafi Viejo (Tafi Viejo), Arroyo Mista (Leales); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafi Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (571, 17499) 2H, Tiro Argentino, 1946; (603) 1M, Tapia, 1946; (620, 1257) 2M, San Pedro de Colalao, 1946; (922, 1153, 1154, 1339, 2376 y 2299) 5M y 1H, El Saladillo, 1946; (1018) 1M, Quebrada de Lules, 1946; (1364 y 1375) 1H y 1M, Las Cañitas, 1946; (1499) 1H, Taficillo, 1929; (2038, 2040) 2H, Yerba Buena, 1946; (2146 y 2147) 1M y 1H, sin localidad, 1901; (2151) 1M, sin localidad, 1899; (3484) 1M, Cerros de Tafi, 1947; (6296) 1M, San Pedro de Colalao, 1950; (7703) 1H, sin localidad, 1929; (9137) 1H, Zárate Norte, 1954; (9138) 1H, Las Tipas, 1954; (9139) 1M, Dique Tacanas, 1954; (9633) 1M, Taficillo, 1955; (9665) 1H, Las Tacanas, 1955; (9669) 1M, Hualinchay, 1955; (10587 y 10595) 1M y 1H, Rearte Norte, 1957; (15155) 1H, Laguna La Ripiera, San Felipe, 1986; (17342) 1?, Arroyo Mista, 2006.

– en pedestal: (290) 1M-1H, Concepción, 1910.

– esqueleto: (17165) 1M, San Miguel de Tucumán, 1990.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: Considerada por algunos autores como subespecie de *P. nigrorufa* (Shultz y Burns, 2013). En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pospiza baeri

MONTERITA SERRANA / TUCUMAN MOUNTAIN FINCH

● HÁBITAT: Bordes de bosques montanos y quebradas húmedas en pastizales de altura en el noroeste.

● DISTRIBUCIÓN: Entre 2000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y norte de La Rioja.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafi Viejo); Ortiz *et al.* (2005) Cumbres de Tafi (S/Dpto.), Cumbres de Mala Mala (S/Dpto.), Altiplanicie de Huaca-Huasi (S/Dpto.), Ciénaga Grande (Tafi del Valle); Capllonch (2007b) Cumbres del Aconquija y Calchaquíes Km 76 hacia El Infiernillo (Tafi del Valle); Moschione (2007) Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta), Río Los Sosa (Monteros/ Tafi del Valle), Parque Provincial Cumbres Calchaquíes (Tafi del Valle/ Trancas), Cuesta del Clavillo (Chicligasta), El Infiernillo (Tafi del

Valle), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Reserva Natural La Angostura (Tafí del Valle), Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva Natural Quebrada del Portugués (Tafí del Valle/ Monteros); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Infiernillo (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) La Ciénaga (Tafí Viejo), El Infiernillo (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2012) Rancho Solo, El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Cumbres Calchaquíes y del Aconquija, Sierras de Quilmes, El Infiernillo, Lara (Tafí del Valle), La Ciénaga, Chasquivil (Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de los Alisos (Chicligasta); Capllonch *et al.* (2015) Rancho del Hombre Solo (Tafí del Valle); Soria (2015) El Infiernillo (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1410) 1M, Las Cuchillas, 1907; (1411) 1M, Tafí del Valle, 1905; (1412) 1M, La Lagunita, 1903; (9157 y 9158) 1M y 1H, Tafí del Valle, 1955; (15074, 15076 y 15075) 2M y 1H, El Infiernillo, 1987.

- en pedestal: (287) 1M-1H, Las Pavas, 1910.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: Especie endémica. En Narosky e Yzurieta (2010) como *Compsospiza baeri*, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: VU; MAyDS y AA: AM.

Pospizopsis hypochondria

MONTERITA PECHO GRIS / RUFIOUS-SIDED WARBLING FINCH

- HÁBITAT: Matorrales y pastizales de altura, en prepuna, estepas altoandinas y arbustales.

- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Hasta 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca llegando hasta Neuquén y en Córdoba y San Luis.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Capllonch y Moyano Wagner (2010) El Molle (Tafí del Valle); Capllonch *et al.* (2011) El Molle (Tafí del Valle); Alderete y Capllonch (2012) El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) Ampimpa, El Molle, Dique Los Zazos, El Remate, Tafí del Valle, Sierra de Quilmes, El Pichao, Quilmes y Cumbres Calchaquíes (Tafí del Valle), Cumbres del Aconquija (S/Dpto.); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (2148 y 2150) 1M y 1H, Ñorco, 1904; (2149) 1M, Anfama, 1906; (10763 y 10764) 1H y 1M, San Pedro de Colalao, Alto La Totorá, 1956; (11140, 11141) 2M, Amaicha del Valle, 1958.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Poospiza hypochondria*, incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Thlypopsis sordida

TANGARÁ GRIS / ORANGE-HEADED TANAGER / SAÍ-CANÁRIO

- HÁBITAT: Selvas, selvas en galería y bosques.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, exceptuando la zona montañosa del oeste hasta el este de Catamarca, norte de Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Corrientes, este de Santa Fe, oeste de Entre Ríos, norte de Buenos Aires.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) San Pedro de Colalao, Vipos, Trancas (Trancas), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), El Sunchal (Burruyacú); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Mamaní *et al.* (2017) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2s/nº) 1H y 1?, Dpto. Tafí del Valle, entre 2400 y 2500 m snm, 1955; (738) 1M, Caspinchango, 1946; (1423 y 1425) 1H y 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1900; (1424) 1M, Tafí Viejo, 1910; (1452) 1M, Cerros de Tafí, 1900; (3482) 1M, Cerros de Tafí, 1947; (4535) 1M, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1947; (7870) 1M, sin localidad, 1929; (8856) 1H, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (12360) 1M, San Pedro de Colalao, Agua Rosada, 1962; (12587) 1M, Quebrada los Matos, 1962.
 - en pedestal: (502) 1M, Concepción, 1915.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Thlypopsis ruficeps

TANGARÁ ALISERO / RUST AND YELLOW TANAGER

- HÁBITAT: Selvas y bosques montanos en el noroeste.
- DISTRIBUCIÓN: Entre 1800 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y norte de La Rioja.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Antelo y Brandán (2000) San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) San Pablo (Lules); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Que-

ñoas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) La Angostura, Quebrada del Portugués (Tafí del Valle), Chasquivil (Tafí Viejo), Parque Nacional Campo de los Alisos, La Banderita (Chicligasta), Sierra de Medina (Burrucacú), Sierra de San Javier, Horco Molle (Yerba Buena); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo), Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (1405) 1H, Cumbre Hirajo de La Hoyada, 1902; (9162, 9164 y 9163 y 9165, 9166) 2M y 1? y 2H Dpto. Tafí del Valle, entre 2300 y 2500 m snm, 1955; (9698) 1?, Dpto. Tafí del Valle, 2300 m snm, 1956; (9699, 9701) 2H, Dpto. Tafí del Valle, sin localidad, 1956; (17377) 1?, Cuesta de Chasquivil, 2004.

- en pedestal: (274) 1M-1H, Las Pavas, 1911.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Microspingus erythrophrys

MONTERITA CEJA ROJIZA / RUSTY-BROWED WARBLING FINCH

- HÁBITAT: Yungas.

- DISTRIBUCIÓN: Entre 1000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burrucacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) Yerba Buena (Yerba Buena); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado Valle de la Sala (Tafí Viejo); Alderete y Capllonch (2012) Horco Molle, Ciudad Universitaria (Yerba Buena), El Indio (Montero), Taficillo (Tafí Viejo), Chulcas, Las Tipas (Trancas); El Sunchal (Burrucacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Nacional Campo de Los Alisos, La Banderita (Chicligasta), El Taficillo, Chasquivil, Anfama (Tafí Viejo), Lara (Tafí del Valle), Piedra Tendida, El Sunchal, Sierra de Medina (Burrucacú),

El Cadillal, San Pedro de Colalao (Trancas), Horco Molle (Yerba Buena), Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida Monteros); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta) y Finca La Higuierilla (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfa-ma (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (963) 1M, San Pedro de Colalao, La Laguna, 1946; (998) 1M, Río Salí, sin localidad, 1946; (1082) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2161) 1M, Tafí Viejo, 1902; (2163 y 2166) 1H y 1M, Villa Nougués, 1901; (2164) 1H, Las Tipas, Aguadas, 1889; (2167, 2168) 2H, Taficillo, 1929; (6636) 1?, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1950; (8857) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (10495, 10501 y 10502) 2H y 1 M, Cerro del Campo, 1957; (10575) 1M, Rearte Norte, 1957; (10727) 1M, Quebrada Las Cuevas, 1957; (12267) 1H, San Miguel de Tucumán, 1962; (12582) 1H, Quebrada Los Matos, 1962; (14372) 1M, Cumbres del Aconquiya, 1968.

– en pedestal: (291) 1H, Concepción, 1910.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Poospiza erythrophrys* en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Microspingus torquatus

MONTERITA DE COLLAR / RINGED WARBLING FINCH

● HÁBITAT: Sabanas, estepas arbustivas, arbustales, matorrales y áreas rurales en invierno.

● DISTRIBUCIÓN: En el norte y centro del país exceptuando la cordillera, desde Tucumán por el centro hasta el sur de Mendoza y el norte de Río Negro y por Chaco, Santa Fe y Córdoba hasta oeste de Buenos Aires.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Agua Salada, Arroyo

Mista (Leales), Río Chico (Río Chico), El Bañado (Tafí del Valle); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Vipos, Ticucho (Trancas), Leales (Leales), Burruyacú (Burruyacú), Valle de Yocavil (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (849) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (2125) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1916; (2127 y 2134) 1H y 1M, sin localidad, 1900; (4598) 1M, Los Herrera, 5 km al SO de la Estación El Guardamonte, 1947; (10755) 1H, El Simbolar, 1956; (11283) 1M, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 1959.

– en pedestal: (298) 1M-1H, Toro Muerto, 1910.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Poospiza torquata* en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Microspingus melanoleucus

MONTERITA CABEZA NEGRA / BLACK-CAPPED WARBLING FINCH / CAPACETINHO

● HÁBITAT: Bosques, arbustales, sabanas y bordes de selvas.

● DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta San Juan, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones (Trancas); Capllonch y Araoz (2007) Yerba Buena (Yerba Buena); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Alderete y Capllonch (2012) Parque Sierra de San Javier, Río Anta Yacu, Horco Molle (Yerba Buena), Agua Salada, Los Puestos, Arroyo Mista (Leales), El Sunchal, El Chañar (Burruyacú), Ticucho (Trancas), San Ignacio (La Cocha), Colombres (Cruz Alta), Dique Escaba (J.B. Alberdi); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Leales (Leales), Vipos, Choromoro (Trancas), Río Urueña (Burruyacú), La Cocha (La Cocha), Amaicha del Valle (Tafí del Valle),

Alderete, Banda del Río Salí (Cruz Alta), Horco Molle, Yerba Buena (Yerba Buena); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (605) 1M, Tapia, 1946; (808) 1M, El Guardamonte, 1946; (1167, 1418 y 1373) 2H y 1M, Las Cañitas, 1946; (1489) 1?, sin localidad, 1928; (1490) 1M, Santa Bárbara, 1928; (2155) 1M, sin localidad, 1899; (2156) 1H, Tafí Viejo, 1915; (2158) 1H, sin localidad, 1907; (2256, 3132, 3155 y 2302, 3145) 3M y 2H, El Saladillo, 1946; (4806) 1M, Acherál, 1947; (9151) 1M, Las Tipas, 1954; (9513 y 9516) 1M y 1H, El Guardamonte, 1955; (9672, 9673, 9676 y 9674) 3M y 1H, Chilca, 1955; (9706) 1H, Dpto. Tafí Viejo, Cerro San Javier, 1955; (10607) 1H, Rearte, 1957; (10932) 1M, Dpto. Trancas, Monte Bello, 1957; (14564) 1M, Dique El Cadillal, 1976; (15264) 1M, Horco Molle, 1990; (17221 y 17222) 1H y 1?, El Vizcacheral, 1993.

– en pedestal: (275) 1M-1H, Concepción, 1909.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

● OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Poospiza melanoleuca* en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Asemospiza obscura

ESPIGUERO PARDO / DULL-COLORED GRASSQUIT

● HÁBITAT: Sabanas, bosques chaqueños y claros en bordes de selvas.

● DISTRIBUCIÓN: Desde el norte y centro del país, excepto la Mesopotamia, hasta Tucumán, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Un registro aislado en Córdoba.

● LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Río Anta Yacu en Parque Biológico Sierra San Javier, Horco Molle (Yerba Buena), El Sunchal (Burruyacú), (Cruz Alta), Ticucho (Trancas), Leales (Leales); Capllonch *et al.* (2015) Río Anta Yacu, Senda del Pluviómetro en Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules).

● MATERIAL ESTUDIADO:

– en piel: (2280) 1M, sin localidad, 450 m snm, 1900.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Tiaris obscurus* en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Lophospingus pusillus

SOLDADITO COMÚN / BLACK-CRESTED FINCH

- HÁBITAT: Bosques y sabanas de tipo chaqueño.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país, excepto la zona montañosa del oeste y la Mesopotamia, hasta La Rioja, San Juan, San Luis, norte de Córdoba y Santa Fe.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Brandán (2005) Cañada Honda (Burruyacú); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Monteagudo (Simoca), Leales (Leales), Vipos, Tapia, Ticucho, Trancas (Trancas), 7 de Abril, La Ramada (Burruyacú); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (616) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1662) 1M, Yerba Buena, 1946; (2032) 1M, El Saladillo, 1946; (2043 y 2048) 1M y 1H, Tapia, 1946; (2290) 1H, Tapia, 1902; (2291, 2293) 2M, sin localidad, 1900; (2292) 1M, Tafí Viejo, 1903; (9149) 1H, Zárate, 1954; (10759 y 10762) 1H y 1M, El Simbolar, 1956; (12363) 1M, San Pedro de Colalao, Saladillo, 1962.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Diuca diuca

DIUCA COMÚN / DIUCA FINCH / DIUCA

- HÁBITAT: Prepuna, áreas rurales y estepas altoandinas y patagónicas con matorrales.
- DISTRIBUCIÓN: En una franja por el oeste del país desde Jujuy, por el centro de Córdoba, hasta La Pampa y sur de Buenos Aires, desde allí se extiende hacia el este hasta el norte de Santa Cruz. La población austral migra en otoño/ invierno hacia el norte hasta Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Capllonch (2007b) Valle de Tafí, La Ciénaga (Tafí del Valle); Ortiz *et al.* (2013a) (Cruz Alta), Monteagudo (Simoca), Vipos (Trancas), Ampimpa, Amaicha del Valle, El Pichao (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (2308) 1M, Vipos, Ñorco, 1906; (2309) 1M, sin localidad, 1900; (5462) 1H, Tafí del Valle, 1948; (11231) 1?, Amaicha del Valle, 1958.

- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Gubernatrix cristata

CARDENAL AMARILLO / YELLOW CARDINAL / CARDEAL-AMARELO

- HÁBITAT: Sabanas, estepas arbustivas, isletas de bosque y espinal.
- DISTRIBUCIÓN: Desde Formosa y Corrientes por Santa Fe, Córdoba, sur de Santiago del Estero, este de San Juan, Mendoza y La Pampa hasta el este de Neuquén, norte de Río Negro y sur de Buenos Aires. Posiblemente en Tucumán, Salta y Chaco.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Vides Almonacid (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena).
- MATERIAL ESTUDIADO: sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. Especie en disminución. CITES II; UICN: EN; MAyDS y AA: EN.

Paroaria coronata

CARDENAL COMÚN / RED-CRESTED CARDINAL / CARDEAL

- HÁBITAT: Bosques, sabanas y espinal.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, excepto la zona central.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Antelo y Alabarce (2002) El Vizcacheral (Leales); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) La Quebradita, Barrio Costas II (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Arroyo Mista (Leales), Chilcas, 7 de Abril (Burruyacú), Ticucho (Trancas), Monteagudo, Simoca (Simoca), Amaicha del Valle (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (201) 1?, La Ramada, 1946; (290) 1?, Tapia, 1946; (336) 1H, Mariño, 1946; (1493) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1915; (1614) 1H, Nueva España, 1946; (1640 y 2369, 3133) 1H y 2M, El Saladillo, 1946; (2019) 1H, Dpto. Leales, sin localidad, 1946; (2317, 2318) 2H, sin localidad, 1900; (2744, 2752, 2765 y 3261) 3M y 1H, S/ Dpto., Río Colorado, 1946; (5365 y 5366) 1M y 1H, El Guardamonte, 1948; (8050) 1M, Dpto. Leales, sin localidad, 1952; (9841) 1M, La Angostura, 1956; (10780, 10781) 2H, San Pedro de Colalao, 1957; (17218) 1H, El Vizcacheral, 1993.
 - en pedestal: (286) 1M y 1H, Toro Muerto, 1911.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. CITES II; UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Paroaria capitata

CARDENILLA / YELLOW-BILLED CARDINAL / CAVALARIA

- HÁBITAT: Cerca del agua en bordes de selvas, selvas en galería, bosques, sabanas y bañados arbustados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país por el este de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero hasta el sur de Córdoba, sur de Santa Fe y por noreste y la zona costera de Buenos Aires hasta Río Negro.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Ortiz *et al.* (2013a) La Cocha (La Cocha), Los Gómez, Leales (Leales), Monteagudo (Simoca), Ticucho, Vipos (Trancas).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (1496, 1503) 1M, sin localidad, 1928; (2316) 1M, Dpto. Leales, Río Salí, 1920.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) incluida en la Familia Emberizidae. CITES II; UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Pipraeidea melanonota

SAÍRA DE ANTIFAZ / FAWN-BREASTED TANAGER / SAÍRA-VIÚVA

- HÁBITAT: Estrato medio y alto en Yungas, selvas, bosques densos y capueras.
- DISTRIBUCIÓN: Disyunta. Entre 1000 y 2500 m snm en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, otra área en Misiones y norte de Corrientes y la última en el sudeste de Entre Ríos y la costa de Buenos Aires.

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Capllonch (2008) Sierra del Cajón, El Sunchal (Burruyacú), Pinar de Velárdez, Senda del Pluviómetro, Senda de La Horqueta, Río Piedras y Río Anta Yacu en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena), El Indio, Playa Larga, Río Los Sosa (Monteros), La Banderita (Chicligasta), Monteagudo (Simoca); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Ortiz *et al.* (2013a) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros), Horco Molle (Yerba Buena), El Sunchal (Burruyacú), Tafí Viejo (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).
- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (150, 551) 2M, Tafí Viejo, 1946; (637) 1H, Los Nogales, 1946; (835) 1M, Taficillo, 1946; (879 y 1081, 1931) 1M y 2H, San Pedro de Colalao, 1946; (1340) 1M, Cerros de Tafí, 1900; (1341) 1H, Cerro de Tucumán, 1900; (1408 y 1974 y 7096) 1H y 1M y 1?, Yerba Buena, 1946; (4529) 1M, S/Dpto., El Cadillal, 1947 (7108) 1H, Leales, 1946; (7131) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (8008) 1H, Manchalá, 1942; (8835) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1954; (9357) 1H, San Pedro de Colalao, 1927; (11253) 1H, San Pedro de Colalao, Agua Rosada, 1959; (12424) 1M, Las Mesadas, 1963.
 - en pedestal: (313) 1M, Concepción, 1909; (313) 1?, La Calera, 1910.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Rauenia bonariensis

NARANJERO/ BLUE-AND-YELLOW TANAGER/ SANHAÇU-PAPA-LARANJA

- HÁBITAT: Selvas, selvas en galería, bosques, sabanas, áreas rurales y poblados, también en espinal.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta noreste de Neuquén, norte de Río Negro y Chubut.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.);

Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burrucacú); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Rumboll *et al.* (2005) Horco Molle (Yerba Buena); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Capllonch (2007b) Valle de Tafí, Cerro Muñoz (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Ortiz y Capllonch (2008) Sierra del Cajón, El Sunchal (Burrucacú), Agua Salada (Leales); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Capllonch y Moyano Wagner (2010) La Ciénaga (Tafí Viejo), El Molle (Tafí del Valle); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Capllonch *et al.* (2011) El Molle, El Infiernillo (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burrucacú); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burrucacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

● MATERIAL ESTUDIADO:

- en piel: (123) 1H, S/Dpto., El Cadillal, 1946; (226) 1M, Los Gómez, 1946; (851) 1M, San Pedro de Colalao, 1946; (1369) 1M, sin localidad, 1902; (1370) 1M, sin localidad, 1900; (1371) 1M, sin localidad, 1927; (1372) 1M, sin localidad, 1929; (1373) 1M, sin localidad, 1928; (1377) 1M, Dpto. Leales, 1919; (1378) 1M, sin localidad, 1901; (1657, 2254, 2334, 2415, 2434, 2510 y 2024, 2111, 2331, 2424 y 2336) 6M y 4H y 1?, El Saladillo, 1946; (1960, 1964) 2M, Tapia, 1946; (2532) 1M, Malvinas, 6 km al SE de San Pablo, 1946; (4781) 1M, sin localidad, 1947; (6303, 6304 y 6326, 6358) 2M y 2H, San Pedro de Colalao, 1950; (9140, 9181 y 9189) 2M y 1H, Rearte Norte, 1954; (9179) 1M, Las Mesadas, 1954; (9182) 1M, Las Tipas, 1954; (9184, 9185) 2M, Las Vertientes, 1954; (9835) 1M, Agua Rosada, 1956; (10384) 1H, Dique Tacanas, 1956; (11233) 1M, Amaicha del Valle, 1958; (12433) 1H, Villa Luján, 1963; (14827) 1H, El Carmen, 13 km al O de Fuerte Quemado, 1985; (17443 y 17450, 17453) 1M y 2H, La Quebradita, 2008.
- en pedestal: (323) 1M-1H, Concepción, 1909; (323) 1?, Concepción, 1910.
- esqueleto: (17144) 1H, Santa Cruz, 10 Km al S de Tafí del Valle, 1998.
- en alcohol: (17618) 1?, Parque Norte, San Miguel de Tucumán, 1992.

● LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).

- OBSERVACIONES: En Narosky e Yzurieta (2010) como *Thraupis bonariensis*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Thraupis sayaca

CELESTINO COMÚN / SAYACA TANAGER

- HÁBITAT: Claros de selvas, bosques, sabanas, arboledas y poblados.
- DISTRIBUCIÓN: Desde el norte del país exceptuando la cordillera, hasta el noreste de Neuquén y norte de Río Negro y noreste de Buenos Aires. En expansión hacia La Pampa.
- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Echevarria y Chani (1999) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Alabarce y Antelo (2000) El Vizcacheral (Leales); Antelo y Brandán (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Brandán y Antelo (2000) Yerba Buena (Yerba Buena), Tafí Viejo (Tafí Viejo), San Pablo (Lules); Echevarria y Chani (2000) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro *et al.* (2000) Las Tipas (Tafí Viejo); Rougés y Blake (2001) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2002) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Brandán (2005) Cañada Honda, Timbó Nuevo (Burruyacú), Los Gutiérrez (Cruz Alta); Capllonch (2005) Reserva Privada Las Queñoas (Tafí Viejo); Juri y Chani (2005) San Miguel de Tucumán (Capital), Yerba Buena (Yerba Buena); Lucero *et al.* (2005) San Miguel de Tucumán (Capital); Antelo y Brandán (2006) Yerba Buena (Yerba Buena); Antelo *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Brandán *et al.* (2006) Las Tipas (Tafí Viejo); Echevarria y Chani (2006) Embalse El Cadillal (S/Dpto.); Navarro y Marigliano (2006) Los Planchones, Tapia (Trancas); Capllonch (2007b) Valle de Tafí (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2007) San Miguel de Tucumán (Capital); Navarro *et al.* (2007) Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida (Monteros); Brandán y Antelo (2009) San Pablo (Lules); Presti y Echevarria (2009) Parque Percy Hill (Yerba Buena); Gómez (2010) Arroyo Tafí (Tafí Viejo); Soria *et al.* (2010) El Sunchal (Burruyacú), El Remate, Amaicha de Valle (Tafí del Valle); Echevarria *et al.* (2011) San Miguel de Tucumán (Capital); Ortiz y Ruiz (2011) Arroyo Mista (Leales); Ortiz *et al.* (2011) Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena); Moreno Ruiz Holgado (2012) Valle de la Sala (Tafí Viejo); Antelo *et al.* (2013) El Cadillal (Burruyacú); Ortiz y Aráoz (2013) Sierra de San Javier (S/Dpto.); Navarro y Antelo (2014) Los Guayacanes, Raco (Tafí Viejo); Fanjul y Echevarria (2015) Parque Biológico Sierra de San Javier (Yerba Buena), Parque Nacional Campo de Los Alisos (Chicligasta), Finca La Higuera (J. Bautista Alberdi); Echevarria y Fanjul (2016) Embalse Escaba (J. Bautista Alberdi); Antelo y Navarro (2017) Anfama (Tafí Viejo); Marigliano *et al.* (2017) El Cadillal (Burruyacú); Brandán Fernández *et al.* (2018) El Cadillal (Tafí Viejo); Ortiz *et al.* (2018) Reserva Privada San Pablo (Lules); Brandán Fernández y Marigliano (2019) Río Nio/Tajamar (Burruyacú); Fanjul *et al.* (2019) Quebrada del Portugués (Tafí del Valle).

- MATERIAL ESTUDIADO:
 - en piel: (102) 1M, Dpto. Famaillá, Río Colorado, 1946; (187) 1H, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 1946; (313) 1H, Alpachiri, 1946; (912) 1M, Dpto. Chicligasta, Monteagudo, 1946; (1021) 1M, Quebrada de Lules, 1946; (1103, 1655, 2335, 2379, 2390, 2411, 2433 y 2327, 2443, 2501, 17406) 7M y 4H, El Saladillo, 1946; (1104) 1M, La Reducción, 1946; (1149, 1318, 1341, 1358, 1407, 1949, 2027, 17403 y 2278) 8M y 1H, Yerba Buena, 1946; (1342) 1M, sin localidad, 1930; (1344) 1M, sin localidad, 1928; (1346 y 1348) 1H y 1M, Dpto. Yerba Buena, sin localidad, 1946; (1351) 1H, Dpto. Tafí Viejo, sin localidad, 1902; (1354) 1H, Dpto. Capital, Los Vázquez, 1898; (1355) 1M, sin localidad, 1898; (1359) 1M, sin localidad, 1946; (1389) 1M, Las Cañitas, 1946; (2069) 1H, Río Salí, 1946; (2503) 1H, El Saladillo, 1944; (5364) 1M, sin localidad, 1948; (6310, 6328 y 6314) 2M y 1H, San Pedro de Colalao, 1950; (8039) 1M, Dpto. Yerba Buena, Cerro San Javier, 1951; (9032) 1M, Las Tacanas, 1954; (9153) 1H, Las Vertientes, 1964; (9634) 1M, San Pedro de Colalao, 1955; (9638) 1M, Chilca, 1955; (10374) 1H, Dique Tacanas, 1956; (10582) 1M, Las Tipas, 1957; (11282) 1M, Quebrada Los Cainzos, 1949; (15101) 1H, Dpto. Capital, sin localidad, 1985; (17180) 1?, Residencia de Horco Molle, 1995; (17193) 1H, El Vizcacheral, 1993; (17384) 1?, Chasquivil, 2004; (17405) 1H, sin localidad, 1945.
 - en pedestal: (322) 1M-1?, Concepción, 1909.
 - en alcohol: (17634) 1?, San Miguel de Tucumán, Jardín Botánico de la F.M.L., 2011; (17673) 1?, Villa Batirua, 2018.
- LITERATURA: de la Peña (1999); Howard y Moore (2003); Brandán y Navarro (2009); Narosky e Yzurieta (2010); López-Lanús (2017); de la Peña (2019e); del Hoyo *et al.* (2019).
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

CONSIDERACIONES FINALES

El inventario ornitológico efectuado para la provincia de Tucumán determinó la presencia de un total de 261 especies de aves pertenecientes a 24 familias del Orden Passeriformes. Otras 8 especies deben ser confirmadas para la provincia (Apéndice 2).

Este trabajo aporta 22 nuevas especies a la Checklist de aves para la provincia de Tucumán de Brandán y Navarro (2009) y coloca tres especies de las allí citadas (*Tachuris rubigastrea*, *Neoxolmis rubetra* y *Saltator similis*) como de presencia dudosa debido a que no tienen material colectado ni fueron mencionadas en los trabajos de investigación de los últimos 20 años. *Pseudoleistes virescens* citada como «Especie de presencia incierta» por Brandán y Navarro (2009) y como «Especie extinta, en duda o con registros escasos o históricos» por Ortiz *et al.* (2013a) no fue incluida en el inventario, por no tener avistajes, material colectado y considerarse también por otros autores de presencia accidental en la provincia (Lucero, 1983; Ortiz *et al.* 2013a).

Con respecto al trabajo de Ortiz *et al.* (2013a) sobre los Passeriformes de Tucumán el presente inventario aporta 8 nuevas especies y aclara la situación de otras que se consideraban «extintas, en duda o con registros escasos o históricos».



Lámina 1. Especies endémicas regionales que integran la avifauna tucumana. 1.1) *Scytalopus superciliosus* (Churrín ceja blanca) – Foto: Pablo Eguía. 1.2) *Teledromas fuscus* (Gallito arena). Foto: Ignacio Hernández. 1.3) *Upucerthia validirostris* (Bandurrita andina). Foto: Jorge La Grotteria. 1.4) *Cincloides comechingonus* (Remolinera serrana). Foto: Ramón Moller Jensen. 1.5) *Pseudasthenes steinbachi* (Canastero castaño). Foto: Ignacio Hernández. 1.6) *Pseudoseisura gutturalis* (Cacholote pardo). Foto: Ignacio Hernández. 1.7) *Atlapetes citrinellus* (Cerquero amarillo). Foto: Ramón Moller Jensen. 1.8) *Porphyrospiza carbonaria* (Yal carbonero). Foto: Ramón Moller Jensen. 1.9) *Poospiza ornata* (Monterita canela). Foto: Ramón Moller Jensen. 1.10) *Poospiza baeri* (Monterita serrana). Foto: Pablo Eguía.

Entre las agregadas se encuentran 3 especies observadas con posterioridad a la publicación del trabajo: *Knipolegus hudsoni* (Capllonch *et al.*, 2014), *Mimus dorsalis* (Ortiz *et al.*, 2017) y *Myiothlypis bivittata* (Ortiz *et al.*, 2013a; Mamaní *et al.*, 2017). Estos autores citan a *Cinclodes fuscus* e incluyen en la misma como subespecies a *C. f. fuscus*, *C. f. tucumanus* (= *C. albiventris*) y *C. f. comechingonus*, reconocidas taxonómicamente por el SACC con categoría de especies. Lo mismo sucede con *Serpophaga subcristata munda* tratada como una especie y reconocida por el SACC como *S. subcristata* y *S. munda*.

Thamnophilus schistaceus citada como «Especie extinta, en duda o con registros escasos o históricos» por Ortiz *et al.* (2013a) no fue incluida en el inventario por no tener avistajes, material colectado en la provincia y además por que Chebez (2009) considera que el material depositado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia tiene una confusión de procedencia.

Por lo antes mencionado este trabajo aporta un inventario con mayor riqueza de especies para la provincia que las obras precedentes (Brandán y Navarro (2009) y Ortiz *et al.* 2013a). La avifauna tucumana tiene 10 especies endémicas regionales (Lámina 1), de las cuales 7 son residentes en la provincia (*Teledromas fuscus*, *Scytalopus superciliaris*, *Pseudasthenes steinbachi*, *Pseudoseisura gutturalis*, *Upucerthia validirostris*, *Atlapetes citrinellus*, *Poospiza baeri*) y tres llegan en época invernal (*Rhopospina carbonaria*, *Cinclodes comechingonus*, *Poospiza ornata*). En la COLFML están todas representadas.

De la totalidad de especies registradas en esta lista, 65 realizan algún tipo de desplazamiento, incluyendo migraciones latitudinales, altitudinales y movimientos parciales de algunas poblaciones. Dos especies que se reproducen fuera del territorio argentino e invernan en la provincia, cuentan con material depositado en la Colección, una perteneciente a la familia Icteridae (*Dolichonyx oryzivorus*) y la otra a la familia Turdidae (*Catharus ustulatus*). También hay pieles de dos especies exóticas depositadas en la COLFML, una de ellas es *Passer domesticus*, registrada en el país por primera vez en 1873 (Navas, 2002a), la otra es *Sturnus vulgaris*, recientemente detectada en la provincia pero que ya está reconocida como invasora en el país (Rebollo Ifran, 2009).

Del total de especies de aves presentes en la provincia, 17 se encuentran incluidas en alguna categoría de conservación de CITES, UICN y/o MADyS y AA, (Lámina 2), lo que destaca la importancia de mantener y aumentar las áreas naturales protegidas, que actualmente suman 170.000 ha bajo distintas figuras de protección legal (Malizia, 2014), en las que se preserva mucha de la diversidad ornitológica de Tucumán.

La revisión del material depositado en COLFML, incluye ejemplares colectados desde el año 1846 hasta 2018, para un total de 235 especies y 24 familias (Fig. 2). El material en piel totaliza 3226 ejemplares, el preparado en pedestal 273, 66 en alcohol y 3 esqueletos. La Colección es depositaria de 4 ejemplares Tipos: *Pseudocolopteryx dinelliana*, *Asthenes pyrrholeuca*, *Lepidocolaptes angustirostris* y *Pseudoseisura gutturalis* (Lámina 3).

Más de la mitad de las familias (58%) están representadas con la totalidad de especies mencionadas para Tucumán, las que tiene mayor número de ejemplares (su-




Lámina 2 (I). Especies que integran la fauna tucumana y se encuentran incluidas en alguna categoría de conservación. 2.1) *Cinclodes comechingonus* (Remolinera serrana). Foto: Ramón Moller Jensen. 2.2) *Asthenes maculicauda* (Espartillero estriado). Foto: Pablo Eguía. 2.3) *Asthenes heterura* (Canastero andino). Foto: Jorge La Grotteria. 2.4) *Pseudocolopteryx dinelliana* (Doradito pardo). Foto: Pablo Eguía. 2.5) *Knipolegus hudsonii* (Viudita chica), a) macho. Foto: Jorge La Grotteria y b) hembra. Foto: Andrés Terán 2.6) *Agriornis albicauda* (Gaucho andino). Foto: Jorge La Grotteria. 2.7) *Cinclus schulzi* (Mirlo de agua). Foto: Ramón Moller Jensen. 2.8) *Atlapetes citrinellus* (Cerquero amarillo). Foto: Ramón Moller Jensen.




Lámina 2 (II). Especies que integran la fauna tucumana y se encuentran incluidas en alguna categoría de conservación. 2.9) *Dolichonyx oryziborus* a) macho y b) hembra. Fotos: Ramón Moller Jensen. 2.10) *Sicalis citrina* (Jilguero cola blanca). Foto: Pablo Eguía. 2.11) *Idiopsar brachiurus* (Yal grande). Foto: Pablo Eguía. 2.12) *Sporophila ruficollis* (Capuchino garganta café). Foto: Ramón Moller Jensen. 2.13) *Sporophila hypoxantha* (Capuchino canela). Foto: Ramón Moller Jensen. 2.14) *Poospiza baeri* (Monterita serrana). Foto: Pablo Eguía. 2.15) *Gubernatrix cristata* (Cardenal amarillo). Foto: Ramón Moller Jensen. 2.16) *Paroaria coronata* (Cardenal común). Foto: Ramón Moller Jensen. 2.17) *Paroaria capitata* (Cardenilla). Foto: Ramón Moller Jensen.



Lámina 3. Ejemplares Tipo de la avifauna tucumana depositados en la COLFML. **3.1)** *Lepidocolaptes angustirostris* (Chincherito chico). Foto: Ramón Moller Jensen. **3.2)** *Asthenes pyrrholeuca* (Canastero coludo). Foto: Patricia Gabriela Mansilla Iglesias. **3.3)** *Pseudoseisura gutturalis* (Cacholote pardo). Foto: Ignacio Hernández. **3.4)** *Pseudocolopteryx dinelliana* (Doradito pardo). Foto: Pablo Eguia.

mados piel, pedestal, alcohol y esqueletos) son: Tyrannidae (962), Thraupidae (725) y Furnariidae (635) y las demás tienen menos de 200 individuos. No se encuentran en la Colección material de 27 especies pertenecientes a las siguientes familias: 1 de Thamnophilidae, 5 de Furnariidae, 5 de Tyrannidae, 3 de Hirundinidae, 2 de Turdidae, 2 de Mimidae, 1 de Fringillidae, 1 de Sturnidae, 1 de Parulidae y 5 de Thraupidae. Por lo tanto, la colección estudiada tiene representada un 96% de las familias con un 90% de las especies de aves passeriformes tucumanas. Lo que la posiciona como una valiosa muestra de referencia por la representatividad que posee de la avifauna local tal como fuera señalado por Brandán y Antelo (2001).

Familia	Total de sp.	En piel	En pedestal	En alcohol	Esqueletos	Ejemplares
Thamnophilidae	4	87	5			92
Melanopareiidae	1	8	2			10
Rhinocryptidae	3	20	3			23
Furnariidae	43	583	46	6		635
Tyrannidae	76	871	87	3	1	962
Cotingidae	1	42	1			43
Tityridae	4	36	2			38
Vireonidae	2	47	2	1		50
Corvidae	1	38	1			39
Hirundinidae	9	65	13			78
Troglodytidae	3	28	4	3		35
Poliophtidae	1	33				33
Cinclidae	1	9	1			10
Turdidae	5	137	8	14		159
Mimidae	2	18	3			21
Sturnidae	0					0
Passeridae	1	7		1		8
Motacillidae	5	34	12			46
Fringillidae	4	60	6			66
Passerellidae	6	106	5	24		135
Icteridae	10	173	13			186
Parulidae	4	64	2	7		73
Cardinalidae	3	100	1			101
Thraupidae	46	660	56	7	2	725
	24	235	3226	273	66	3568

Fig. 2. Avifauna de la provincia de Tucumán representada por familia en la Colección de la Fundación Miguel Lillo (COLFML).

La revisión de 96 trabajos de investigación efectuados en el ámbito provincial demostró que en las dos últimas décadas se registraron 257 especies, es decir un 98,5% de las aves que aquí se citan para la provincia.

A forma de recomendación, consideramos necesario incrementar los muestreos de aves a fin de registrar especies aún no detectadas como: *Inezia inornata*, *Muscisaxicola maclovianus*, *Muscisaxicola frontalis* (Tyrannidae) y *Dolichonyx oryzivorus* (Icteridae). Esto confirmaría la presencia de algunas especies que fueron avistadas por última vez hace 10 años y de las que no se tienen datos más actualizados, por lo que podrían actualmente no integrar la avifauna de la provincia o haber sufrido reducciones poblacionales. Estas especies son: *Ochetorhynchus ruficaudus*, *Schoeniophylax phryganophilus*, *Pseudocolopteryx sclateri*, *Myiodynastes maculatus*, *Tyrannus tyrannus*, *Progne subis*, *P. chalybea*, *Turdus serranus*, *Conirostrum speciosum*, *Phrygilus atriceps*, *Sporophila leucoptera* y *Gubernatrix cristata*. Sumadas a ellas hay 19 especies que fueron documentadas en una única publicación y no avistadas por otros autores.

Finalmente como se puede observar en el mapa (Fig. 1) hay departamentos administrativos que no fueron muestreados o están submuestreados como los del sur tucumano: Graneros, La Cocha y J. B. Alberdi, así como áreas de alta montaña del oeste, llanura chaqueña del este, entre otros. Este mapa destaca los vacíos de información y las áreas a donde se pueden destinar recursos para su evaluación.

El crecimiento de la población humana y la transformación de los hábitats provocan pérdida de biodiversidad. Por esta razón se hace cada vez más necesario incrementar los esfuerzos para realizar inventarios faunísticos que constituyen una

valiosa herramienta para el conocimiento y valoración de lo que está presente en un espacio geográfico. Siendo además de gran importancia porque sirven de base para la adopción de medidas de conservación y manejo.

AGRADECIMIENTOS

Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento al Lic. Pablo Pereyra por la edición y mejora de las imágenes que acompañan este trabajo, a los fotógrafos Ramón Moller Jensen, Pablo Eguía, Ignacio Hernández, Jorge La Grotteria, Andrés Terán y Patricia Gabriela Mansilla Iglesias que tan amablemente nos facilitaron sus tesoros. A la Fundación Miguel Lillo por la financiación del proyecto y a los revisores anónimos por sus sugerencias y correcciones que mejoraron sustancialmente el manuscrito.

LITERATURA CITADA

- Alabarce, E. A., Antelo, C. M. (2000). Estudio preliminar de la avifauna residente en primavera en un sector de Bosque Chaqueño (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 45 (2): 181-188.
- Alderete, C., Capllonch, P. (2010). Pesos de Aves Subosines de Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda Serie, 58, 1-5. Fundación Félix de Azara.
- Alderete, C., Capllonch, P. (2012). Pesos de Aves de las familias Emberizidae y Cardinalidae en Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda Serie, 94, 1-10.
- Álvarez, E., Capllonch, P., Cerezo, A., Ortiz, D., Zelaya, P. (2007). El Zorzalito Overo (*Catharus dryas*) en Tucumán. *Nuestras Aves* 52: 30-31.
- Antelo, C. M., Alabarce, E. A. (2002). Alimentación y morfometría de aves insectívoras de un sector de Bosque Chaqueño (Tucumán- Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 46 (1): 123-129.
- Antelo, C. M., Brandán, Z. J. (2000). Presencia de migrantes altitudinales en tres localidades del pedemonte de la Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 45 (2): 241-246.
- Antelo, C. M., Brandán, Z. J. (2006). Presencia estacional de la avifauna de Yungas en un ambiente urbanizado del departamento Yerba Buena (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 61-70.
- Antelo, C. M., Brandán Fernández, Z. J. (2013). Las aves no Passeriformes de Tucumán, Argentina. *Miscelánea* 132: 129pp.
- Antelo, C. M., Navarro, C. I. (2017). Avifauna de un camino rural de montaña en las Yungas de Tucumán (Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 61 (1): 15-26.
- Antelo, C. M., Brandán, Z. J., Navarro, C. I., Marigliano, N. L. (2006). Avifauna de un sector de bosque en Las Tipas (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 41-46.
- Antelo, C. M., Marigliano, N. L., Brandán, Z. J., Navarro, C. I. (2013). Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Tucumán, Argentina): II. Ensamblajes presentes en estación seca y su relación con elementos estructurales del hábitat. *Acta Zoológica Lilloana* 57 (1): 42-56.

- Aráoz, R., Ortiz, D. (2008). Primer registro documentado de la Golondrina Purpúrea *Progne subis subis* (Linné, 1766) (Aves: Hirundinidae) para la Argentina. *Xolmis Revista de Ornitología* 3: 47-48.
- Aráoz, R., Ortiz, D., Barbosa, E. (2017). Nido, huevos y juveniles del Arañero Corona Rojiza (*Myioborus brunniceps*): diferencias con descripciones previas. *El Hornero* 32 (2): 277-280.
- Areta, J. I., Pearman, M. (2013). Species limits and clinal variation in a widespread high Andean furnariid: the Buff-breasted Earthcreeper (*Upucerthia validirostris*). *The Condor* 115 (1): 131-142.
- Bencke, G. A., Dias, R. A., Bugoni, L., Agne, C. E., Fontana, C. S., Mauricio, G. N., Machado, D. B. (2010). Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Serie Zoológica*. 100 (4): 519-556.
- Brandán, Z. J. (2005). Avifauna de un sector del bosque de transición tucumano, en diferentes condiciones de uso. *Acta Zoológica Lilloana* 49 (1-2): 3-8.
- Brandán, Z. J., Antelo, C. M. (2000). Comparación de la avifauna invernal en tres localidades del Bosque de Transición (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 45 (2): 257-262.
- Brandán, Z. J., Antelo, C. M. (2001). Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo. Catálogo de especies de Tucumán. *Miscelánea* 116: 55pp.
- Brandán, Z. J., Antelo, C. M. (2009). Composición y variaciones estacionales de la avifauna en un ambiente antropizado (San Pablo, Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 53 (1-2): 98-107.
- Brandán, Z. J., Navarro, C. I. (2009). Lista actualizada de las aves de la provincia de Tucumán. Bird checklist. Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina, 66pp.
- Brandán, Z. J., Marigliano, N. L., Navarro, C. I., Antelo, C. M. (2006). Estructura y composición específica de la comunidad de aves en un área suburbana de la provincia de Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 47-54.
- Brandán Fernández, Z. J., Marigliano, N. L. (2019). Lista comentada de las aves del Río Nío/Tajamar, Departamento Burruyacu, Tucumán, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda serie, 275: 1-13.
- Brandán Fernández, Z. J., Navarro, C. I., Marigliano, N. L., Antelo, C. M. (2018). Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Río Salí, Tucumán, Argentina): Gremios de alimentación. *Nótulas Faunísticas*, Segunda serie, 250: 1-8.
- Capllonch, P. (2005). Caracterización y diagnóstico del estado actual del ambiente físico y biológico de la Reserva Privada Las Queñuas. 100pp.
- Capllonch, P. (2007a). Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina: parte 1. *Acta Zoológica Lilloana* 51 (2): 151-160.
- Capllonch, P. (2007b). Aves de Tafí del Valle/Birds of Tafí del Valle. MegaPrint editores, Tucumán, Argentina. 38 pp.
- Capllonch, P. (2015). Correlación entre la muda y la migración en el Brasita de Fuego (*Coryphospingus cucullatus* Fargoi). *Historia Natural*, Tercera serie, 5 (2): 51-58.
- Capllonch, P., Aráoz, R. (2007). Aves de los jardines de Yerba Buena (Tucumán). Megaprint editores, Tucumán, Argentina. 22 pp.

- Capllonch, P., Lobo, R. (2005). Contribución al conocimiento de la migración de tres especies de *Elaenia* de Argentina. *Ornitología Neotropical* 16: 145-161.
- Capllonch, P., Moyano Wagner, E. (2010). Importancia de especies de aves en ambientes alto serranos en la provincia de Tucumán, Argentina. *Biológica, Naturaleza, Conservación y Sociedad*, Artículos 12: 48-54.
- Capllonch, P., Ortiz, D. (2006). Los furnaroides de Tucumán, su hábitat y su distribución. *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 85-96.
- Capllonch, P., Ortiz, D., Ferro, I. (2011). Notas sobre la avifauna de las Cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 55 (1): 50-63.
- Capllonch, P., Ortiz, D., Soria, K. (2009). Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina: parte 2. *Acta Zoológica Lilloana* 53 (1-2): 77-97.
- Capllonch, P., Ortiz, D., Nuñez Montellano, M.G., Blendinger, P. (2014). Aportes sobre la distribución, comportamiento y biología del Cerquero Amarillo, *Atlapetes citrinellus* (Aves: Emberizidae). *Acta Zoológica Lilloana* 58 (2): 224-242.
- Capllonch, P., Ortiz, D., Ruiz, C., Lobo Allende, R. (2005). Nuevos registros y observaciones de aves para las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. *Nuestras Aves* 50: 20-21.
- Capllonch, P., Soria, K., Alderete, C., Aveldaño, S., Barboza, E., Mamaní, J.C., Moreno Ten, T. (2014). Primer registro de la migración de la Viudita Chica (*Knipolegus hudsoni*), en la Provincia de Tucumán, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda serie, 149: 1-3.
- Capllonch, P., Alderete, C. A., Aráoz, E., Barboza, E., Mamaní, J. C., Ortiz D., Pérez Bogado W. E., Quiroga, O. B., Soria, K. (2015). Observaciones y capturas de aves poco conocidas en el norte de Argentina. *Nuestras Aves*, 60: 78-82.
- Chebez, J. C. (2009). Otros que se van. Fauna Argentina amenazada. 1º edición, editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina.
- Cocimano, M. C.; Chani, J. M., Echevarria, A. L., Marano, C. F. (2005). La comunidad de aves del Río los Sosa, Tucumán, Argentina. Libro de resúmenes de la XI RAO, Buenos Aires, 7-10 de septiembre de 2005, pág. 81.
- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos-CBRO. (2015). Lista comentada das aves do Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 23 (2): 91-298.
- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres [CITES]. (2019). Apéndices I, II y III en vigor a partir del 26 noviembre 2019. <http://www.cites.org/eng/disc/species.php>
- Cuervo, A. M., Cadena, C. D., Parra, J. L. (2006). Seguir colectando aves en Colombia es imprescindible: un llamado a fortalecer las colecciones ornitológicas. *Ornitología Colombiana* 4: 51-58.
- Dabbene, R. (1910). Ornitología Argentina. *Anales del Museo Nacional de Buenos Aires* 11: 1- 513.
- Darrieu, C. A. (1994). Dos nuevos registros para la avifauna pampeana *Tersina viridis viridis* (Emberizidae:Thraupinae) y *Columbina talpacoti talpacoti* (Columbidae). *Neotrópica* 40: 56.
- de la Peña, M. R. (1999). Aves Argentinas, Lista y Distribución. Editorial: L.O.L.A. Buenos Aires. 244 pp.

- de la Peña, M. R. (2019a). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Nueva serie N°7: 332 pp.
- de la Peña, M. R. (2019b). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Nueva serie N°8: 289 pp.
- de la Peña, M. R. (2019c). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Nueva serie N°9: 436 pp.
- de la Peña, M. R. (2019d). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Nueva serie N°10: 212 pp.
- de la Peña, M. R. (2019e). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Nueva serie N°11: 342 pp.
- de la Peña, M. R. (2019f). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Nueva serie N°12: 236 pp.
- del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A., Kirwan, G. (eds.). (2019). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona, España. Vol 8-11: 14-16. <https://www.hbw.com/species>
- Dirzo, R., Raven, P. (1994). Un inventario biológico para México. *Boletín de la Sociedad Botánica de México* 55: 29-34.
- Di Giacomo, A. G.; Di Giacomo, A. S., López Lanús, B. M., Caradonna, A. (1995). Nuevos registros de aves en el Noroeste Argentino. *El Hornero* 14 (1-2): 67-68.
- Echevarria, A. L., Chani, J. M. (1999). Lista de aves del Embalse El Cadillal, provincia de Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 45 (1): 141-145.
- Echevarria, A. L., Chani, J. M. (2000). Estructura de la comunidad de aves acuáticas del Embalse El Cadillal, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 45 (2): 219-232.
- Echevarria, A. L., Chani, J. M. (2006). Aves migratorias, la importancia del Embalse El Cadillal (Tucumán, Argentina) como sitio de tránsito e invernada. *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 97-108.
- Echevarria, A. L., Fanjul, M. E. (2016). Estructura, composición y variación estacional de la avifauna del Embalse Escaba (Selva montana subtropical), Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 60 (2): 101-115.
- Echevarria, A. L., Martínez, M. V. (2018). Guía de aves de humedales del Noroeste Argentino: Embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán. *Serie Conservación de la Naturaleza*, N° 25: 184pp.
- Echevarria, A., Marano, F., Fanjul, E. (2008b). Comunidades de aves del Embalse Escaba y sus Alrededores, Tucumán. Libro de resúmenes de la XII RAO, San Martín de los Andes, Neuquén, 5 - 8 de marzo de 2008., pág.166.
- Echevarria, A. L., Lobo Allende, I. R., Juri, M. D., Chani, J. M. (2011). Composición, estructura y variación estacional de la comunidad de aves del Jardín Botánico

- de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 55 (1): 123-136.
- Echevarria, A. L., Marano, C. F., Chani, J. M., Cocimano, M. C. (2008c). Composición de la comunidad de aves del Embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 52 (1-2): 98-105.
- Echevarria, A. D., Chani, J. M., Lobo Allende, I. R., Juri, M. D., Torres Dowall, J., Martín, E., Tribulo, E. (2007). Guía de aves del Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo. Fundación M. Lillo, Tucumán, 1 edic., 136 pp.
- Echevarria, A., Fanjul, E., Gómez, M., Marano, C., Martínez, M., Orce, M., Presti, P., Russo, M. (2008a). *Colección de Ornitología de la Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina*. Libro de resúmenes de la XII Reunión Argentina de Ornitología, San Martín de los Andes, Neuquén, 5 - 8 de marzo de 2008., pág. 69.
- EcoRegistros. (2020). Listado sistemático de las aves de Brasil. <http://www.ecoregistros.org/site/pais.php?id=7&idgrupoclase=1>.
- Escalante-Pliego, P., Chávez-Castañeda, N. (2002). La Colección Nacional de Aves (CNAV): pasado y presente de un recurso biológico. *Revista especializada en Ciencias Químico-Biológicas* 5 (2): 61-68.
- Esteban, J. G. (1948). Contribución al conocimiento de los Dendrocolápticos argentinos. *Acta Zoológica Lilloana* 5: 325-436.
- Esteban, J. G. (1953). Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zoológica Lilloana* 13: 349-362.
- Esteban, J. G. (1960). Nuevo hallazgo del águila crestada de Des Murs. *Acta Zoológica Lilloana* 17: 499-503.
- Fanjul, M. E., Echevarria, A. L. (2015). Composición, estructura y rol social de las bandadas mixtas de aves de la Selva montana de Yungas, provincia de Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 59 (1-2): 141-154.
- Fanjul, M. E., Antelo, C. M., Brandán Fernández, Z. J., Martínez, M. V., Echevarria, A. L., Marigliano, N. L., Navarro, C.I. (2019). Variación estacional de la avifauna del Bosque Montano en la Quebrada del Portugués, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 63 (2): 33-47.
- Franzoy, A. V. (2016). Presencia de Tersina (*Tersina viridis*) en la provincia de Corrientes, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 6(5): 16-19. 2016
- Gómez, M. D. (2010). Estudio de la comunidad de aves en ambientes riparios del Arroyo Tafí (Tafí Viejo, Tucumán). Tesis de Grado, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, (Inédito).
- Haro, J. G. (2002). Aves albinas en la Colección del Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba. *Natura Neotropicalis* 1 (33): 85-88.
- Holland, A. H. (1891). Further Notes on the Birds of the Argentina Republic. *The Ibis* 33 (1): 16-20.
- Holland, A. H. (1892). Short notes on the Birds of Estancia Espartilla, Argentina Republic. *The Ibis* 24 (2): 193-214.
- Howard, R., Moore, A. (2003). *Complete Checklist of the Birds of the World*. Dickinson E. C. y Christidis, L. (eds.). 2014. 4Th edition. Vol 2 Passerine. Aves Press Limited, East Vourne, U.K. Isbn: 978-0-9568611-0-8.

- Juri, M. D., Chani, J. M. (2005). Variación en la composición de comunidades de aves a lo largo de un gradiente urbano (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 49 (1-2): 49-57.
- Lomáscolo, B. S., Monmany, C., Malizia, A., Martín, T. E. (2010). Flexibility in nest-site choice and nesting success of *Turdus rufiventris* (Turdidae) in a montane forest in northwestern Argentina. *The Wilson Journal of Ornithology* 122 (4): 674-680.
- López Lanús, B. (2017). Guía Audiornis de las Aves de Argentina: Fotos y sonidos. Identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Segunda edición ampliada. Buenos Aires, Argentina: Copyright Audiornis Producciones.
- Lucero, F. (2013). Nuevas aves, primeras evidencias y localidades para las provincias de San Juan y Catamarca, Argentina. *EcoRegistros Revista* 3 (14): 52-63.
- Lucero, M. M. (1983). Lista de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. *Miscelánea* 75: 61 pp.
- Lucero, M. M., Brandán, Z. J., Chani, J. M. (2005). Composición y variación anual de la avifauna de los tres grandes parques urbanos de San Miguel de Tucumán (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 49 (1-2): 43-48.
- Lucero, M. M., Chani, J. M., Brandán, Z. J., Echevarría, A. L., Juri, M. D. (2002). Lista de aves de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. *Acta Zoológica Lilloana* 46 (1): 131-135.
- Malizia, S. (2014). Situación legal del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Pág 50-51. En: Áreas protegidas de Tucumán. Guía audiovisual. Lomáscolo, T.; Grau A. y Brown A. (eds). Ediciones del Subtrópico, Fundación ProYungas, Yerba Buena, Tucumán.
- Mamaní, J. C., Quiroga, O. B., Moreno Ten, T., Aveldaño, S. (2017). Adiciones a la Avifauna de La Reserva Experimental Horco Molle, Provincia de Tucumán, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda serie 212, 1-7.
- Marigliano, N. L., Brandán Fernández, Z. J. (2013). Confirmación de la presencia de la Mosqueta Cabeza canela, *Poecilatriccus plumbeiceps* (Passeriformes, Tyrannidae) en la provincia de Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 57 (2): 221-225.
- Marigliano, N. L.; Navarro, C. I., Brandán, Z. J. (2010). Aves asociadas a los bordes de una parcela cultivada con trigo (Burruyacú, Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 54 (1-2): 121-128.
- Marigliano, N. L., Antelo, C. M., Brandán Fernández, Z. J., Navarro, C.I. (2017). Avifauna asociada a sectores de bosques ribereños con modificaciones antropogénicas (Tucumán, Argentina). III. Composición y cambios estacionales del ensamble. *Acta Zoológica Lilloana* 61 (1): 15-26.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentinas [MAyDS y AA]. (2017). Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, Edic. Electrónica. C.A. Buenos Aires. 146 pp.
- Moreno Ruiz Holgado, M. M. (2012). Comparación de diversidad de Aves en bosques nativos de rivera y bosques de *Gleditsia triacanthos* de la cuenca media del Río

- San Javier. Tesis de grado, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. (Inédito).
- Moschione, F. (2007). AICA Tucumán. En: A.S. Di Giacomo, M.V. De Francesco, E.G. Coconier (eds.). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5 (pp. 476-489). Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Narosky, T., Yzurieta, D. (2010). Aves de Argentina y Uruguay. Guía de identificación/ Birds of Argentina and Uruguay. A field guide. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires. 432 pp.
- Narosky, T., Di Giacomo, A .G. (1993). *Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Buenos Aires. 128 pp.
- Navarro, C. I., Antelo, C .M. (2014). Comunidades de aves presentes en un área residencial suburbana y en un área exurbana en el departamento Tafí Viejo (Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 58 (1): 133-146.
- Navarro, C. I., Marigliano, N. L. (2006). Avifauna otoño-invernal en un sector de Bosque Chaqueño Serrano (Trancas, Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 50 (1-2): 55-60.
- Navarro, C. I., Marigliano, N. L. (2009). Presencia del Saí Común (*Conirostrum speciosum*) en la Provincia de Tucumán. *Nuestras Aves* 54: 87-88.
- Navarro, C. I., Brandán, Z. J., Marigliano, N. L. (2007). Lista comentada de las aves de un fragmento de la Reserva Provincial La Florida, Tucumán, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 51 (2): 142-150.
- Navarro, C. I., Brandán, Z. J., Antelo, C. M., Marigliano, N. L. (2000). Avifauna invernal en una localidad del Bosque Chaqueño Serrano (Las Tipas, Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 45 (2): 233-240.
- Navas, J. R., Narosky, T., Bó, N. A., Chebez, J. C. (1990). Lista patrón de los nombres comunes de las aves argentinas. Asociación Ornitológica del Plata, Bs. As.
- Navas, J. R. (2002a). Las aves exóticas introducidas y naturalizadas en la Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 4 (2): 191-202.
- Navas, J. R. (2002b). La distribución geográfica de *Pseuocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae) en la Argentina. *El Hornero* 17: 45-48.
- Olrog, C. C. (1962). Notas ornitológicas VI sobre la Colección del Instituto Miguel Lillo. *Acta Zoológica Lilloana* 18: 111-120.
- Olrog, C. C. (1963). Lista y distribución de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 9, 377 pp.
- Olrog, C. C. (1967). Observaciones sobre aves migratorias. *El Hornero* 10 (4): 292-298.
- Olrog, C. C. (1968a). *Guía del cazador de las aves de caza argentinas. Sportsman's guide, to the Argentina game-birds*. Guillermo Kraft LTD, Buenos Aires, 45 pp.
- Olrog, C. C. (1968b). Las aves sudamericanas. Una guía de campo. Tomo I (Pingüinos – Pájaros carpinteros). Fundación e Instituto Miguel Lillo, Tucumán, 507 pp.
- Olrog, C. C. (1972a). Adiciones a la avifauna argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 26 (17): 255-266.

- Olrog, C. C. (1972b). Notas ornitológicas VIII. Sobre la Colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana* 26 (18): 267-274.
- Olrog, C. C. (1974a). Notas ornitológicas X. Sobre la Colección del Instituto Miguel Lillo. *Acta Zoológica Lilloana* 31 (8): 69-76.
- Olrog, C. C. (1974b). Notas ornitológicas XI. Sobre la Colección del Instituto Miguel Lillo. *Acta Zoológica Lilloana* 33 (2): 5-7.
- Olrog, C. C. (1979). Nueva Lista de la avifauna Argentina. Fundación Miguel Lillo, Tucumán. *Opera Lilloana* 27, 324 pp.
- Olrog, C. C. (1984). *Las aves argentinas: una nueva guía de campo*. Administración Nacional de Parques, Buenos Aires, Argentina. 351 pp.
- Olrog, C. C. (1985a). Status of wet forest raptors in Northern Argentina. ICBP Technical Publication 5: 191-197.
- Olrog, C. C. (1985b). La dispersión en Sudamérica de los «Suboscines» versus «Oscines». *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales. Zoología* 23:, 172-176.
- Ortiz, D. (2009). Un nuevo registro del Tersina o Azulejo Golondrina (*Tersina viridis viridis*) para el Noroeste Argentino. *Nótulas Faunísticas*, Segunda Serie 38, 1-3.
- Ortiz, D., Aráoz, R. (2013). Aves de la Sierra de San Javier. Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán. 131 pp.
- Ortiz, D., Capllonch, P. (2007). Distribución y migración de *Sporophila c. caerulescens* en Sudamérica. *Revista Brasileira de Ornitología* 13: 377-385.
- Ortiz, D., Capllonch, P. (2008). Dos fruteros migrantes de Argentina. *Ornitología Neotropical* 19: 473-479.
- Ortiz, D., Capllonch, P. (2010). La migración del Volatinero (*Volatinia jacarina jacarina*) Linné 1766 (Emberizidae: Aves). *Kempffiana* 6 (1): 38-42.
- Ortiz, D., Ruiz, C. (2011). Migración y estacionalidad de aves en el Arroyo Mista, Tucumán, Argentina. *Nuestras Aves* 56: 16-18.
- Ortiz, D., Aráoz, R., Alderete, C. (2011). Lista sistemática de las aves de la Reserva Experimental Horco Molle, provincia de Tucumán, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda serie 62: 1-5.
- Ortiz, D., Aráoz, R., Capllonch, P. (2006). Registros novedosos de Doraditos (*Pseudocolopteryx*) en la Provincia de Tucumán. *Nuestras Aves* 52: 24-25.
- Ortiz, D., Ferro, I., Barrionuevo, C. (2012). Primera descripción del nido y movimientos estacionales del Birro chico (*Pyrrhomyias c. cinnamomeus*) en Argentina. *Nuestras Aves* 57: 8-9.
- Ortiz, D., Martínez Pastur, E., Moreno Ten, T. (2017). Presencia de la Calandria Castaña (*Mimus dorsalis*) en la Provincia de Tucumán, Argentina. *EcoRegistros Revista* 7 (1): 1-2.
- Ortiz, D., Martínez Pastur, E., Juliá, J. P., Quiroga, P. (2018). Lista de aves de la Reserva Privada San Pablo, Provincia de Tucumán, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda Serie 246: 1-8.
- Ortiz, D., Novillo, A., Ferro, I., Ovejero, R., Capllonch, P. (2005). Contribución al conocimiento de la avifauna de las Cumbres Calchaquíes (Tucumán, Argentina). Libro de resúmenes de la XI RAO, Buenos Aires, 7 - 10 de septiembre de 2005, pág.136.

- Ortiz, D., Capllonch, P., Aveldaño, S., Mamani, J., Quiroga, O., Moreno Ten, T. (2013a). Los passeriformes de Tucumán, Argentina: lista, distribución y migración. *Biológica Naturaleza, Conservación & Sociedad* 16, 39-71.
- Ortiz, D., Aveldaño, S., Moreno Ten, T., Mamani, J. C., Matias, E., Martínez Pastur, E., Salas, M. (2013b). Arañero Coronado Grande (*Basileuterus bivittatus*) en la provincia de Tucumán, Argentina. *EcoRegistros Revista* 3 (12): 47-49.
- Pearman, M. (2001). Notes and range extensions of some poorly known birds of northern Argentina. *Cotinga* 16: 76-80.
- Piloni, G., Camperi, A. R. (2011). Actualización de la distribución y algunas consideraciones sistemáticas sobre el Yal Plomizo (*Phrygilus unicolor*) en la Argentina. *Revista del Museo Argentino Ciencias Naturales* 13 (1): 111-116.
- Presti, M. P., Echevarria, A. L. (2009). El ensamble de aves en un relicto de Selva pedemontana: Parque Percy Hill (Yerba Buena, Tucumán, Argentina). *Acta Zoológica Lilloana* 53 (1-2): 64-76.
- Quiroga, O. B. (2018) Siete aves poco frecuentes en Santiago del Estero y Tucumán, Argentina. *Nuestras Aves* 63: 36-38.
- Rabuffetti, F. L., Cerezo, A. (2017). Resultados obtenidos. Pág. 16-26. En: MMayDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentinas). Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos Aires, Argentina.
- Rebolo Ifran, N. (2009). Invasión del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la Argentina: densidad poblacional e interacción con aves nativas en la ciudad de Buenos Aires. Tesis de Grado, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 41 pp.
- Remsen, J. V. Jr., Areta, J. I., Cadena, C. D., Claramunt, S., Jaramillo, A., Pacheco, J. F., Robbins, M. B., Stiles, F. G., Stotz, D. F., Zimmer, K. J. Versión 21/5/2019. A classification of the bird species of South America. American Ornithologists' Union. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>
- Rougés, M., Blake, J. (2001). Tasas de captura y dietas de aves del sotobosque en el Parque Biológico Sierra de San Javier, Tucumán. *El Hornero* 16: 7-15.
- Rumboll, M., Capllonch, P., Lobo, R., Punta, G. (2005). Sobre el anillado de aves en la Argentina: recuperaciones y recapturas. *Nuestras Aves* 50: 21- 24.
- Santillán de Andrés, S. E., Ricci, T. R. (1980). Geografía de Tucumán. Consideraciones generales. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, 175 pp.
- Salvador, S. A. (2015). Reproducción de aves andinas del Noroeste Argentino. *Historia Natural*, Tercera serie, 5 (1): 49-76.
- Salvador, S. A., Di Giacomo, A. G. (2014). Datos de pesos de aves argentinas. Parte 3. *Historia Natural*, Tercera Serie 4 (2): 63-88.
- Shultz, A. J., Burns, K. J. (2013). Plumage evolution in relation to light environment in a novel clade of Neotropical tanagers. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 66, 112-125.
- Soria, K. (2015). Descripción del nido y los pichones de la Monterita Serrana (*Compsospiza baeri*). *El Hornero* 30 (1): 29-32.

- Soria, K., Barboza, E. (2016). Primera descripción del nido y los pichones de *Diglossa sittoides* (Thraupidae) en Argentina. *El Hornero* 31 (1): 57-60.
- Soria, K., Aveldaño, S., Capllonch, P. (2008). Interpretación de las mudas del plumaje de tres zorzales comunes de la provincia de Tucumán. *Xolmis Revista de Ornitología* 3: 19-27.
- Soria, K., Ortiz, D., Aráoz, R., Moyano Wagner, E., Alderete, C., Capllonch, P. (2010). Sobre el anillado de Aves en Argentina: recaptura de aves en localidades de monitoreo en el Noroeste de Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda serie 53: 1-6.
- Turienzo, P. N., Di Iorio O. (2013). Insectos en nidos de aves de la Argentina: *Asthenes dorbignyi* (Reichenbach, 1853) [Aves: Furnariidae]. Universidad de Tarapacá. *Idesia* 31 (4): 87-94.
- Unión Internacional para la conservación de la naturaleza [UICN]. (2019). (Versión 2017- 3). Red List of Threatened Species. Consultada 07 May 2018. <https://www.UICNredlist.org/>
- Vides Almonacid, R. (2001). Nuevos datos del Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*) para Tucumán, Argentina. *Nuestras Aves* 42: 23-24.
- Vides Almonacid, R., Ayarde, H. R., Scrocchi, G. J., Romero, F., Boero, C., Chani, J. M. (1998). Biodiversidad de Tucumán y el Noroeste Argentino. Aportes de la Fundación Miguel Lillo a su conocimiento, manejo y conservación. *Opera Lilloana* 43: 1-64.
- Villarreal, H., Álvarez, M., Córdoba, S., Escobar, F., Fagua, G., Gast, F., Mendoza, H., Ospina M., Umaña, A.M. Segunda edición. (2006). Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 236 pp.
- Zelaya, P. V., Salvador, S. A.; Giraud, H.; Klavins, J. (2013). Primeros registros de *Tersina (Tersina viridis)* para la Ecoregión Chaqueña de Argentina. *Nuestras Aves* 58: 52-54.

Apéndice 1 (hoja 1 de 4). Localidades de colecta del material depositado en la Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo (COLFML), incluye pieles, esqueletos y ejemplares en alcohol.

Localidad	Departamento	Coordenadas	Observación
5 km al O de Piedra Tendida	Burruyacú	26°30' – 64°52'	
Acheral	Monteros	27°07' – 65°27'	
Aconquija	Tafí del Valle	27°00' – 65°45'	Sa. del Aconquija
Aconquija	S/Dpto.		
Agua la tipa	Río Chico		
Agua Rosada	Trancas	26°22' – 65°26'	
Alpachiri	Chicligasta	27°20' – 65°45'	
Alrededores del Dique El Cajón, 2 km hacia el N	Burruyacú	26°31' – 64°52'	
Alto de la Laguna	Trancas		
Alto de la Perdiz, Cumbres de Cabra Horco	Trancas	26°36' – 65°29'	
Alto de la Tatora	Trancas		
Amaicha del Valle	Tafí del Valle	26°36' – 65°55'	
Ampimpa	Tafí del Valle	26°36' – 65°50'	
Ancajuli	Tafí Viejo	26°35' – 65°34'	
Anfama	Tafí Viejo	26°45' – 65°30'	
Anta Yacu, Parque Biológico Sierra de San Javier	Yerba Buena	26°46' – 65°19'	
Arroyo Cruz Cañada	Trancas		
Arroyo Mista	Leales	27°12' – 65°10'	
Arroyo Tala	Trancas	26°11' – 65°18'	
Bajo	Leales		
Bajo Grande	Cruz Alta	26°55' – 65°09'	
Barranca Colorada, Río Salí	Cruz Alta	26°49' – 65°09'	
Bella Vista	Leales	27°01' – 65°18'	
Camino entre Amaicha y Santa María	Tafí del Valle		
Camino entre El Infiernillo y Amaicha	Tafí del Valle		
Camino entre el Ingenio Santa Lucía y Tafí del Valle	Monteros		
Camino entre Ingenio Santa Lucía y Tafí del Valle	Tafí del Valle		
Camino entre Tafí del Valle y Amaicha	Tafí del Valle		
Campo azul	Leales	27°33' – 65°08'	
Campo Grande, Las Calandritas	Graneros	27°32' – 65°39'	
Campo Las Chuñas	Trancas		
Campo Norte	Capital	26°48' – 65°14'	
Casa de Piedra	Trancas		
Caspinchango	Famaillá	27°04' – 65°29'	
Cerro de Tafí	S/Dpto.		
Cerro de Tucumán, Tafí Viejo	Tafí Viejo		
Cerro del campo	Burruyacú	26°31' – 64°57'	
Cerro del Pabellón	Tafí del Valle	26°48' – 65°41'	
Cerro Dos Pozos	Trancas		
Cerro El Negrito	Tafí del Valle	26°40' – 65°44'	
Cerro Muñoz	Tafí del Valle	26°51' – 65°46'	
Cerro Negro	Trancas		
Cerro San Javier	Tafí Viejo	26°42' – 65°19'	Sa. de San Javier
Cerro San Javier	Yerba Buena	26°46' – 65°22'	
Cerro Tafí Viejo	Tafí Viejo	26°42' – 65°17'	
Cerros de Tafí	Tafí Viejo	26°42' – 65°19'	Sa. de San Javier
Chasquivil	Tafí Viejo	26°40' – 65°36'	Cuesta
Chilca	Trancas		
Chulca	Trancas	26°12' – 65°30'	
Cochuna	Chicligasta	27°19' – 65°55'	Camping Samay
Colalao del Valle	Tafí del Valle	26°22' – 65°57'	
Colombres	Cruz Alta	26°54' – 65°06'	
Colombres, B° Santa Inés	Cruz Alta	26°52' – 65°06'	
Concepción	Chicligasta	27°20' – 65°35'	
Condor Huasi	Leales	27°01' – 65°02'	
Cruz Cañada	Trancas		
Cuesta de Mala Mala	Tafí del Valle	26°53' – 65°39'	
Cuesta de Mala Mala	Lules	26°49' – 65°29'	
Cumbre Bajo La Hoyada	Tafí Viejo	26°40' – 65°31'	

Apéndice 1 (hoja 2 de 4).

Localidad	Departamento	Coordenadas	Observación
Cumbre Hirajo de La Hoyada	Tafí Viejo	26°41' – 65°32'	
Cumbre los Nogales	Tafí Viejo	26°42' – 65°12'	
Cumbres de Mala Mala	Lules	26°48' – 65°34''	
Cumbres de Mala Mala	Tafí del Valle	26°50' – 65°32'	
Cumbres del Aconquija	Tafí del Valle	26°52' – 65°49'	
Dique El Cadillal	Tafí Viejo	26°37' – 65°10'	
Dique La Aguadita	Tafí Viejo	26°44' – 65°08'	
Dique Tacanas	Trancas	26°28' – 65°40'	
El Bañado	Tafí del Valle	26°25' – 65°57'	
El Cadillal	Trancas		
El Cadillal	Tafí Viejo	26°37' – 65°12'	
El Cadillal	S/Dpto.		
El Cajón	Burrucacú	26°32' – 64°52'	
El Carmen, 13 Km al O de Fuerte Quemado	Tafí del Valle	26°33' – 66°06'	
El Corte, Barrio El Típal	Yerba Buena	26°47' – 65°16'	
El Guardamonte	Leales	27°21' – 65°05'	
El Infiernillo	Tafí del Valle	26°44' – 65°47'	Incluye referencias como: 9 km antes de los Cardones, Los Cardones, quebrada, Valle de Tafí
El Manantial	Lules	26°51' – 65°16'	
El Matadero	Famaillá	26°52' – 65°37'	
El Naranjo	Burrucacú	26°40' – 65°02'	
El Negrito	Tafí Viejo	26°41' – 65°43'	
El Potrerillo	Tafí del Valle	26°57' – 65°43'	
El Remate, Amaicha	Tafí del Valle	26°38' – 66°51'	
El Saladillo	Tafí Viejo	26°40' – 65°16'	
El Simbolar	Trancas	26°14' – 65°23'	
El Sunchal	Burrucacú	26°37' – 65°04'	
El Timbó	Burrucacú	26°42' – 65°07'	
El Timbó Viejo	Burrucacú	26°42' – 65°08'	
El Vizcacheral	Leales	27°14' – 65°11'	
Estancia Pozo Cavao	Burrucacú	26°30' – 64°45'	
Finca Buena Vista	Trancas		
Gastona	Chicligasta	27°19' – 62°25'	
Horco Molle	Yerba Buena	26°45' – 65°21'	
Huaca-Huasi	Tafí del Valle	26°40' – 65°44'	
Huaca-Huasi, Vega matadero	Tafí del Valle	26°42' – 65°42'	
Hualinchay	Trancas	26°19' – 65°37'	
Íltico	Chicligasta	27°20' – 65°39'	
Ingenio Fronterita	Famaillá	27°01' – 65°27'	
Ingenio Luján	Burrucacú	26°51' – 65°05'	
Jardín Botánico de Fundación Miguel Lillo, S. M. de Tucumán	Capital	26°81' – 65°21'	
San Pedro de Colalao, junta de los Ríos	Trancas		
La Aguadita	Tafí Viejo	26°45' – 65°09'	
La Angostura	Trancas	26°15' – 65°32'	
La Calera	Chicligasta	27°35' – 65°44'	
La Cañitas	S/Dpto.		
La Cumbre	Tafí Viejo	26°41' – 65°19'	
La Higuera	Trancas	26°23' – 65°25'	
La Hoyada	Tafí Viejo	26°40' – 65°30'	
La Laguna	Trancas		
La Quebradita	Tafí del Valle	26°50' – 65°42'	
La Ramada	Burrucacú	26°42' – 64°57'	
La Reducción	Lules	27°57' – 65°22'	
La Típa	Río Chico	27°23' – 65°43'	
Laguna Calchaquí	Tafí del Valle	26°43' – 65°37'	

Apéndice 1 (hoja 3 de 4).

Localidad	Departamento	Coordenadas	Observación
Laguna Calimayo, La Reducción	Lules	26°95' – 65°30'	
Laguna de Pasayán	S/Dpto.		
Laguna del Tesoro	Chicligasta	27°01' – 65°54'	
Laguna Jangallo	Famaillá	27° 06' – 64°87'	
Laguna la Ripiera, San Felipe	Lules	26°53' – 65°14'	
Laguna Malvinas	Lules	26°55' – 65°17'	
Lagunas, Cerro de la Laguna	Tafí del Valle		
Lagunita (3000 m snm)	S/Dpto.		
Lara	Tafí del Valle	26°24' – 65°43'	
Las Cañitas	Capital	26°51' – 65°14'	
La Ciénaga	Tafí del Valle	26°46' – 65°39'	
Las Cuchillas	Burruyacú	26°20' – 65°06'	
Las Cuevas	Trancas		
Las Juntas	Trancas	26°24' – 65°31'	
Las Mesadas	Trancas	26°27' – 65°30'	
Las Pavas	Tafí del Valle	27°15' – 65°52'	
Las Pavitas	Capital		
Las Tacanas	Trancas	26°19' – 65°32'	
Las Tipas	Trancas	26°16' – 65°33'	Incluye: Aguadas
Las Vertientes	Trancas	26°27' – 65°30'	
Leales	Leales	27°11' – 65°18'	
Los Aguirre	Capital	26°54' – 65°13'	
Los Chorizos	Chicligasta	27°15' – 65°53'	
Los Chorrillos	Burruyacú	26°20' – 64°56'	
Los Gómez	Leales	27°19' – 65°12'	
Los Herrera	Leales	27°25' – 65°03'	
Los Nogales	Tafí Viejo	26°42' – 65°13'	
Los Pocitos	Tafí Viejo	26°46' – 65°13'	
Los Pocitos	Trancas		
Los Romanos	Leales	27°24' – 65°08'	
Los Sarmientos	Río Chico	27°24' – 65°41'	
Los Vásquez	Graneros	27°49' – 65°17'	
Los Vázquez	Capital	26°52' – 65°13'	
Lules	Lules	26°56' – 65°23'	
Malvinas	Lules	26°53' – 65°19'	
Manchalá	Famaillá	27°07' – 65°17'	
Marcos Paz	Yerba Buena	26°49' – 65°17'	
Mariño	Burruyacú	26°44' – 65°02'	
Medinas	Chicligasta	27°25' – 65°31'	
Monte Bello	Río Chico	27°22' – 65°44'	
Monte Bello	Trancas	26°14' – 65°33'	
Monte Toro	S/Dpto.		
Monteagudo	Chicligasta	27°30' – 65°16'	
Monteagudo	Simoca	27°30' – 65°16'	
Nueva España	Leales	27°27' – 65°12'	
Ñorco	Trancas	26°28' – 65°30'	
Parque Norte	Capital	26°48' – 65°13'	
Puente del Indio	Trancas		
Puesto El Alto	Trancas		
Puesto Viejo	Graneros	27°37' – 65°15'	
Puesto Viejo, Ñorco, Vípos	Trancas	26°29' – 65°30'	
Quebrada Cainzo	Tafí Viejo	26°43' – 65°17'	y Arroyo Cainzo
Quebrada de Los Laureles	Trancas		
Quebrada de Lules	Lules	26°52' – 65°25'	
Quebrada de Vípos	Trancas		
Quebrada del Portugués	Tafí del Valle	27°01' – 65°46'	
Quebrada el Cevil	Trancas		
Quebrada Las Cuevas	Trancas		
Quebrada los Matos	Trancas	26°20' – 65°22'	
Quilmes	Leales	27°06' – 65°21'	

Apéndice 1 (hoja 4 de 4).

Localidad	Departamento	Coordenadas	Observación
Raco	Tafí Viejo	26°38' – 65°25'	
Rearte	Trancas	26°22' – 65°33'	
Rearte Norte	Trancas	26°06' – 65°28'	
Rearte Sur	Trancas	26°23' – 65°34'	
Reserva Experimental Horco Molle	Yerba Buena	26°46' – 65°19'	
Reserva Provincial La Florida	Monteros	27°08' – 65°52'	
7 Km al O de Ibatín, en Río Pueblo Viejo	Monteros	27°11' – 65°40'	
Reserva Provincial Aguas Chiquitas, El Cadillal	Tafí Viejo	26°35' – 65°10'	
Río Chilca	Trancas		
Río Chulca	Trancas	26°12' – 65°27'	
Río Cochuna	Chicligasta		
Río Colorado	Famaillá	27°02' – 65°24'	
Río Colorado	Leales	27°09' – 65°21'	
Río del Nío	Burrucacú	26°26' – 64°55'	
Río Las Tacanas	Trancas	26°12' – 65°27'	
Río Las Tipas	Trancas	26°16' – 65°18'	
Río Nío, 4 Km al O, Camino hacia Altos de Medina	Burrucacú	26°24' – 64°57'	
Río Piedras	Yerba Buena		
Río Salí	Leales		
Río Salí	Capital	26°83' – 65°17'	
Río Vipos	Trancas	26°31' – 65°14'	
Ruta 307, Km 21 camino a Tafí del Valle	Monteros	27°06' – 65°32'	
Ruta 307, Km 26,9 camino a Tafí del Valle	Monteros	27°05' – 65°38'	
San Carlos	Chicligasta	27°25' – 65°28'	
San Felipe	Lules	26°53' – 65°25'	
San Fernando	Trancas	26°12' – 65°28'	
San Javier	Yerba Buena	26°47' – 65°23'	
San Miguel de Tucumán	Capital	26°81' – 65°21'	
Barrio Villa Luján	Capital	26°48' – 65°15'	
Barrio El Bosque	Capital	26°48' – 65°13'	
San Pablo	Lules	26°52' – 65°18'	
San Pedro de Colalao	Trancas	26°14' – 65°29'	
Santa Ana	Río Chico	27°46' – 65°68'	
Santa Bárbara	Lules	26°54' – 65°16'	
Santa Cruz	Chicligasta	27°23' – 65°26'	
Santa Cruz	Tafí del Valle	26°55' – 65°43'	
Santa Rosa de Leales	Leales	27°09' – 65°15'	
Tafí del Valle	Tafí del Valle	26°52' – 65°41'	
Tafí Viejo	Tafí Viejo	26°44' – 65°16'	
Taficillo	Tafí Viejo	26°42' – 65°17'	
Tapia	Trancas	26°35' – 65°16'	
Ticucho, Camping de la UNT	Trancas	26°33' – 65°14'	
Tierra Colorada	Trancas		
Tío Punco	Tafí del Valle	26°27' – 65°56'	
Tiro Argentino	Tafí Viejo	26°40' – 65°14'	
Toro Muerto	Leales	27°35' – 65°20'	
Trancas	Trancas	26°13' – 65°17'	
Tranquitas	Burrucacú	26°37' – 65°01'	
Valle de Tafí	Tafí del Valle		
Valles Calchaquies	Tafí del Valle		
Ventana del Indio	Trancas		
Villa Batiruana	J. B. Alberdi	27°38' – 65°44'	
Villa Carmela	Yerba Buena	26° 45' – 65°16'	
Villa Nougues	Lules	26°51' – 65°23'	
Vipos	Trancas	26°29' – 65°22'	
Yerba Buena	Yerba Buena	26°49' – 65°19'	Jonas Salk
Zárate	Trancas	26°15' – 65°25'	
Zárate Norte	Trancas	26°12' – 65°25'	

Apéndice 2

Especies cuya presencia actual en la provincia de Tucumán es dudosa o requiere confirmación.

1) Familia *Thamnophilidae*

Thamnophilus doliatus

CHOCA LISTADA / BARRED ANTSHRIKE

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- MATERIAL ESTUDIADO: En piel: (548) 1H, (S/Dpto.) El Cadillal, 1914.
- LITERATURA: No mencionada para la provincia en las guías consultadas.
- OBSERVACIONES: El ejemplar depositado en la COLFML podría estar mal identificado por haberse confundido con las hembras de las otras especies del género. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

2) Familia *Tyrannidae*

Muscisaxicola juninensis

DORMILONA PUNEÑA / PUNA GROUND-TYRANT

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- MATERIAL ESTUDIADO: Sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: Howard y Moore, 2003; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017; del Hoyo *et al.*, 2019.
- OBSERVACIONES: UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Arundinicola leucocephala

LAVANDERA / WHITE-HEADED MARSH-TYRANT

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- MATERIAL ESTUDIADO: Sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- LITERATURA: de la Peña, 1999; Howard y Moore, 2003; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017; de la Peña, 2019c.
- OBSERVACIONES: de la Peña, 1999 como *Fluvicola leucocephala*. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Neoxolmis rubetra

MONJITA CASTAÑA / RUSTY-BACKED MONJITA

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- MATERIAL ESTUDIADO: Sin material de la provincia de Tucumán en la COL-FML.
- LITERATURA: de la Peña, 1999; Howard y Moore, 2003; Brandán y Navarro, 2009; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017; de la Peña, 2019c; del Hoyo *et al.*, 2019.
- OBSERVACIONES: en otoño migra al norte. UICN: LC; MAyDS y AA: VU.

Incertae sedis

Tachuris rubrigastra

TACHURÍ SIETECOLORES / MANY-COLORED RUSH TYRANT

- Localidades de observación: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- Material estudiado: Sin material de la provincia de Tucumán en la COLFML.
- Literatura: de la Peña, 1999; Howard y Moore, 2003; Brandán y Navarro, 2009; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017; de la Peña, 2019c; del Hoyo *et al.*, 2019.
- Observaciones: UICN: LC; MAyDS y AA: NA. Localidad más cercana a la provincia donde fue registrada la especie: Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

3) Familia Thraupidae

Sicalis lutea

JILGUERO PUNEÑO / PUNA YELLOW-FINCH

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- MATERIAL ESTUDIADO: Sin material de la provincia de Tucumán en la COL-FML.
- LITERATURA: de la Peña, 1999; Howard y Moore, 2003; Brandán y Navarro, 2009; Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017; de la Peña, 2019e; del Hoyo *et al.*, 2019.
- OBSERVACIONES: Incluida anteriormente en la Familia Emberizidae. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

Charitospiza eucosma

AFRECHERO CANELA, MONTERITA CRESTADA / COAL-CRESTED FINCH

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- MATERIAL ESTUDIADO: Sin material de la provincia de Tucumán en la COL-FML.
- LITERATURA: de la Peña, 2019e.
- OBSERVACIONES: Remsen *et al.* (2019) la citan como vagante. La presencia en Argentina corresponde a un registro único en Misiones. UICN: NT; MAyDS y AA: NA.

Saltator similis

PEPITERO VERDOSO / GREEN-WINGED SALTATOR

- LOCALIDADES DE OBSERVACIÓN: Sin registros en la provincia de Tucumán.
- MATERIAL ESTUDIADO: Sin material de la provincia de Tucumán en la COL-FML.
- LITERATURA: Brandán y Navarro, 2009; de la Peña, 2019e.
- OBSERVACIONES: En el este de Argentina. UICN: LC; MAyDS y AA: NA.

