



Lista actualizada de las aves de Santiago del Estero, Argentina

Update birds list of Santiago del Estero, Argentina

Oscar R. Coria^{1,2*}; Oscar B. Quiroga^{2,3}; José L. Navarro²; Javier Heredia⁴;
Ricardo Torres⁵; Javier Lima¹

¹ Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Av. Belgrano (s) 1912, (4200) Ciudad Capital de Santiago del Estero, Argentina.

² COA Kakuy, Independencia 1856, (4200) Santiago del Estero, Argentina.

³ Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, (4000) San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

⁴ Ecosistemas Argentinos, 27 de Abril 2050, (5000) Ciudad de Córdoba, Argentina.

⁵ Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA - CONICET) y Museo de Zoología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 299, (X5000JJ) Córdoba, Argentina.

* Correo electrónico: orcunse2002@yahoo.com.ar

RESUMEN

Este artículo presenta una actualización de la lista de aves de la provincia de Santiago del Estero (Argentina), que evalúa la residencia y distribución, y reporta el estado de conservación nacional de las especies. Las fuentes de registros de las aves corresponden a libros, artículos científicos, tesis, informes técnicos, colecciones de museos, páginas web y a las observaciones personales de los autores del presente artículo. La lista consiste de 387 especies de aves (26 órdenes y 61 familias), con 51 especies nuevas en referencia a la lista de 1991. Fueron determinadas 188 especies residentes, 64 migrantes estivales, 18 migrantes invernales, 2 migrantes de paso y 57 ocasionales. Los estados de conservación evidenciaron 1 especie En Peligro Crítico, 4 En Peligro, 7 Amenazadas, 21 Vulnerables, 348 No Amenazadas y 1 Insuficientemente Conocida. Se requiere reforzar los estudios de aves para definir las residencias de 58 especies, y para evaluar las situaciones actuales de las especies que no se registran desde hace más de tres décadas en la provincia.

Palabras clave — Aves, lista actualizada, residencia, distribución, estado de conservación, Santiago del Estero.

► Ref. bibliográfica: Coria, O. R., Quiroga, O. B., Navarro, J. L., Heredia, J., Torres, R., Lima, J. (2021). Lista actualizada de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Acta zoológica lilloana* 65 (1): 42-143. doi: <https://doi.org/10.30550/j.azl/2021.65.1/2021-03-16>

► Recibido: 22 de diciembre 2020 – Aceptado: 16 de marzo 2021.

► URL de la revista: <http://actazoologica.lillo.org.ar>

► Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.



ABSTRACT

This paper presents an update to the bird list of Santiago del Estero province (Argentina), which evaluates the occurrence and distribution and reports the national conservation status of the species found. The sources of bird records correspond to books, scientific articles, theses, technical reports, museum collections, web pages and the personal observations of the authors of this paper. The list consists of 387 bird species (26 orders and 61 families), with 51 new species regarding the 1991 list. From the species identified 188 were resident species, 64 summer migrants, 18 winter migrants, 2 passage migrants and 57 occasional. The conservation status showed 1 species Critically Endangered, 4 Endangered, 7 Threatened, 21 Vulnerable, 348 Not Threatened and 1 Insufficiently Known. It is necessary to reinforce the studies on birds to define the occurrence of 58 species, and to evaluate the current situations of the species not recorded for more than three decades.

Keywords — Birds, updated list, occurrence, distribution, conservation status, Santiago del Estero.

INTRODUCCIÓN

La primera lista de aves de la provincia de Santiago del Estero fue publicada por Alvarez (1919). Posteriormente, Nores *et al.* (1991) sin considerar la primera lista por tener una cantidad considerable de errores, publicaron la segunda lista con 330 especies de aves, incluyendo información de distribución, residencia y abundancia de las especies. Para ello relevaron en diversos lugares de la provincia, con mayor esfuerzo en los Bañados de Figueroa y Sierra de Guasayán, complementando con bibliografía y consultas a las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), Fundación Miguel Lillo (FML), Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba (MZC) y Museo de La Plata (MLP).

En años recientes, De la Peña (2013) publicó la obra *Citas, observaciones y distribución de Aves Argentinas*, donde recopila los registros de aves de las provincias, pero sin abordar en detalle las actualizaciones de residencia, distribución y nuevas especies para cada provincia. Además, se omiten, al menos para Santiago del Estero, informes técnicos, tesis y observaciones personales de ornitólogos locales, como también páginas web especializadas sobre registros documentados. En el año 2016, dicha obra fue actualizada e incorporada a otra obra del mismo autor titulada *Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución*. La última actualización de la obra del 2016 corresponde a De la Peña (2020a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m).

Considerando que durante las últimas tres décadas se evidenciaron numerosos registros novedosos, resulta importante abordar una nueva lista de aves para la provincia de Santiago del Estero. Los objetivos de este trabajo fueron (i) actualizar la lista de especies de aves de Santiago del Estero y (ii) reportar el estado de conservación nacional de las especies de la provincia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La provincia de Santiago del Estero se ubica en el noroeste de Argentina (Fig. 1), formando parte del Gran Chaco Americano (TNC *et al.*, 2005). El clima corresponde al tipo DB'4da' (semiárido, con nulo o pequeño exceso de agua, mesotermal) (Boletta *et al.*, 1989). La temperatura media del mes más caliente (enero) es de 28 °C y del más frío (julio) de 16,3 °C. Las precipitaciones se concentran en el semestre cálido (octubre-marzo), con valores medios anuales que disminuyen gradualmente desde los 750 mm en la parte oriental a los 500 mm en la parte occidental (Minetti, 1999; Boletta, 2001). Fitogeográficamente pertenece al Distrito Chaqueño Occidental (Chaco Seco) de la Provincia Chaqueña, donde predominan los bosques xerófilos dominados por *Schinopsis lorentzii* y *Aspidosperma quebracho-blanco* (Cabrera, 1971). Además, en la Sierra de Guasayán se ubica un relicto de vegetación de selvas y bosques húmedos con presencia de plantas y aves propias de las Yungas y del Chaco Serrano (Giménez y Abraham, 1987; Nores y Cerana, 1990; Coria, 2014).

El Río Dulce y el Río Salado son los dos principales cursos de agua de Santiago del Estero. El primero ingresa por el centro-oeste de la provincia a través del Embalse de Río Hondo y recorre el territorio provincial en dirección sureste hasta la Laguna de Mar Chiquita (provincia de Córdoba). En su recorrido contribuye con el Dique Los Quiroga (límite interdepartamental Capital-Banda) y en el sureste con los Bañados del Río Dulce. Estos bañados inician en Los Telares (Pagot, 2003) continuando en dirección al curso del Río Dulce abarcando parte de los departamentos Salavina, Mitre, Quebrachos y Rivadavia. El Río Utis (un brazo del Río Dulce) que recorre principalmente los departamentos Salavina y Mitre también forma parte de estos bañados. Por su parte, el Río Salado ingresa a la provincia por el noroeste como límite interdepartamental Pellegrini-Copo, y con recorrido paralelo al Río Dulce, forma en su trayecto los Bañados de Figueroa (Dptos. Alberdi y Figueroa) y los Bañados de Añatuya (Dptos. General Taboada y Avellaneda) (Echevarria *et al.*, 2019).

Fuentes de registros de las aves

Este trabajo contempla sólo las fuentes que evidencian registros de las aves mediante avistamientos, escuchas, colectas, fotografías, grabaciones de audio y video. Estas fuentes corresponden a libros, artículos científicos, tesis, informes técnicos, colecciones de museos, páginas web y a las observaciones personales de los autores del presente artículo. Se recurrieron a las dos últimas fuentes mencionadas como complemento de la bibliografía. De las páginas web (eBird y EcoRegistros) se consideraron sólo los registros documentados.

Las subespecies fueron definidas en base a Nores *et al.* (1991), De la Peña (2020a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m), Avibase (<https://avibase.bsc-eoc.org>) y fuentes de los registros de las aves. Los nombres científicos de las especies siguen a Remsen *et al.* (2021).



Figura 1. Provincia de Santiago del Estero. Los Departamentos mencionados con palabras mayúsculas están delimitados con líneas punteadas, y sus localidades de cabecera indicadas con los círculos dobles. APC: Áreas Protegidas de Copo (unidad que integran el Parque Nacional Copo y sus áreas de amortiguamiento Parque Provincial Copo y Reserva Provincial Copo); BF: Bañados de Figueroa; BA: Bañados de Añatuya; LS: Lagunas Saladas; BRD: Bañados del Río Dulce; SA: Salinas de Ambargasta; SG: Sierra de Guasayán. Fuente del mapa: www.ar-map.com.ar, adaptado por Oscar R. Coria.

Figure 1. Santiago del Estero province. Departments mentioned in capital letters are delimited by dotted lines, and their head localities indicated by double circles. APC: Protected Areas of Copo (unit made up by Copo National Park and its buffer areas, Copo Provincial Park and Copo Provincial Reserve); BF: Bañados de Figueroa; BA: Bañados de Añatuya; LS: Lagunas Saladas; BRD: Bañados del Río Dulce; SA: Salinas de Ambargasta; SG: Sierra de Guasayán. Map source: www.ar-map.com.ar, adapted by Oscar R. Coria.

Residencia, distribución y estado de conservación

Los estatus de residencia fueron adaptados de Narosky e Yzurieta (2010) y López-Lanús (2020):

- **Residente.** Especie que se reproduce y está presente todo el año en Santiago del Estero.
- **Migrante estival reproductor.** Especie que nidifica en Argentina (primavera y verano) y migra hacia el norte en otoño-invierno. Contempla tanto a las especies que se ausentan del país, como a las que no se ausentan. Cuando una especie evidencia individuos que pueden quedar invernando en Santiago del Estero, su estatus se especifica como “*Migrante estival reproductor parcial*”.
- **Migrante estival no reproductor.** Especie que nidifica en el Hemisferio Norte y luego migra hasta Argentina donde se la encuentra principalmente en primavera y verano.
- **Migrante invernal del sur.** Especie que nidifica (primavera y verano) en el sur y/o centro de Argentina, y aparece en el norte del país en otoño-invierno.
- **Migrante invernal del oeste.** Especie que nidifica en los cordones montañosos y planicies de altura del oeste de Argentina, y en otoño-invierno evidencia desplazamientos hacia altitudes más bajas del país.
- **Migrante de paso.** Especie que nidifica (primavera y verano) en el oeste y/o centro y sur de Argentina, e invierten fuera del país, implicando que sólo estén de paso en la provincia con presencia a finales de la época estival cuando inician la migración, y en primavera cuando regresan.
- **Ocasional.** Especie con escasos registros en la provincia. Cuando una especie migrante es definida como ocasional para la provincia, se expresa primero el estatus y entre paréntesis el detalle de migración, por ejemplo: “ocasional (migrante invernal del sur)”.

Las especies migrantes fueron definidas en base a Nores *et al.* (1991), fuentes de los registros de aves de la provincia, y a Narosky e Yzurieta (2010), Caplonch (2018), López-Lanús (2020) y De la Peña (2020a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m). En cambio, para las especies residentes y ocasionales sólo se consideró a Nores *et al.* (1991) y las fuentes de registros.

La distribución de una especie se define por los lugares o zonas de registros (Apéndice 1) según lo disponible en las fuentes. Si una especie evidencia actualización de su distribución, primero se muestra lo determinado en la lista de 1991, que puede reforzarse con registros posteriores a 1991 y seguido se expresa “actualización de distribución” para especificar los nuevos lugares y zonas de registros.

Se reportan seis categorías del estado de conservación nacional según (MAyDS y AA, 2017): Insuficientemente Conocida, No Amenazada, Vulnerable, Amenazada, En Peligro y En Peligro Crítico.

Otros detalles de la lista de aves

Para cada especie se muestra la residencia (R), la distribución (D) y el estado de conservación nacional (C). Se indica con (SR) las especies que no tuvieron registros desde la lista de 1991 hasta la actualidad, y con (NSP) las especies nuevas que actualizan la presente lista, ya sea porque el primer registro para la provincia fue posterior a Nores *et al.* (1991), o porque fue anterior pero no incluida en la lista de 1991. Cuando una especie evidencia los dos aspectos anteriores se indica con (NSP-SR). Las nuevas subespecies de las especies de la lista de 1991 se identifican con (Nsubsp.).

En referencia a Nores *et al.* (1991), cuando se actualiza la residencia o se sugiere su replanteo expresándola como interrogante, se menciona primero la residencia actualizada o el interrogante, y seguido la residencia previa (R. previa) de 1991. Cuando una especie no presenta registros desde la lista de 1991 hasta la actualidad, se expresa, “requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual”, y además se especifica la “R. previa”, la distribución determinada hasta 1991 (D. previa) y el estado de conservación. Se incorporan registros de reproducción en las actualizaciones a residente, o cuando se determinan como residentes a especies que actualizan la presente lista de aves.

Para las observaciones personales, y cuando la residencia se define en este trabajo o aún no puede determinarse, se detalla el mes y año de los registros (e.g. Sept-2009) o la época del año según la información disponible (e.g. época estival; otoño). Al respecto, se siguen los siguientes formatos: dos o más meses en un mismo año (e.g. Sept-Oct-Dic-2010); un mismo mes en diferentes años (e.g. Ene-2010-2015); ídem para las combinaciones de épocas y años.

Nores *et al.* (1991) establecieron cinco categorías de abundancias en base a relevamientos sistemáticos en la provincia. Para las nuevas especies que se agregan a la presente lista, no es posible asignar tales categorías por no seguir los mismos registros sistematizados. En estos casos, así como para las especies que no tuvieron asignada una categoría en Nores *et al.* (1991), se especifica entre paréntesis el número de individuos de los registros si se dispone de tal información.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se determinó un total de 387 especies de aves, pertenecientes a 26 órdenes y 61 familias. La subespecie *Myiarchus tuberculifer tuberculifer* que se mencionó en la lista de 1991, no fue incluida en este trabajo por tratarse de un posible error de etiquetas en la colección FML (Nores *et al.*, 1991), lo cual se refuerza con la ausencia de registros de esta subespecie en Argentina (De la Peña, 2020i). Nores *et al.* (1991) en una sección aparte de la lista, muestran a ocho especies citadas sin mención de localidad considerándolas probablemente erróneas. De esas ocho especies se incorporaron cinco a la presente lista, porque tuvieron nuevos registros para la provincia: *Antrostomus rufus rutilus*, *Piculus chrysochloros chrysochloros*, *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis*, *Cacicus chrysopterus* y *Gnorimopsar chopi chopi*. Las tres especies restantes fueron excluidas: *Penelope obscura*, *Falco rufigularis* y *Psittacara leucophthalmus*.

Nores *et al.* (1991) mencionan un total de 330 especies para la provincia, sin embargo, en la lista figuran 332 especies de aves. Entonces, considerando la exclusión de *M. tuberculifer tuberculifer* y la incorporación de las cinco especies mencionadas en el párrafo anterior, la presente lista incorporó 51 especies nuevas en referencia a las menciones de Nores *et al.* (1991). También se actualizó la residencia de 13 especies, la distribución de 112 especies, y tanto la residencia como la distribución de 50 especies. Se determinaron 188 especies residentes, 45 migrantes estivales reproductoras, 19 migrantes estivales no reproductoras, 18 migrantes invernales, 2 migrantes de paso y 57 ocasionales. No se pudieron establecer las residencias de 58 especies.

Se definieron como migrantes de paso a *Elaenia albiceps chilensis*, *E. albiceps albiceps* y *Turdus nigriceps nigriceps*. La primera después de nidificar en el sur de Argentina, cruza la región chaqueña argentina (una de sus rutas migratorias) para invernar fuera del país (Bravo *et al.*, 2017). Por lo tanto, el registro de octubre en Sierra de Guasayán corresponde a los desplazamientos de su regreso al sur de Argentina. Lo mismo ocurre con *E. albiceps albiceps* que nidifica en las Yungas (Caplonch y Lobo 2005), y con *T. nigriceps nigriceps* que nidifica en las Yungas y en el Chaco Serrano de Córdoba (Caplonch *et al.*, 2008). Posiblemente *Knipolegus hudsoni* también sea migrante de paso, considerando que su área de invernada estaría en Paraguay, Brasil y Bolivia (Brace *et al.*, 1996; De la Peña, 2020i). También algunas migrantes estivales que al arribar al país se distribuyen principalmente en el sur y costas del mar (López-Lanús, 2020), pero requieren de estudios específicos.

Los registros escasos para el 63% de las especies ocasionales, se deberían a que la provincia no forma parte principal de sus distribuciones, por ejemplo: *Piaya cayana mogensenii*, *Polytmus guainumbi thaumantias*, *Hylocharis sapphirina*, *Mustelirallus erythrops olivascens*, *Vultur gryphus*, *Chondrohierax uncinatus uncinatus*, *Busarellus nigricollis leucocephalus*, *Asio stygius barberoi*, *Pionus maximiliani* subsp., *Casiornis rufus*, *Myiarchus ferox australis*, *Xolmis velatus*, *Leistes loyca* subsp., *Cacicus chrysopterus*, *Hemithraupis guira* subsp., *Poospiza nigrorufa* y *Tachyphonus rufus* (Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2020). En cambio, para las especies ocasionales que sí están mapeadas para la provincia, podría deberse a la escasez de estudios y monitoreos que no permite detectarlas regularmente (p. ej. *Porphyrio martinica*, *Aramides ypecaha*, *Gallinago paraguaiae paraguaiae*, *Pseudocolopteryx flavigularis*, *Sporophila hypoxantha*, *Sporophila ruficollis*), lo cual se acentúa para las aves en disminución (p. ej. *Cairina moschata*) y naturalmente escasas (p. ej. *Theristicus caerulescens*, *Circus cinereus*) (López-Lanús, 2020).

Los estados de conservación nacional de las especies evidenciaron 1 especie En Peligro Crítico (*Calidris canutus*), 4 especies En Peligro (*Buteogallus coronatus*, *Eleothreptus anomalus*, *Alectrurus risora* y *Gubernatrix cristata*), 7 especies Amenazadas (*Eudromia formosa formosa*, *Cairina moschata*, *Sarkidiornis sylvicola sylvicola*, *Phoenicoparrus andinus*, *Vultur gryphus*, *Dryocopus schulzi* y *Amazona aestiva xanthopteryx*), 21 especies Vulnerables, 348 especies No Amenazadas y 1 Insuficientemente Conocida (*Cypseloides rothschildi*) (MAyDS y AA, 2017). No fueron evaluadas tres especies exóticas (*Columba livia*, *Sturnus vulgaris* y *Passer domesticus*), *Hylocharis sapphirina* por presencia dudosa en el país y *Xolmis velatus* por no pertenecer en ese momento a la avifauna argentina (Wionczak *et al.*, 2018).

Un total de 17 especies fueron registradas por última vez durante las décadas anteriores a la publicación de Nores *et al.* (1991). De ellas, cuatro tuvieron el último registro publicado en la provincia hace más de 50 años desde la actualidad: *Alectrurus risora* (Hartert y Venturi, 1909; Pereyra, 1938), *Polypterus pectoralis* (Zotta, 1939), *Bottaerus pinnatus pinnatus* (Olrog, 1959) y *Gubernatrix cristata* Nov-1963 (1) (colección FML) (Nores *et al.*, 1991). En la provincia, de acuerdo con la definición de extinción (MAYDS y AA, 2017), *A. risora* estaría extinta (Di Giacomo y Di Giacomo, 2004) y las otras tres especies requieren de las prospecciones pertinentes.

Estudios sobre biología reproductiva son escasos en la provincia, lo cual explicaría en parte la falta de registros de reproducción de las especies que no pudieron ser definidas como residentes en este trabajo, y que muy probablemente lo sean, por ejemplo: *Rhynchosciurus rufescens pallescens*, *Nothura maculosa pallida*, *Laterallus melanophaius melanophaius*, *Anhinga anhinga anhinga*, *Buteogallus meridionalis*, *Turdus chiguanco anthracinus*, *Rhynchospiza strigiceps strigiceps*, *Rhynchospiza strigiceps strigiceps*, *Ammodramus humeralis xanthornus* y *Sicalis luteola luteiventris*.

Las residencias sin determinar, servirán de referencia para futuras publicaciones sobre registros de aves que contribuyan a definirlas. Es probable que, con el incremento de estudios, especies ocasionales se redefinan como residentes, algunas migrantes dejen de considerarse ocasionales, y que se definan más especies como migrantes de paso tanto de las que nidifican en Argentina e invierten fuera del país, como de las migrantes estivales. Por último, es importante abordar estudios focalizados para evaluar las situaciones actuales de las especies que no se registran desde hace más de tres décadas en la provincia.

Lista de especies

RHEIFORMES

RHEIDAE

Rhea americana albescens (Nandú)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b).

C. Vulnerable.

TINAMIFORMES

TINAMIDAE

Crypturellus tataupa tataupa (Tataupá común)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017; Lobo Allende y Caplonch, 2016).

C. No Amenazada.

Rhynchosciurus rufescens pallescens (Colorada) ^(NSP)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción.
D. Pozo Hondo y Lagunas Saladas (Lobo Allende y Caplonch, 2016; Heredia, 2011).
¿Sierra de Guasayán?: *Rhynchosciurus* sp. Feb-2011 (1) (Coria y Heredia, 2012).
C. No Amenazada.

Nothoprocta cinerascens cinerascens (Inambú montaraz)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2015a, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Nothoprocta pentlandii pentlandii (Inambú silbón)

- R.** Residente.
D. Sierra de Guasayán (Nores e Yzurieta, 1981; Nores et al., 1991; Coria et al., 2017). Actualización de distribución: Pozo Hondo (Soria et al., 2012). Posible presencia en barrancas que rodean el Dique Los Quiroga (JL Navarro obs. pers.).
C. No Amenazada.

Nothura darwinii salvadorii (Inambú pálido)

- R.** Residente.
D. Oeste de la provincia, límite poco conocido (Nores et al., 1991): El Mangrullo, Sierra de Guasayán, Pozo Hondo (Aparicio et al., 2008; Lobo Allende y Caplonch, 2016; Coria et al., 2017) y Taboada Ago-2012 (OB Quiroga obs. pers.). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011).
C. No Amenazada.

Nothura maculosa pallida (Inambú común)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.
D. Cerca de Icaño, Bañados de Figueroa May-1952 (1) y May-1961 (colección FML), y Áreas Protegidas de Copo Jul-1983 (8-10) y Oct-2012 (6) (Menegaux, 1925; Nores et al., 1991, Coria, 2012b). Actualización de distribución: El Mangrullo, Lagunas Saladas, Pozo Hondo, Campo F. Cantos - INTA Nov-Dic-2014 (11), Sierra de Guasayán (Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Lobo Allende y Caplonch, 2016; Coria et al., 2016, 2017) y Puesto el Saladillo Jul-2014 (1) (OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

Eudromia elegans magnistriata (Martineta común)

- R.** Residente.
D. Mitad sur de la provincia (Navas y Bó, 1981; Nores et al., 1991; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Caplonch y Lobo Allende, 2013; Salvador y Di Giacomo, 2014; Coria et al., 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Eudromia formosa formosa* (Martineta chaqueña)*R.** Residente.**D.** Mitad norte de la provincia (Navas y Bó 1981; Nores *et al.*, 1991; Soria *et al.*, 2012; Caplonch y Lobo Allende, 2013; Lobo Allende y Caplonch, 2016; Navarro, 2017a; Neme, 2019).**C.** Amenazada.**ANSERIFORMES****ANHIMIDAE*****Chauna torquata* (Chajá)****R.** Residente.**D.** Bañados de Figueroa, Bañados del Río Dulce y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011), Los Corbalanes Feb-2012, Áreas Protegidas de Copo Jun-2015 y Dique Los Quiroga Nov-2020 (JL Navarro, OR Coria y J Lima obs. pers.).**C.** No Amenazada.**ANATIDAE****Dendrocygninae*****Dendrocygna bicolor* (Sirirí colorado)****R.** Residente.**D.** Bañados de Figueroa, Bañados del Río Dulce y Bañados de Añatuya (Olrog, 1953; Nores *et al.*, 1991; Quiroga *et al.*, 2017; Echevarria *et al.*, 2019). Actualización de distribución: Lagunas Saladas y Dique Los Quiroga (Heredia, 2011; Quiroga *et al.*, 2017).**C.** No Amenazada.***Dendrocygna viduata* (Sirirí pampa)****R.** Residente.**D.** Alrededores de Icaño, Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Selva, Lagunas Saladas, Laguna de Cuyoj, Isla Tara Inti, Los Corbalanes (Heredia, 2011; Quiroga *et al.*, 2017; De la Peña, 2020a) y Dique Los Quiroga Sept-2016 y Jul-2018 (JL Navarro obs. pers.).**C.** No Amenazada.***Dendrocygna autumnalis autumnalis* (Sirirí de vientre negro)****R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.**D.** Bañados de Figueroa Mar-1952 (6) (Olrog, 1953), cita mencionada en Nores *et al.* (1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Río Utis (Bañados del Río Dulce) Mar-1997 (2) y Nov-2001 (70), Laguna de Cuyoj Nov-2012 (2) y Áreas Protegidas de Copo Dic-2015 (2) (Torres y Michelutti, 2001b; Michelutti y Torres, 2006; Heredia, 2011; Coles, 2015a; Quiroga *et al.*, 2017; De la Peña, 2020a).**C.** No Amenazada.

Anatinae***Cygnus melancoryphus* (Cisne de cuello negro)**

- R.** Residente. R. previa: no determinada.
D. Bañados de Figueroa (Olrog, 1953). Bañados del Río Dulce Ago-1979 (3) (R Miattello com. pers. en Nores *et al.* (1991)), Oct-1998 (1), Ene-1999 (17), Ago-1999 (3) y Feb-2000 (37) (Torres y Michelutti, 2001b). Actualización de distribución: Lagunas Saladas y Dique Los Quiroga Dic-2019 (2) (registro de reproducción) (Heredia, 2011; Navarro, 2019a).
C. No Amenazada.

***Coscoroba coscoroba* (Coscoroba)**

- R.** Residente. R. previa: visitante invernal.
D. Bañados de Río Dulce, Bañados de Figueroa y Laguna de J. Cruz en épocas invernales (Nores *et al.*, 1991). Torres y Michelutti (2001b) en Bañados del Río Dulce registraron: Mar-1997 (3), Oct-1998 (2500) (cerca de un centenar eran pichones no voladores), Ene-1999 (41), Ago-1999 (555), Jul-2000 (10) y Ene-2001 (3); nidos en el noreste de los bañados. Actualización de distribución: Selva Ene-1977, Lagunas Saladas y Salinas de Huyamampa Ago-2017 (31) (Heredia, 2011; Navarro, 2017b; De la Peña, 2020a).
C. No Amenazada.

***Cairina moschata* (Pato real)**

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
D. Río Salado cerca de Icaño (Menegaux, 1925). Bañados de Figueroa Jul-1980 (1) y durante visitas desde febrero a mayo de 1952 sin especificar el mes de registro (Olrog, 1953; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: cerca de Garza Ago-2017 (1) (Masuzzo, 2019).
C. Amenazada.

***Sarkidiornis sylvicola sylvicola* (Pato crestudo)**

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.
D. Cerca de Icaño (Menegaux, 1925), y Bañados de Figueroa durante visitas desde febrero a mayo de 1952 sin especificar el mes de registro (Olrog, 1953), ambas citas en Nores *et al.* (1991). Actualización de distribución: Bañados del Río Dulce (Paso de la Cina Ene-1997 y Paso de Oscares May-2016 (2) adultos), Lagunas Saladas, Sumampa May-2016 (2) adultos, Laguna de Pampa Mayo Feb-2017 (1) adulto, cerca de Garza Feb-2018 (2) adultos y Dique Los Quiroga Oct-2020 (8) (Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Carmona, 2016a; Vivas, 2017a; Teran, 2018; Navarro, 2020a; Quiroga *et al.*, 2020).
C. Amenazada.

***Callonetta leucophrys* (Pato de collar)**

- R.** Residente.

D. Toda la provincia, especialmente en Bañados de Figueroa, Bañados de Añatuya y Bañados del Río Dulce (Olrog, 1953; Lucero, 1982; Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a).

C. No Amenazada.

***Amazonetta brasiliensis ipecutiri* (Pato cutirí)**

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: visitante invernal.

D. Puesto el Saladillo en invierno, y Bañados del Río Dulce época invernal y verano-1998 (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001b). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Río Dulce (ciudad de Santiago del Estero) verano-otoño-2012 e Isla Tara Inti invierno-2012 (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001b; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a).

C. No Amenazada.

***Spatula versicolor versicolor* (Pato capuchino)**

R. Residente.

D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Olrog, 1953; Lucero, 1982; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Isla Tara Inti, Dique Los Quiroga, Lagunas Saladas y Laguna de Cuyo (Heredia, 2011; Coria, 2012a; Navarro, 2016a, 2019b).

C. No Amenazada.

***Spatula platalea* (Pato cuchara)**

R. Residente.

D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Olrog, 1953; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Selva y Lagunas Saladas (Heredia, 2011; De la Peña, 2020a).

C. No Amenazada.

***Spatula discors* (Pato media luna)**

R. Ocasional (migrante estival no reproductor).

D. Bañados de Figueroa Jul-1980 (1) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados de Añatuya Jul-1992 (1) macho y (3) posibles hembras, Lagunas Saladas y Dique Los Quiroga Sept-2018 (2) (Sferco y Baldo, 1995; Heredia, 2011; Navarro, 2018a).

C. No Amenazada.

***Spatula cyanoptera cyanoptera* (Pato colorado)**

R. Residente.

D. Cerca de Icaño, Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Isla Tara Inti, Dique Los Quiroga (Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2013; Navarro, 2018b) y Laguna de Cuyo Nov-2012 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Mareca sibilatrix* (Pato overo)**

- R.** Residente en el extremo sureste y **?**migrante invernal hacia el centro de la provincia?
D. Bañados del Río Dulce permanente y Bañados de Figueroa Jul-1967 (1) (colección FML) y Jul-2014 (3) (Nores et al., 1991; Quiroga, 2019).
C. No Amenazada.

***Anas bahamensis rubrirostris* (Pato gargantilla)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Olrog, 1953, 1965; Lucero, 1982; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Los Corbalanes, Dique Los Quiroga, Laguna de Cuyo y Salinas de Huyamampa (Heredia, 2011; Navarro, 2016b, c, d, e).
C. No Amenazada.

***Anas flavirostris flavirostris* (Pato barcino)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Olrog, 1953; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Dique Los Quiroga y Los Corbalanes (Heredia, 2011; Navarro, 2017c, 2018c).
C. No Amenazada.

***Anas georgica spinicauda* (Pato maicero)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Olrog, 1953; Lucero, 1982; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Isla Tara Inti, Los Corbalanes, Dique Los Quiroga y Laguna de Cuyo (Heredia, 2011; Coria 2012a; Navarro, 2017d, 2018d, e).
C. No Amenazada.

***Netta peposaca* (Pato picazo)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Olrog, 1953; Lucero, 1982; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Isla Tara Inti, Dique Los Quiroga y Lagunas Saladas (Heredia, 2011; Coria, 2012a; Navarro, 2018f).
C. No Amenazada.

***Heteronetta atricapilla* (Pato de cabeza negra)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Olrog, 1953, 1965; Weller, 1967; Lucero, 1982; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Bañados de Añatuya, Selva, Laguna de Cuyo, Malbrán, Dique Los Quiroga y Lagunas Saladas (Heredia, 2011; Navarro, 2016f; Aguilan, 2018a; Bareiro Guiñazú, 2019a; De la Peña, 2020a).
C. No Amenazada.

***Nomonyx dominicus* (Pato fierro)**

- R.** Residente. R. previa: no determinada.
D. Bañados de Figueroa May-1963 (1) hembra con (3) pichones (Olrog, 1965), cita mencionada en Nores *et al.* (1991). Actualización de distribución: Bañados del Río Dulce Ago-1998 (38), Dique Los Quiroga Ene-2019 (2) (Michelutti y Torres, 2006; Bareiro Guiñazú, 2019b) y Los Corbalanes Dic-2016 (1) (JL Navarro y OB Quiroga obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Oxyura vittata* (Pato zambullidor chico)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Olrog, 1953; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Dique Los Quiroga, Laguna de Cuyoj y Lagunas Saladas (Heredia, 2011; Navarro, 2015a; Andina, 2017a).
C. No Amenazada.

GALLIFORMES

CRACIDAE

***Ortalis canicollis canicollis* (Charata)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017; Echevarría *et al.*, 2019).
C. No Amenazada.

PHOENICOPTERIFORMES

PHOENICOPTERIDAE

***Phoenicopterus chilensis* (Flamenco austral)**

- R.** Residente. R. previa: ¿permanente?
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Muñiz, 2013; Andina, 2014a; Navarro, 2015b, 2017e). Nidifica en la provincia (De la Peña, 2020b).
C. Vulnerable.

***Phoenicoparrus andinus* (Parina grande)**

- R.** Migrante invernal del oeste.
D. Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Lagunas Saladas y Dique Los Quiroga (Heredia, 2011; Navarro, 2015c).
C. Amenazada.

PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE

Rollandia rolland chilensis (Macá común)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

Tachybaptus dominicus brachyrhynchus (Macá gris)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.

D. Bañados de Figueroa Oct-1981 (1) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados del Río Dulce May-2003 (10), Laguna de Cuyo Abr-2016 (2) y Áreas Protegidas de Copo Dic-2018 (3) (Michelutti y Torres, 2006; Coles, 2015b; Navarro, 2016g).

C. No Amenazada.

Podilymbus podiceps antarcticus (Macá pico grueso)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

Podiceps major major (Macá grande)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a).

C. No Amenazada.

Podiceps occipitalis occipitalis (Macá plateado)

R. Residente. R. previa: no determinada.

D. Embalse de Río Hondo Feb-1983 (30) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Laguna de Cuyo Ene-2014 (7), Mar-2014 (5) y Abr-2017 (3) (registro de reproducción) (Quiroga y Llugdar, 2015; Navarro, 2017f).

C. No Amenazada.

Podiceps occipitalis juninensis (Macá plateado) ^(Nsubsp.)

R. Ocasional (migrante invernal del oeste).

D. Paso de la Cina (Bañados del Río Dulce) Ago-1999 (25) (Michelutti y Torres, 2006).

C. Vulnerable.

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Columbinae

Columba livia livia (Paloma doméstica)

R. Residente.

D. Toda la provincia, introducida desde Europa (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017).

C. No Evaluada.

Patagioenas picazuro picazuro (Paloma picazuró)

R. Residente.

D. Norte de la provincia, Sierra de Guasayán y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2017). Actualización de distribución: El Mangrullo, Campo F. Canto e Isla Tara Inti (Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Coria, 2012a).

C. No Amenazada.

Patagioenas maculosa maculosa (Paloma manchada)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Leptotila verreauxi decipiens (Yerutí común)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Leptotila megalura (Yerutí yungueña) ^(NSP)

R. Ocasional.

D. Sierra de Guasayán Feb-2003 (1) (Ferrari *et al.*, 2004).

C. No Amenazada.

Zenaida auriculata chrysauchenia (Torcaza)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

Claravinae

Columbina talpacoti talpacoti (Torcacita colorada)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: visitante invernal.
D. Bañados del Río Dulce época invernal (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Sachayoj Feb-1992 y Estancia Los Prados Abr-2017 (Salvador y Eroles, 1994; Heredia, 2011; Capellino, 2017a).
C. No Amenazada.

Columbina picui picui (Torcacita común)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).
C. No Amenazada.

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Crotophaginae

Guira guira (Pirincho)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).
C. No Amenazada.

Crotophaga major (Anó grande)

- R.** Ocasional.
D. Icaño (Menegaux, 1925), citado en Norés *et al.* (1991). Actualización de distribución: Pampa de los Guanacos Ene-2017 (1) (Campos, 2017).
C. No Amenazada.

Crotophaga ani (Anó chico)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017).
C. No Amenazada.

Neomorphinae

Tapera naevia naevia (Crespín)

- R.** Migrante estival reproductor.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Cuculinae

Coccycua cinerea (Cuclillo chico)

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Codesido y Bilenca, 2004).

C. No Amenazada.

Piaya cayana mogensenii (Tingazú)

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Río Urueña en el límite con Tucumán y Salta Oct-1981 (3) (Nores *et al.*, 1991).

Actualización de distribución: Sierra de Guasayán Jul-2011 (1) (Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

***Piaya cayana* subsp. (Tingazú).** Áreas Protegidas de Copo Sept-2020 (1) (registro documentado en video por el Guardaparque Daniel Carrizo y compartido con el COA Kakuy). Esta subespecie podría tratarse de *P. cayana macroura* por su cercanía al Chaco donde fue citada (De la Peña, 2020f).

Coccyzus melacoryphus (Cuclillo canela)

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Coccyzus americanus americanus (Cuclillo de pico amarillo)

R. Migrante estival no reproductor.

D. Pampa de Los Guanacos Abr-1956 (1) (colección FML) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991, Campo F. Cantos - INTA Mar-1997-1998 y Villa Robles Mar-2011 (1) (López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Quiroga *et al.*, 2020).

C. No Amenazada.

NYCTIBIIFORMES

NYCTIBIIDAE

Nyctibius griseus griseus (Kakuy o Urutaú común)

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: no determinada.

D. Actualización de distribución: toda la provincia. Registros principalmente en la época estival con reproducción en 15 departamentos (Menegaux, 1925; Noras *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Gómez, 2011e; Heredia, 2011; Navarro, 2016h; Coria *et al.*, 2017; Vivas, 2017b; Quiroga y Llugdar, 2019b). Campo F. Cantos - INTA Dic-2009 (1) y ciudad de Santiago del Estero Jun-2015 (1) y Abr-2019 (1) (OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE

Chordeiles nacunda nacunda (Ñacundá)

- R.** Migrante estival reproductor. R. previa: permanente.
D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Coria, 2012b; Coria et al., 2017; Navarro, 2017g).
C. No Amenazada.

Chordeiles minor chapmani (Añapero boreal)

- R.** Ocasional (migrante estival no reproductor). R. previa: no determinada.
D. Isca Yacú (Oberholser en Steullet y Deautier (1935, 1946)), cita mencionada en Nores et al. (1991). Oberholser determinó esta subespecie para Isca Yacú, en base a la examinación de individuos colectados en el lugar.
C. No Amenazada.

Chordeiles minor minor (Añapero boreal)

- R.** Ocasional (migrante estival no reproductor). R. previa: no determinada.
D. Isca Yacú (Oberholser en Steullet y Deautier (1935, 1946)) y en colección FML (2) (Nores et al., 1991). Oberholser determinó esta subespecie para Isca Yacú, en base a la examinación de individuos colectados en el lugar.
C. No Amenazada.

***Chordeiles minor* subsp. (Añapero boreal).** Sierra de Guasayán Dic-2015 (1) (Navarro, 2015d). Se trata de alguna de las dos subespecies anteriores (De la Peña, 2020f).

Systellura longirostris patagonicus (Atajacaminos ñañarca)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada. Esta subespecie en Argentina es migrante desde el sur-centro hacia el norte, y en los mapas, Santiago del Estero es el límite de su distribución como residente (Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2020; De la Peña, 2020f), lo cual podría explicar los registros en la época estival en el suroeste de la provincia.
D. Cerca de Icaño y Bañados de Figueroa Jul-1980 (1) (Menegaux, 1925; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: cerca de Quimilí Sept-2003 (1) y Sierra de Guasayán Ene-2010 (1) (Capllonch et al., 2015; Coria et al., 2017).
C. No Amenazada.

Systellura longirostris bifasciatus (Atajacaminos ñañarca)^(Nsubsp.)

- R.** ¿Migrante invernal del oeste?
D. Cerca del Río Utis (Bañados del Río Dulce) Ago-Nov-2012 (2) (Capllonch et al., 2015).
C. No Amenazada.

***Systellura longirostris* subsp. (Atajacaminos ñañarca).** El Mangrullo, Lagunas Saladas, ciudad de Santiago del Estero Feb-2012 y Sumampa Ene-2020 (1) (Aparicio

et al., 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a; Eguia, 2020). Los registros en época estival podrían tratarse de “*S. longirostris patagonicus*” por lo explicado anteriormente para esta subespecie.

***Eleothreptus anomalus* (Atajacaminos de alas negras)**

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
- D.** Colonia Dora (reproducción en noviembre sin dato del año) y cercanías del Embalse de Río Hondo Sept-1976 (1) (Pereyra, 1950; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011).
- C.** En Peligro.

***Setopagis parvula* (Atajacaminos chico)**

- R.** Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.
- D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2017).
- C.** No Amenazada.

***Hydropsalis torquata furcifera* (Atajacaminos tijereta)**

- R.** Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.
- D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Capellino, 2017d, e; Coria *et al.*, 2017; Quiroga y Navarro, 2020).
- C.** No Amenazada.

***Antrostomus rufus rutilus* (Atajacaminos colorado)**

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
- D.** Sin mención de localidad por Olrog (1959) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: La Bajada Oct-2015 (1) (Navarro, 2015e) y cerca de Averias Nov-Dic-2011 (2) (J Heredia obs. pers.).
- C.** No Amenazada.

APODIFORMES

APODIDAE

***Cypseloides rothschildi* (Vencejo pardo)**

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
- D.** Termas de Río Hondo Nov-1929 (5) (colección FML) y Sierra de Guasayán Nov-1981 (40-50) y Feb-2011 (3) (Nores *et al.*, 1991; Coria y Heredia, 2012).
- C.** Insuficientemente Conocida.

***Streptoprocne zonaris zonaris* (Vencejo de collar)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

- R. previa.** No determinada.
- D. previa.** Una bandada en invierno sobre la Ruta Nacional N° 9 (sur de la provin-

cia), sin mención de localidad (Nores *et al.*, 1991). Actualmente en Argentina se la mapea para Misiones y Corrientes (De la Peña, 2020f).

C. No Amenazada.

***Streptoprocne zonaris* subsp.** (Vencejo de collar). Lagunas Saladas, Sierra de Guasayán Jun-2011 y La Banda Nov-2015 (11) (Heredia, 2011; Quiroga *et al.*, 2016; Coria *et al.*, 2017). Posiblemente se trate de la subespecie *S. zonaris kuenzeli*, por estar citada para provincias colindantes al oeste y sur de Santiago del Estero (De la Peña, 2020f).

***Chaetura meridionalis* (Vencejo de tormenta)**

R. Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.

D. Suncho Corral Sept-1905 (1) (colección MACN), Isca Yacú Ene-1906 (1) (colección FML) y 10 Km al noreste de Los Tigres Nov-1986 (2) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: 5 km al norte de Sachayoj Feb-1992 (8), Sierra de Guasayán Nov-2001 (bandada) y ciudad de Santiago del Estero Oct-2011 (15) (Salvador y Eroles, 1994; Quiroga *et al.*, 2016).

C. No Amenazada.

TROCHILIDAE

Trochilinae

***Polytmus guainumbi thaumantias* (Picaflor de antifaz) ^(NSP)**

R. Ocasional.

D. Límite interprovincial con Santa Fe (Dpto. General Taboada) Feb-2006 (1) (Luna y Manassero, 2008).

C. Vulnerable.

***Sappho sparganurus sapho* (Picaflor cometa)**

R. Migrante invernal del oeste.

D. Sierra de Guasayán, Sierra de Ambargasta y llanuras del sur de la provincia (Nores e Yzurieta, 1981; Norés *et al.*, 1991; Quiroga *et al.*, 2016; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

***Heliomaster furcifer* (Picaflor de barbijo)**

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Chlorostilbon lucidus lucidus* (Picaflor común)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Leucochloris albicollis (Picaflor de garganta blanca) ^(NSP-SR)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Sachayoj Dic-1987 (SA Salvador y L Salvador obs. pers. en De la Peña (2020f) y Abril (sin información del año) (1) (Salvador y Di Giacomo, 2014).

C. No Amenazada.

Hylocharis sapphirina (Picaflor de cola castaña) ^(NSP)

R. Ocasional.

D. Los Gallegos Ene-2014 (1) (Quiroga *et al.*, 2016).

C. No Evaluada.

Hylocharis chrysura chrysura (Picaflor bronceado)

R. Migrante estival reproductor.

D. Mitad norte de la provincia especialmente en Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: en la mitad sur en Lagunas Saladas, El Mangrullo, Sierra de Guasayán (Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017) y Los Gallegos Ene-2013 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Elliotomyia chionogaster hypoleuca (Picaflor de vientre blanco)

R. Migrante estival reproductor.

D. Sierra de Guasayán (Nores *et al.*, 1991; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

GRUIFORMES

ARAMIDAE

Aramus guarauna guarauna (Carau)

R. Residente.

D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa, y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Dique Los Quiroga, Los Corbalanes (Heredia, 2011; Navarro, 2016i, 2017h) y Beltrán Abr-2011 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

RALLIDAE

Porphyrio martinica (Pollona azul)

R. Ocasional (migrante estival reproductor).

D. Sin mención de localidad por Hartert y Venturi (1909) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados de Añatuya Feb-1992 (1) adulto (Salvador y Eroles, 1994).

C. No Amenazada.

Laterallus melanophaius melanophaius (Burrito común)^(NSP)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción.

D. Isla Tara Inti y alrededores Oct-2011 (1), Jun-2013 (2) y Ago-2013 (5), Bañados de Figueroa Jul-2014 (1) y Dique Los Quiroga Feb-2021 (1) (Quiroga *et al.*, 2015; Navarro, 2021a).

C. No Amenazada.

Mustelirallus erythrops olivascens (Burrito de pico rojo)^(NSP)

R. Ocasional.

D. Ciudad de Santiago del Estero Dic-2016 (1) (Quiroga, 2017).

C. No Amenazada.

Pardirallus maculatus maculatus (Gallineta overa)

R. Residente.

D. Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Vivas, 2016). Actualización de distribución: Sumampa (Carmona, 2016b).

C. No Amenazada.

Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus (Gallineta común)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a).

C. No Amenazada.

Aramides ypecaha (Ipacaá)^(NSP)

R. Ocasional.

D. 5 Km al sur de Tobas Feb-1992 (1) (Salvador y Eroles, 1994).

C. No Amenazada.

Aramides cajaneus cajaneus (Chiricote)

R. Residente.

D. Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: 5 Km al sur de Tobas, Lagunas Saladas, Forres, Los Arias, Maco, Los Corbalanes, El Tramo 20, Termas de Río Hondo (Salvador y Eroles, 1994; Heredia, 2011; Quiroga, 2014a; Andina, 2015a) y Dique Los Quiroga Feb-2015 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Porphyriops melanops melanops (Pollona pintada)

R. Residente.

D. Bañados de Figueroa, Bañados de Añatuya y Bañados del Río Dulce (Olrog, 1965;

Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Laguna de Cuyoj y Termas de Río Hondo (Heredia, 2011; Navarro, 2017i; Enggist, 2018a).

C. No Amenazada.

***Gallinula galeata galeata* (Pollona negra)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

***Fulica armillata* (Gallareta de ligas rojas)**

R. Residente. R. previa: ¿permanente?

D. Bañados del Río Dulce principalmente en invierno, Bañados de Figueroa ocasional y Dpto. Jiménez Abr-1956 (3) (colección FML) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Termas de Río Hondo Ene-2011 y Jun-Jul-2012, Laguna de Cuyoj May-2018 y Dique Los Quiroga Mar-Oct-2016 y Oct-2018 (registro de reproducción) (Gómez, 2011c; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Navarro, 2016j, k, 2018h, i).

C. No Amenazada.

***Fulica rufifrons* (Gallareta de escudete rojo)**

R. Residente. R. previa: ¿permanente?

D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, alrededores de Isla Tara Inti Jun-Jul-2012 y Oct-2018, y Dique Los Quiroga Ene-2016 (registro de reproducción) y Abr-2017 (Heredia, 2011; Coria, 2012a; Navarro, 2016l, 2017j; Enggist, 2018b).

C. No Amenazada.

***Fulica leucoptera* (Gallareta chica)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

CHARADRIIFORMES

Charadrii

CHARADRIIDAE

***Pluvialis dominica* (Chorlo pampa)**

R. Migrante estival no reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011).

C. No Amenazada.

Vanellus chilensis lampronotus* (Tero común)*R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores et al., 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a, 2016, 2017; Echevarria et al., 2019).**C.** No Amenazada.***Charadrius modestus* (Chorlito de pecho canela)****R.** Migrante invernal del sur.**D.** Bañados del Río Dulce (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011).**C.** No Amenazada.***Charadrius semipalmatus* (Chorlito palmado)^(NSP)****R.** Migrante estival no reproductor.**D.** Bañados del Río Dulce, Lagunas Saladas (Torres y Michelutti 2006; Heredia, 2011), Sauce Bajada Ene-2012 (1), Los Corbalanes Abr-2012 (2) y Laguna de Cuyoj May-2015 (3) (OB Quiroga obs. pers.).**C.** No Amenazada.***Charadrius collaris* (Chorlito de collar)****R.** Residente.**D.** Toda la provincia, principalmente en Bañados del Río Dulce (Nores et al., 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Echevarria et al., 2019).**C.** No Amenazada.***Charadrius falklandicus* (Chorlito de doble collar)****R.** Residente.**D.** Bañados del Río Dulce (Nores et al., 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011).**C.** No Amenazada.**RECURVIROSTRIDAE*****Himantopus mexicanus melanurus* (Tero real)****R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores et al., 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a; Echevarria et al., 2019).**C.** No Amenazada.

Scolopaci

SCOLOPACIDAE

Numeniinae

***Bartramia longicauda* (Batitú)**

- R.** Migrante estival no reproductor. Algunos individuos pueden persistir hasta el otoño en la provincia.
D. Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Laguna de Cuyoj, La Banda y Estancia Los Prados (Heredia, 2011; Quiroga *et al.*, 2016; Capellino, 2017b).
C. Vulnerable.

Limosinae

***Limosa haemastica* (Becasa de mar)**

- R.** Migrante estival no reproductor. Algunos individuos pueden persistir todo el año en la provincia.
D. Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2006; Eguia, 2019). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011).
C. No Amenazada.

Arenariinae

***Calidris canutus rufa* (Playero rojizo) ^(NSP-SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

- R. previa.** No determinada.
D. previa. Paso de la Cina (Bañados del Río Dulce) Abr-1986 (3) (Torres y Michelutti, 2001b).
C. En Peligro Crítico.

***Calidris himantopus* (Playero zancudo)**

- R.** Migrante estival no reproductor.
D. Bañados del Río Dulce, cerca de Icaño y Nueva Esperanza (Menegaux, 1925; Norres *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Los Corbalanes (Navarro, 2016m).
C. No Amenazada.

***Calidris bairdii* (Playerito unicolor)**

- R.** Migrante estival no reproductor.
D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas y Estancia Los Prados (Heredia, 2011; Capellino, 2018a).
C. No Amenazada.

***Calidris fuscicollis* (Playerito de rabadilla blanca)**

- R.** Migrante estival no reproductor. Algunos individuos pueden persistir hasta el otoño en la provincia.

D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Laguna de Cuyoj, Los Corbalanes y Estancia Los Prados (Quiroga *et al.*, 2016; Capellino, 2018b).

C. No Amenazada.

***Calidris melanotos* (Playerito pectoral)**

R. Migrante estival no reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

Scolopacinae

***Gallinago paraguaiae paraguaiae* (Becasina común)**

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Paso de la Cina (Bañados del Río Dulce) Oct-1979 (1) (R Miatello com. pers. en Norès *et al.* (1991)).

C. No Amenazada.

***Gallinago paraguaiae* subsp. (Becasina común).** Paso de Oscares (Bañados del Río Dulce) May-2009 (1) y Lagunas Saladas (Carmona, 2018a; Heredia, 2011). El registro de otoño podría tratarse de *G. paraguaiae magellanica* (migrante del sur) o *G. paraguaiae paraguaiae* (De la Peña, 2020e).

Tringinae

***Phalaropus tricolor* (Falaropo común)**

R. Migrante estival no reproductor.

D. Toda la provincia, principalmente en Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011).

C. No Amenazada.

***Tringa solitaria solitaria* (Pitotoy solitario)**

R. Migrante estival no reproductor.

D. Bañados de Figueroa y Nueva Esperanza (Nores *et al.*, 1991).

C. No Amenazada.

***Tringa solitaria* subsp. (Pitotoy solitario).** Lagunas Saladas, Bañados del Río Dulce, Los Corbalanes (Torres y Michelutti, 2001b; Heredia, 2011; Navarro, 2016n) e Isla Tara Inti Ago-2013 (OB Quiroga obs. pers.). Estos registros podrían tratarse de *T. solitaria solitaria* y/o *T. solitaria cinnamomea* (De la Peña, 2020e).

***Tringa melanoleuca* (Pitotoy grande)**

R. Migrante estival no reproductor. Algunos individuos pueden persistir todo el año en la provincia.

D. Toda la provincia, principalmente en Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

Tringa flavipes (Pitotoy chico)

R. Migrante estival no reproductor. Algunos individuos pueden persistir todo el año en la provincia.

D. Toda la provincia, principalmente en Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

JACANIDAE

Jacana jacana jacana (Jacana)

R. Residente.

D. Toda la provincia, especialmente en Bañados de Añatuya y Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

ROSTRATULIDAE

Nycticryphes semicollaris (Aguatero)

R. Residente.

D. Cerca de Icaño, Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Menegaux, 1925; Olrog, 1965; Norés *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011) y Dpto. Capital May-2015 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Lari

RYNCHOPIDAE

Rynchops niger intercedens (Rayador)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.

D. Villa Ojo de Agua Dic-1905 (1) (colección FML) y Bañados de Figueroa Jul-1990 (1) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Laguna de los Porongos (Bañados del Río Dulce) Ene-1999 (71) (Torres y Michelutti, 2001b), Río Dulce cerca de Loreto Oct-2007 (S Salvador obs. pers. en De la Peña (2020e)) y Los Corbalanes Abr-2017 (3) (Navarro, 2017m).

C. No Amenazada.

Rynchops niger cinerascens (Rayador) (^(Nsubsp.))

R. Migrante estival no reproductor.

D. Laguna de los Porongos Ene-1999 (22) (Torres y Michelutti, 2001b), Los Cor-

balanes May-2016 (7) y Abr-2017 (6) y Dique Los Quiroga May-2017 (2) (Navarro, 2016n, 2017n, m).

C. No Amenazada.

***Rynchops niger* subsp. (Rayador). Embalse de Río Hondo Jul-2014 (1), Los Corbalanes Abr-2012 (93) y Dique Los Quiroga Mar-2015 (6) (Pauro, 2014; Quiroga et al., 2017). El registro de julio podría tratarse de *R. niger intercedens*, y el resto de *R. niger intercedens* y/o *R. niger cinerascens* (De la Peña, 2020e).**

LARIDAE

Larinae

***Chroicocephalus maculipennis* (Gaviota de capucho café)**

R. Residente en el extremo sureste y migrante invernal en el resto de la provincia.

R. previa: permanente.

D. Bañados del Río Dulce permanente (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Argentina Ene-1977, Isla Tara Inti Jun-2012, Abr-2013 (5) y Jul-2018 (13) y Río Dulce (Dpto. Banda) Jul-2013 (19) (Nores et al., 1991; Coria, 2012a; De la Peña, 2020e; Quiroga, 2019).

C. No Amenazada.

***Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus* (Gaviota de capucho gris)**

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción.

D. Río Salado (cerca de Icaño), Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Mengaux, 1925; Norés et al., 1991). Actualización de distribución: Selva Dic-1977, Termas de Río Hondo Dic-2009 y Ene-2014, Isla Tara Inti Jun-Jul-2012, Dique Los Quiroga Sept-2018, Laguna de Pampa Mayo May-2018 (Gómez, 2011d, 2014a; Coria, 2012a; De la Peña, 2020e; Navarro, 2018j, k) y Río Dulce (Dpto. Capital) Jul-2013 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Leucophaeus pipixcan* (Gaviota chica)^(NSP)**

R. Ocasional (migrante estival no reproductor).

D. Bañados del Río Dulce Ago-1999 (1) plumaje nupcial, Bañados de Añatuya Jul-2011 (1) (Torres y Michelutti, 2001b; López, 2012) y Termas de Río Hondo Ene-2011 (3) plumaje intermedio (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Sterninae

***Phaetusa simplex chloropoda* (Atí)**

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción.

D. Bañados del Río Dulce ¿permanente? (Nores et al., 1991) y May-2016 (Vivas, 2017c). Actualización de distribución: Los Corbalanes Mar-2016, Dique Los Quiroga

Feb-2017, Isla Tara Inti Ene-2018 (Navarro, 2016o, 2017k; Andina, 2018a) y Bañados de Figueroa Jul-2014 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Gelochelidon nilotica groenvoldi (Gaviotín de pico grueso)^(SR)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. Visitante invernal.

D. previa. Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991).

C. No Amenazada.

Chlidonias niger surinamensis (Gaviotín negro)^(NSP)

R. Ocasional (migrante estival no reproductor).

D. Laguna de Cuyo Nov-2012 (1) (Quiroga *et al.*, 2015).

C. No Amenazada.

Sterna hirundo hirundo (Gaviotín golondrina)^(NSP)

R. Ocasional (migrante estival no reproductor).

D. Río Dulce cerca de Loreto Oct-2007 (S Salvador obs. pers. en De la Peña (2020e)).

C. No Amenazada.

Sterna trudeaui (Gaviotín lagunero)

R. Residente.

D. Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Dique Los Quiroga (Navarro, 2019c).

C. No Amenazada.

CICONIIFORMES

CICONIIDAE

Ciconia maguari (Cigüeña americana)

R. Residente.

D. Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce (Olrog, 1965; Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Selva, Lagunas Saladas (Heredia, 2011; De la Peña, 2020c) e Isla Tara Inti Ago-2013 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Jabiru mycteria (Jabirú)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción.

D. Bañados del Río Dulce época invernal (Nores *et al.*, 1991) y otoño-2008 (R Torres obs. pers.). Actualización de distribución: Los Gallegos verano-2013 (Quiroga, 2018), Bañados de Figueroa (2) fotografiados entre 2008 y 2012 (poster de Echevarria *et al.* (2017)) y Dic-2020 (1) (Navarro, 2020b).

C. No Amenazada.

Mycteria americana (Tuyuyú)

R. Residente. R. previa: ¿permanente?

D. Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce (nidifica) (Olrog, 1965; Nores *et al.*, 1991; Torres *et al.*, 2010). Actualización de distribución: Selva Dic-1977, alrededores de Isla Tara Inti Abr-2014, Los Corbalanes Sept-2016 y Abr-2017 (Gómez, 2014b; Navarro, 2016p, 2017l; De la Peña, 2020c) y Río Dulce (Dpto. Banda) Nov-2015 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

SULIFORMES

ANHINGIDAE

Anhinga anhinga anhinga (Aninga)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: visitante invernal.

D. Bañados de Figueroa Feb-Jul-Ago-1980 (Nores e Yzurieta, 1981), época invernal (Nores *et al.*, 1991), Jul-2014 y Jun-2016 (Quiroga *et al.*, 2017). Actualización de distribución: Bañados del Río Dulce Mar-1998, Feb-2002 y May-2003, Isla Tara Inti Ago-2013, Dique Los Quiroga Feb-2015, Mar-2015 y Ene-2016, y Los Corbalanes Sep-2016 (Torres y Michelutti, 2001b; Michelutti y Torres, 2006; Quiroga *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasiliensis brasiliensis (Biguá)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

PELECANIFORMES

ARDEIDAE

Tigrisoma lineatum marmoratum (Hocó colorado)

R. Residente. R. previa: no determinada.

D. Icaño y alrededores, y Bañados de Figueroa Jul-1980 (1) (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados del Río Dulce Abr-1999 (2) y Dic-2000 (1), Los Corbalanes Sep-2016 (1) (Torres y Michelutti, 2001b; Navarro, 2016q) e Isla Tara Inti y alrededores Abr-Ago-2013 (2) juveniles (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Botaurus pinnatus pinnatus (Mirasol grande)^(SR)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Citada por Olrog (1959) sin mención de localidad (Nores *et al.*, 1991).
C. No Amenazada.

***Ixobrychus involucris* (Mirasol común)**

R. Residente.
D. Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados de Figueroa, Dique Los Quiroga y Termas de Río Hondo (Quiroga *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

***Nycticorax nycticorax hoactli* (Garza bruja)**

R. Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a; Echevarria *et al.*, 2019).
C. No Amenazada.

***Butorides striata striata* (Garcita azulada)**

R. Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a).
C. No Amenazada.

***Bubulcus ibis ibis* (Garcita bueyera)**

R. Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011).
C. No Amenazada.

***Ardea cocoi* (Garza mora)**

R. Residente.
D. Toda la provincia, especialmente en Bañados de Figueroa (Olrog, 1965; Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Echevarria *et al.*, 2019).
C. No Amenazada.

***Ardea alba egretta* (Garza blanca)**

R. Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a; Echevarria *et al.*, 2019).
C. No Amenazada.

***Syrigma sibilatrix sibilatrix* (Chiflón)**

R. Residente.
D. Norte de la provincia (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: en la mitad sur de la provincia en Lagunas Saladas, El Mangrullo, Isla Tara Inti, Campo F. Cantos - INTA, Los Cardozos, Forres, Los Corbalanes, Río Utis (Bañados del Río

Dulce), Selva (Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; De la Peña, 2020c; Quiroga *et al.*, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a) y ciudad de Santiago del Estero Feb-2016 (OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Egretta thula thula* (Garcita blanca)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

***Egretta caerulea* (Garza azul) ^(NSP)**

R. ¿Migrante invernal?

D. (1) en cada registro: Bañados de Figueroa Ago-2011, alrededores de Isla Tara Inti Mar-2011, Jun-Jul-2013 y May-Ago-2014, y Los Corbalanes Jul-2012 (Echevarria *et al.*, 2011; Gómez, 2011, 2013; García, 2014a; La Grotteria, 2014a; Teran, 2015; Quiroga *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

THRESKIORNITHIDAE

***Plegadis chihi* (Cuervillo de cañada)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

***Phimosus infuscatus infuscatus* (Cuervillo cara pelada)**

R. Residente. R. previa: visitante invernal.

D. Bañados de Figueroa época invernal y Bañados del Río Dulce época invernal y Ene-1999 (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001b). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Laguna de Cuyo Nov-2012 (registro de nidificación) (Heredia, 2011; Quiroga y Llugdar, 2019a), Los Corbalanes Abr-2012 y Dic-2014, Dique Los Quiroga Feb-Mar-2015 e Isla Tara Inti y alrededores Ene-Abr-2011 y Ago-2013 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Theristicus caerulescens* (Bandurria mora)**

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Río Salado (cerca de Icaño) y Bañados de Figueroa Jul-1990 (5) y May-2018 (1) (Menegaux, 1925; Norés *et al.*, 1991; Andina, 2018b). Actualización de distribución: 10 km al norte de Paso de Oscares (Bañados del Río Dulce) Nov-2001 (2) (R Torres obs. pers.).

C. No Amenazada.

Theristicus caudatus hyperorius (Bandurria boreal)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.
D. Río Salado (cerca de Icaño) (Menegaux, 1925), cita mencionada en Nores *et al.* (1991). Actualización de distribución: Bañados de Añatuya Jul-1992 (8), Río Utis (Bañados del Río Dulce) Dic-1998 (1), El Mangrullo y Estancia Los Prados Mar-2016 (1) (Sferco y Baldo, 1995; Torres y Michelutti, 2001b; Aparicio *et al.*, 2008; Capellino, 2017c).
C. No Amenazada.

Platalea ajaja (Espátula rosada)

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Isla Tara Inti, Laguna de Cuyoj, Dique Los Quiroga, Los Corbalanes y Los Gallegos (Heredia, 2011; Quiroga *et al.*, 2017; Navarro, 2017ñ).
C. No Amenazada.

CATHARTIFORMES

CATHARTIDAE

Sarcoramphus papa (Jote real)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.
D. Sin mención de localidad por Olrog (1979) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Sierra de Guasayán Feb-2011 (1), Jun-2003 (3), Sachayoj Feb-1992 (1) y Dpto. Copo Nov-2018 (1) (Salvador y Eroles, 1994; Ferrari *et al.*, 2006; Coria y Heredia, 2012; Gorleri, 2018).
C. No Amenazada.

Vultur gryphus (Cóndor andino)^(NSP)

- R.** Ocasional.
D. Sierra de Guasayán Nov-2009 (2), Feb-2011 (2) y Dic-2020 (6), y Lavalle Nov-2017 (1) (Coria, 2010; Coria y Heredia, 2012; Domnanovich, 2020a; Quiroga *et al.*, 2020).
C. Amenazada.

Coragyps atratus foetens (Jote de cabeza negra)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2017; Echevarria *et al.*, 2019).
C. No Amenazada.

Cathartes aura jota (Jote de cabeza colorada)

- R.** Residente.

D. Oeste y noreste de la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

***Cathartes burrovianus* (Jote de cabeza amarilla)**

R. Residente.

D. Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados del Río Dulce, cerca de Sumampa, Lagunas Saladas, Laguna de Cuyo, Laguna de Pampa Mayo y Campo F. Cantos - INTA (Heredia, 2011; Paulini *et al.*, 2015; Quiroga *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

ACCIPITRIFORMES

PANDIONIDAE

***Pandion haliaetus carolinensis* (Águila pescadora)**

R. Migrante estival no reproductor. R. previa: no determinada.

D. Embalse de Rio Hondo Nov-1987 (1) y Ene-1988 (7) (L Salvador com. pers. en Noras *et al.* (1991)). Actualización de distribución: Bañados de Figueroa Feb-1991 (D Gómez com. pers. en Saggese *et al.* (1996)), Los Gallegos Ene-2013 (1) y Dpto. Banda Ene-2018 (1) (Quiroga *et al.*, 2016; Bareiro Guiñazú, 2018).

C. No Amenazada.

ACCIPITRIDAE

Elaninae

***Gampsonyx swainsonii swainsoni* (Milano chico)**

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Áreas Protegidas de Copo Oct-1978 (1) anillado por Olrog y Barques, Árraga Mar-1987 (1) y Sachayoj Sep-1990 (1) y Feb-1992 (4) (Nores *et al.*, 1991; Salvador y Eroles, 1994).

C. No Amenazada.

***Elanus leucurus leucurus* (Milano blanco)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Gypaetinae

***Chondrohierax uncinatus uncinatus* (Milano pico de garfio) ^(NSP)**

R. Ocasional.

- D.** Pozo Hondo Abr-2006 (1) y Sierra de Guasayán Dic-2020 (1) (Soria *et al.*, 2012; Domnanovich, 2020b).
C. No Amenazada.

***Elanoides forficatus* subsp. (Milano tijereta) ^(NSP)**

- R.** Ocasional.
D. Cerca de Loreto Dic-2007 (2) (S Salvador *in litt.* 2016 en Pagano *et al.* (2017)) y Dpto. Capital Jul-2013 (1) (F Jorge com. pers. en Quiroga *et al.* (2016)). Estos registros se tratarían de la subespecie *Elanoides forficatus yetapa* (De la Peña, 2020).
C. No Amenazada.

Accipitrinae

***Busarellus nigricollis leucocephalus* (Aguilucho pampa)**

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
D. Río Tapenaya (no localizado) (2) (Menegaux, 1925), cita mencionada en Nores *et al.* (1991). Actualización de distribución: Bañados de Figueroa (1) fotografiado entre los años 2008 y 2012 (poster de Echevarria *et al.* (2017)).
C. No Amenazada.

***Rostrhamus sociabilis sociabilis* (Caracolero)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a). Registro de reproducción en Bañados del Río Dulce (Torres y Michelutti, 2001a). Isla Tara Inti Jul-2012 (1) macho adulto fotografiado (Coria, 2012a).
C. No Amenazada.

***Ictinia plumbea* (Milano plomizo)**

- R.** Ocasional (migrante estival reproductor). R. previa: no determinada.
D. Sin mención de localidad por Olrog (1959, 1963, 1979) (Nores *et al.* 1991). Actualización de distribución: Sachayoj Feb-1992 (1) (Salvador y Eroles, 1994).
C. No Amenazada.

***Circus cinereus* (Gavilán ceniento)**

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
D. Sin mención de localidad por Olrog (1979) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Termas de Río Hondo Abr-2010 (1) y Lagunas Saladas (Gómez, 2011a; Heredia, 2011).
C. No Amenazada.

***Circus buffoni* (Gavilán planeador)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Dpto. Figueroa, Selva, Lagunas Sa-

ladas, Campo F. Cantos - INTA, Pozo Hondo y El Mangrullo (Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; De la Peña, 2020d).

C. Vulnerable.

***Accipiter striatus erythronemius* (Esparvero común)**

R. Residente.

D. Sierra de Guasayán, Salinas de Ambargasta, Icaño y Suncho Corral (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Campo F. Cantos - INTA, El Mangrullo y Lagunas Saladas (Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

***Accipiter bicolor guttifer* (Esparvero variado)**

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Olrog (1959, 1963, 1979) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Sierra de Guasayán (Nores y Cerana, 1990) y Los Corbalanes Abr-2012 (1) juvenil (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Geranospiza caerulescens flexipes* (Gavilán de patas largas)^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. Visitante invernal.

D. previa. Cerca de Icaño, Bañados de Figueroa, Otumpa y Sachayoj (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991).

C. No Amenazada.

***Buteogallus meridionalis* (Aguilucho colorado)**

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Gómez, 2011b; Coria, 2012b; Bustamante, 2016a, 2018a; Vivas, 2017d).

C. No Amenazada.

***Buteogallus urubitinga urubitinga* (Águila negra)**

R. Residente.

D. Cerca de Icaño, Los Telares y Bañados de Figueroa (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Isla Tara Inti, Campo F. Cantos - INTA, Los Corbalanes, Los Arias y Río Utis (Bañados del Río Dulce) (Codesido y Bilenca, 2004; Torres *et al.*, 2006; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Navarro, 2017o, 2020c).

C. No Amenazada.

***Buteogallus coronatus* (Águila coronada)**

R. Residente. R. previa: no determinada.

D. Monte Redondo Oct-1980 (3) y 12 y 15 km al sur de Icaño (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Tintina, Sachayoj Feb-1992 (1),

Río Utis (Bañados del Río Dulce) Jun-2004 (2), El Mangrullo, Lagunas Saladas, Isca Yacú Jul-2003 (1), Yuchán (1) juvenil, Sierra de Guasayán Mar-2011 (1), Áreas Protegidas de Copo Oct-2012 (2) adultos con nido, cerca de San Francisco Nov-2012 (3) y Lugones Sep-2015 (1) juvenil (Collar *et al.*, 1992; Salvador y Eroles, 1994; Torres *et al.*, 2006; Aparicio *et al.*, 2008; Barrionuevo *et al.*, 2011; Heredia, 2011; Coria y Heredia, 2012; Ortiz *et al.*, 2012; Coria *et al.*, 2013; Quiroga *et al.*, 2016).

C. En Peligro.

***Rupornis magnirostris saturatus* (Taguató común)**

R. Residente.

D. Toda la provincia, especialmente en Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

***Parabuteo unicinctus unicinctus* (Gavilán mixto)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

***Geranoaetus albicaudatus albicaudatus* (Aguilucho de alas largas)**

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.

D. Girardet Sept-1923 (2) (colección MLP), Loreto Mar-1987 (1) y Sachayoj Sept-1990 (3) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Argentina Ene-1977 (De la Peña, 2020d). Estancia El Estribo (40 km al sudoeste de Sachayoj) Ene-2003 (3) (Cejas, 2005; Areta *et al.*, 2014). Lagunas Saladas, Sierra de Guasayán Jun-2011, Ruta Nacional N° 64 (Dpto. Capital) Mar-2017 (1) y Ruta Provincial N° 5 a 10 km de Bañados de Figueroa Feb-2017 (1) (Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017; Navarro, 2017p; Quiroga *et al.*, 2020).

C. No Amenazada.

***Geranoaetus polyosoma polyosoma* (Aguilucho común)**

R. Migrante invernal del sur y oeste.

D. Oeste y sur de la provincia (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017). Puesto el Saladillo Jul-2014 (1) (OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Geranoaetus melanoleucus melanoleucus* (Águila mora)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. ¿Permanente?

D. previa. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991). Actualmente mapeada para el este de Argentina (De la Peña, 2020d).

C. No Amenazada.

***Geranoaetus melanoleucus australis* (Águila mora) ^(Nsubsp.)**

R. ¿Residente en el extremo suroeste? (requiere registro de reproducción), migrante invernal en el resto de la provincia.

D. Sierra de Guasayán Ene-2010-2011 (2), Abra Grande Abr-2018 (1), Dpto. Moreno Sept-2018 (1) y Colonia Alpina Jun-2019 (1) (Coria et al., 2017; Capovilla, 2018a; Navarro, 2018g; Hulsberg, 2019).

C. No Amenazada.

***Geranoaetus melanoleucus* subsp. (Águila mora).** Frías May-2019 (1) juvenil (Neumann, 2019). Este registro se trataría de *G. melanoleucus australis* (De la Peña, 2020d).

***Buteo brachyurus brachyurus* (Aguilucho de cola corta) ^(NSP)**

R. Ocasional.

D. Dpto. Copo: Áreas Protegidas de Copo May-2000 registro del morfo claro, y Ruta Nacional N° 16 entre Los Tigres y El Caburé (a 12 y 15 km, respectivamente) Jun-2006 (1) adulto del morfo claro (Roesler, 2003; Seipke y Clark, 2008).

C. No Amenazada.

***Buteo swainsoni* (Aguilucho langostero) ^(NSP)**

R. Migrante estival no reproductor.

D. Añatuya Feb-1992 (30), Dpto. Juan Felipe Ibarra Nov-2014 (400) y La Banda Nov-2017 (3) (Salvador y Eroles, 1994; Quiroga, 2018).

C. No Amenazada.

***Buteo albonotatus* (Aguilucho negro) ^(NSP)**

R. Ocasional.

D. Ruta Nacional N° 16 km 555 cerca de Urutaú Mar-2008 (1) adulto (Areta et al., 2014).

C. No Amenazada.

STRIGIFORMES**TYTONIDAE*****Tyto alba tuidara* (Lechuza de campanario)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria et al., 2017).

C. No Amenazada.

STRIGIDAE***Megascops choliba wetmorei* (Alilicucu común)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Bubo virginianus ñacurutú (Ñacurutú)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.

D. Cerca de Icaño, Bañados de Figueroa Jul-1990 (3) y Monte Quemado Sept-1991 (1) (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Pozo Hondo Jun-2003 (1), ribera del Río Utis (Bañados del Río Dulce) Nov-2012 (1) e Isla Tara Inti Jun-2015 (3) (Heredia, 2011; Quiroga *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Strix chacoensis (Lechuza bataraz chaqueña)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. Vulnerable.

Glaucidium brasilianum brasiliense (Caburé chico)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Glaucidium nana (Caburé grande)^(SR)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Sierra de Ambargasta Oct-1980 (2) (Nores *et al.*, 1991).

C. No Amenazada.

Athene cunicularia partridgei (Lechucita vizcachera)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

Asio clamator midas (Lechuzón orejudo)

R. Residente. R. previa: no determinada.

D. Icaño 1984 (1) (colección MACN) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: cerca del Río Utis (Bañados del Río Dulce) Dic-1998 (1), Lagunas Saladas, Isla Tara Inti Sept-2015 (2) adulto y (1) pichón, y Estancia Los Prados Nov-2017 (1) (Torres y Michelutti, 2001b; Heredia, 2011; Quiroga *et al.*, 2016; Vivas, 2017e).

C. No Amenazada.

***Asio stygius barberoi* (Lechuzón negruzco)**

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
D. La Donosa Jul-1959 (1) (colección FML) (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Jardín Botánico “Lucas Roic” (ciudad de Santiago del Estero) Jul-2015 (1) adulto (OR Coria y J Lima obs. pers.).
C. Vulnerable.

***Asio flammeus suinda* (Lechuzón del campo)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce, cerca de Colonia Dora, y sudoeste de la provincia sin mención de localidad (Menegaux, 1925; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011), Campo F. Cantos - INTA Nov-2010 y La Banda Nov-2011 y Oct-2015 (OB Quiroga, JL Navarro y OR Coria obs. pers.).
C. Vulnerable.

CORACIIFORMES**ALCEDINIDAE*****Megacyrle torquata torquata* (Martín pescador grande)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia, especialmente en Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Nores et al., 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Echevarria et al., 2019).
C. No Amenazada.

***Chloroceryle amazona amazona* (Martín pescador mediano)**

- R.** Residente.
D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Nores et al., 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Isla Tara Inti, Los Corbalanes, Río Dulce (ciudad de Santiago del Estero), Estancia Los Prados, Dique Los Quiroga (Coria, 2012a; Coria et al., 2015a; Navarro, 2013a; Bustamante, 2016b; Capellino, 2017f; Quiroga y Llugdar, 2019a), Villa Robles Ago-2012 y Laguna de J. Cruz Jul-2014 (OB Quiroga y OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Chloroceryle americana matthewsii* (Martín pescador chico)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia, especialmente en Bañados de Figueroa (Nores et al., 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Heredia, 2011; Coria, 2012a).
C. No Amenazada.

GALBULIFORMES
BUCCONIDAE

Nystalus maculatus (Durmilí)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

PICIFORMES
PICIDAE
Picumninae

Picumnus cirratus pilcomayensis (Carpinterito común)

R. Residente. R. previa: ¿permanente?

D. Bañados de Figueroa y Sachayoj (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: El Mangrullo, Sierra de Guasayán, Isla Tara Inti, Lagunas Saladas, Áreas Protegidas de Copo (Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2017), Villa Robles Jun-2010, Forres Ene-2011, Clodomira Ene-2010 y cerca de Río Utis (Bañados del Río Dulce) Nov-2012 (OB Quiroga obs. pers.). Nidifica en la provincia (De la Peña, 2020g).

C. No Amenazada.

Picinae

Melanerpes candidus (Carpintero blanco)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.

D. Cerca de Icaño, Girardet Sept-1923 (2) (colección MLP) y Ago-1927 (1) (colección MZC), Campo del Cielo Sept-1926 (1) (colección MZC), Pozo Hondo Abr-1948 (5) (colección FML), Áreas Protegidas de Copo Jul-1983 (2) y Oct-2012 (1), y Bañados de Añatuya May-1987 (3) (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991; Coria, 2012b). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Isla Tara Inti Jun-2012 (1), y Sierra de Guasayán (2) registrados entre los años 2010 y 2011 (Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Melanerpes cactorum (Carpintero del cardón)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2017).

C. No Amenazada.

***Dryobates mixtus malleator* (Carpintero bataraz chico)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a, b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Campephilus leucopogon leucopogon* (Carpintero lomo blanco)**

R. Residente.

D. Toda la provincia, especialmente en Sierra de Guasayán (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2017).

C. No Amenazada.

***Dryocopus schulzi* (Carpintero negro)**

R. Residente. R. previa: no determinada.

D. Cerca de Icaño, Termas de Río Hondo Sept-1930 (1) (colección FML), Frías Nov-1946 (1) (colección FML), Villa Río Hondo Abr-1947 (1) (colección FML), Campo del Cielo (2) (colección MACN) y Sierra de Guasayán Oct-1980 (2) y Ene-Mar-2011 (3) (Menegaux, 1925; Nores et al., 1991; Coria y Heredia, 2012). Actualización de distribución: Campo F. Cantos - INTA Mar-Ago-1997, Mar-Dic-1998 y Ago-1999, Lagunas Saladas, cerca de Santos Lugares Oct-2018 (1) y Estancia Los Prados Jul-2012 (1) y Dic-2019 (1) (Codesido y Bilenca, 2004; Heredia, 2011; Capellino, 2017g, 2019a; Neme, 2019). Nidifica en la provincia (De la Peña, 2020g).

C. Amenazada.

***Piculus chrysochloros chrysochloros* (Carpintero dorado común)**

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Olrog (1959, 1963, 1979) (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas y Áreas Protegidas de Copo Mar-2016 (1) (Heredia, 2011, Spinuzza, 2017).

C. No Amenazada.

***Colaptes melanochloros leucofrenatus* (Carpintero real)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a, b, 2016, 2017; Echevarria et al., 2019).

C. No Amenazada.

***Colaptes campestris campestroides* (Carpintero campestre)**

R. Residente.

D. Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Bañados de Añatuya, Lagunas Saladas, Selva, Sierra de Guasayán

e Icaño (Heredia, 2011; De la Peña, 2020g; Coria *et al.*, 2017; Hulsberg, 2017; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

CARIAMIFORMES

CARIAMIDAE

Cariama cristata (Chuña patas rojas)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Zotta (1944) y Olrog (1959, 1963, 1979), citas mencionadas en Nores *et al.* (1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas y Sierra de Guasayán (Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Chunga burmeisteri (Chuña patas negras)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

FALCONIFORMES

FALCONIDAE

Falconinae

Spizapteryx circumcincta (Halconcito gris)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015b, 2017).

C. Vulnerable.

Caracara plancus plancus (Carancho)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

Milvago chimango chimango (Chimango)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Falco sparverius cinnamominus (Halconcito colorado)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Falco femoralis femoralis (Halcón plomizo)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015b, 2016).
C. No Amenazada.

Falco peregrinus cassini (Halcón peregrino) ^(Nsubsp.)

- R.** Residente.
D. Sierra de Guasayán épocas estivales y no estivales (Coria *et al.*, 2017). Si bien no se registraron nidos en la sierra, se observó un acto de apareamiento en septiembre de 2013 (OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Falco peregrinus* subsp.** (Halcón peregrino). Salinas de Ambargasta Mar-1982 (2) (Nores *et al.*, 1991). Lagunas Saladas, El Mangrullo, Embalse de Río Hondo Ene-2019 (1) (Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Bareiro Guiñazú, 2019c) y cerca del Río Utis (Bañados del Río Dulce) May-2014 (1) (OB Quiroga obs. pers.). Estos registros podrían tratarse de *F. peregrinus cassini*, y probablemente también de las subespecies migrantes *F. peregrinus tundrius* y *F. peregrinus anatum* (De la Peña, 2020g).

PSITTACIFORMES

PSITTACIDAE

Arinae

Myiopsitta monachus calita (Cotorra)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

***Pionus maximiliani* subsp.** (Loro maitaca) ^(NSP)

- R.** Ocasional.
D. Campo F. Cantos - INTA Nov-2010 (1) adulto y Los Cardozos Mar-2017 (1) (registro documentado), se trataría de la subespecie *P. maximiliani lacerus* (Quiroga *et al.*, 2016; Quiroga, 2019).
C. No Amenazada.

Amazona aestiva xanthopteryx (Loro hablador)**R.** Residente.**D.** Norte de la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015b; Neme, 2019). Laguna de J. Cruz Jul-2014 (2) en vuelo (OR Coria obs. pers.).**C.** Amenazada.*Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus* (Calancate común)**R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2017).**C.** No Amenazada.*Psittacara mitratus mitratus* (Calacante cara roja)^(NSP)**R.** Ocasional.**D.** Sierra de Guasayán Feb-Mar-2011 (Coria y Heredia, 2012).**C.** No Amenazada.

PASSERIFORMES

TYRANNI

THAMNOPHILIDAE

Taraba major major (Chororó)**R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2017).**C.** No Amenazada.*Thamnophilus doliatus radiatus* (Choca listada)**R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.**D.** Bañados de Figueroa Oct-1981 (2), Jul-1990 (1) y Nov-1998 (1), y Sachayoj Sept-1990 (2) (Nores *et al.*, 1991; Capllonch *et al.*, 2015). Actualización de distribución: cerca del Río Utis (Bañados del Río Dulce) May-2015 (1), Dique Los Quiroga Oct-2016 (1), San Ramón Oct-2018 (1) y El Zanjón Jul-2020 (1) (Capllonch *et al.*, 2015; Navarro, 2016r, 2018l; Domnanovich, 2020c).**C.** No Amenazada.*Thamnophilus ruficapillus* subsp. (Choca de corona rojiza)^(NSP)**R.** Ocasional.**D.** Pozo Hondo Nov-2002 (1) (Capllonch *et al.*, 2005). Se trataría de la subespecie *T. ruficapillus cochabambae* (De la Peña, 2020g).**C.** No Amenazada.

Thamnophilus caerulescens dinellii* (Choca común)*R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a, 2016, 2017).**C.** No Amenazada.***Myrmorchilus strigilatus suspicax* (Batará estriado)****R.** Residente.**D.** Noreste de la provincia (Nores et al., 1991; Caziani y Protomastro, 1991; López de Casenave et al., 1998). Actualización de distribución: Pozo Hondo, La Banda y Lagunas Saladas (Alderete y Caplonch, 2010; Heredia, 2011; Vivas, 2017f; Navarro, 2020d).**C.** No Amenazada.**MELANOPAREIIDAE*****Melanopareia maximiliani pallida* (Gallito de collar)****R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores et al., 1991; Layus, 2015).**C.** No Amenazada.***Melanopareia maximiliani argentina* (Gallito de collar)****R.** Residente.**D.** Sierra de Guasayán, y entre esta sierra y Lavalle (Nores et al., 1991; Coria et al., 2017).**C.** No Amenazada.**RHINOCRYPTIDAE*****Rhinocrypta lanceolata* (Gallito copetón)****R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores et al., 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2015b, 2016, 2017).**C.** No Amenazada.**FURNARIIDAE****Dendrocolaptinae*****Sittasomus griseicapillus griseicapillus* (Tarefero)****R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.**D.** Sin mención de localidad por Olrog (1959) (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 (López de Casenave et al., 1998; Alderete y Caplonch, 2010) donde es una especie relativamen-

te común (A Bodrati obs. pers. en Coria *et al.* (2013)). Se reporta como erróneo el registro para Termas de Río Hondo publicado en Coria *et al.* (2013).

C. No Amenazada.

Xiphocolaptes major major (Trepador gigante)

R. Residente.

D. Mitad norte de la provincia y Sierra de Guasayán (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Coria *et al.*, 2017). Actualización de distribución: en la mitad sur de la provincia en El Mangrullo, Campo F. Cantos - INTA y Lagunas Saladas (Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2016).

C. No Amenazada.

Campylorhamphus trochilirostris hellmayri (Picapalo colorado)

R. Residente.

D. Mitad norte de la provincia, especialmente en Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998). Actualización de distribución: en la mitad sur de la provincia en Campo F. Cantos - INTA, El Mangrullo, Lagunas Saladas (Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008, Alderete y Caplonch, 2010; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2016) y cerca de Sumampa Ago-2012 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Drymornis bridgesii (Chinchero grande)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Lepidocolaptes angustirostris praedatus (Chinchero chico)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Furnariinae

Tarphonomus certhioides estebani (Bandurrita chaqueña)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Furnarius rufus paraguayae (Hornero)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido

y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Furnarius cristatus* (Hornero copetón)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017).

C. No Amenazada.

***Phleocryptes melanops melanops* (Junquero)**

R. Residente.

D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011), alrededores de Isla Tara Inti Ene-Feb-2011 y Dique Los Quiroga Feb-Mar-2015 y Mar-2017 (OB Quiroga y OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Upucerthia dumetaria dumetaria* (Bandurrita común) ^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. Visitante invernal.

D. previa. Salinas de Ambargasta (Nores *et al.*, 1991).

C. No Amenazada.

***Upucerthia dumetaria hypoleuca* (Bandurrita común) ^(Nsubsp.)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Suncho Corral (Navas, 1971).

C. No Amenazada.

***Cinclodes fuscus* (Remolinera común)**

R. Migrante invernal del sur.

D. Bañados del Río Dulce y Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991, Torres y Michelutti, 2001b). Actualización de distribución: Isla Tara Inti, Los Corbalanes, Dique Los Quiroga (Coria, 2012a; Navarro, 2016s, 2017q) y Laguna de Cuyo Oct-2012 (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Cinclodes comechingonus* (Remolinera serrana)**

R. Migrante invernal del sur.

D. Bañados de Figueroa (Olrog, 1972; Noras *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados del Río Dulce, Embalse de Río Hondo, Lagunas Saladas y Dique Los Quiroga (Torres y Michelutti, 2001b; Hulsberg, 2009a; Heredia, 2011; Navarro, 2020e).

C. Vulnerable.

Leptasthenura platensis (Coludito copetón)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

Leptasthenura aegithaloides pallida (Coludito de cola negra)

- R.** Migrante invernal del sur.
D. Sur de Salinas de Ambargasta (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: cerca de Sumampa Ago-2012 (OB Quiroga obs. pers.).
C. No Amenazada.

Phacellodomus rufifrons sincipitalis (Espinero de frente rojiza) ^(NSP)

- R.** Residente.
D. San Pedro de Guasayán (Alderete y Caplonch, 2010). Termas de Río Hondo registrado en 25 ocasiones durante el período 2008-2012, en todas las épocas del año y con nidos (Coria *et al.*, 2013), además en Mar-2018 (2) y Nov-2019 (2) (Bustamante, 2018b; Enggist, 2019a). Dique Los Quiroga May-2019 (1) (Navarro, 2019d).
C. No Amenazada.

Phacellodomus sibilatrix (Espinero chico)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Phacellodomus striaticollis (Espinero de pecho manchado) ^(NSP)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción.
D. Lagunas Saladas, Sauce Bajada Ene-2012 (1), Forres Ene-2012 (1), cerca del Río Utis (Bañados del Río Dulce) Ago-Nov-2012 (2) y May-2014 (1), Quimilí Paso Jul-Dic-2013 (Heredia, 2011; Caplonch *et al.*, 2015) y El Zanjón Ago-2015 (1) (OB Quiroga obs. pers.).
C. No Amenazada.

Anumbius annumbi (Leñatero)

- R.** Residente.
D. Mitad sur y centro de la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Alderete y Caplonch, 2010; Heredia, 2011; Aguilan, 2018b; Quiroga y Llugdar, 2019a).
C. No Amenazada.

Coryphistera alaudina alaudina (Crestudo)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017).
C. No Amenazada.

***Asthenes baeri baeri* (Canastero chaqueño)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca* (Canastero coludo)**

R. Residente en Bañados del Río Dulce y migrante invernal en el resto de la provincia.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Caplonch et al., 2015). Puesto el Saladillo Jul-2014 (OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia* (Curutié blanco)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a, b, 2016, 2017; Quiroga et al., 2017).

C. No Amenazada.

***Spartonoica maluroides* (Espirillero enano) ^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. Permanente.

D. previa. Bañados del Río Dulce (Nores et al., 1991).

C. Vulnerable.

***Pseudoseisura lophotes argentina* (Cacholote castaño)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2015a, b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Schoeniophylax phryganophilus phryganophilus* (Chotoy)**

R. Residente.

D. Bañados de Añatuya y Bañados del Río Dulce (Nores et al. 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Termas de Río Hondo, El Mojón y La Banda (Heredia, 2011; Gómez, 2011f; Quiroga et al., 2016; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

Certhiaxis cinnamomeus russeolus (Curutié colorado)**R.** Residente.**D.** Bañados de Figueroa y Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Isla Tara Inti, Los Corbalanes y Dique Los Quiroga (Coria, 2012a; Navarro, 2017r, 2018m; Quiroga y Llugdar, 2019a).**C.** No Amenazada.*Synallaxis albescens australis* (Pijuí de cola parda)**R.** Migrante estival reproductor parcial.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Alderete y Caplonch, 2010; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).**C.** No Amenazada.*Synallaxis frontalis frontalis* (Pijuí de frente gris)**R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017).**C.** No Amenazada.

COTINGIDAE

Phytotoma rutila rutila (Cortarramas)**R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a, 2017).**C.** No Amenazada.

TITYRIDAE

Xenopsaris albinucha albinucha (Tijerilla)**R.** Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.**D.** 10 Km al oeste de Los Pirpintos Nov-1986 (1) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: El Mangrullo, Lagunas Saladas, ciudad de Santiago del Estero Feb-2012 (1) y Feb-2015 (1), Sierra de Guasayán Ene-2011 (1), ribera del Río Utis (Bañados del Río Dulce) Nov-2012 (1), El Zanjón Nov-2013 (1), La Bajada Nov-2016 (1), Estancia Los Prados Nov-2017 (1) y Dique Los Quiroga Nov-2015 (1) y Oct-2018 (1) (Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017; Capellino, 2017h; Quiroga *et al.*, 2017; Navarro, 2018n).**C.** No Amenazada.*Pachyramphus viridis viridis* (Anambé verdoso)^(NSP-SR)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 (López de Casenave et al., 1998).

C. No Amenazada.

***Pachyramphus polychopterus spixii* (Anambé común)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Sierra de Guasayán Nov-1981 (6-8) y época estival-2010-2011 (7) (Nores et al., 1991; Coria et al., 2017). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991, Campo F. Cantos - INTA, Lagunas Saladas, Pozo Hondo, Los Corbalanes Ene-2018 (1) (Codesido y Bilenca, 2004; López de Casenave et al., 1998; Alderete y Caplonch, 2010; Heredia, 2011; Soria et al., 2012; Navarro, 2018ñ) y Clodomira Ene-2010 (1) (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Pachyramphus validus audax* (Anambé grande)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Sierra de Guasayán Nov-1981 (6) y época estival-2010-2011 (9) (Nores et al., 1991; Coria et al., 2017). Actualización de distribución: Clodomira Ene-2010 (1) (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

TYRANNIDAE

Tyranninae

***Hemitriccus margaritaceiventer margaritaceiventer* (Mosqueta de ojo dorado)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a, b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Hirundinea ferruginea pallidior* (Birro común)^(NSP)**

R. Ocasional.

D. El Mangrullo y Sierra de Guasayán Feb-Oct-2011 (Aparicio et al., 2008; Coria et al., 2017).

C. No Amenazada.

***Stigmatura budytoides inzonata* (Calandrita)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Inezia inornata* (Piojito picudo) ^(NSP)**

- R.** Ocasional (migrante estival reproductor).
D. Termas de Río Hondo Mar-2013 (1) y Feb-2014 (1), Los Corbalanes Dic-2019 (1) y Dpto. Copo Feb-2019 (1) (Andina, 2013a, 2014b; Navarro, 2019e; Rupp, 2019).
C. No Amenazada.

***Euscarthmus meloryphus meloryphus* (Barullero)**

- R.** Migrante estival reproductor. R. previa: permanente.
D. Norte y oeste de la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; López de Casenave *et al.*, 1998; Aparicio *et al.*, 2008; Alderete y Caplonch, 2010; Coria *et al.*, 2016, 2017). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011). Las citas posteriores a Nores *et al.* (1991) evidencian presencia en época estival. En Sierra de Guasayán durante dos años de muestreo en la época estival y no estival, solo fue registrada en época estival (Coria *et al.*, 2017). De numerosas salidas de avistamientos en la provincia por parte de los autores del presente artículo, nunca fue registrada en época no estival. La última guía de aves de Argentina la establece como migrante estival en el país (López-Lanús, 2020).
C. No Amenazada.

***Camptostoma obsoletum obsoletum* (Piojito silbón)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

***Elaenia spectabilis* (Fiofío grande)**

- R.** Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.
D. Bañados de Figueroa Feb-1981 (20-30) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Sierra de Guasayán época estival-2010-2011 (29), El Mangrullo, Áreas Protegidas de Copo, ciudad de Santiago del Estero, Forres Ene-2012 (2), Los Gallegos Ene-2013 (3), Los Corbalanes Dic-2016 (2) (Aparicio *et al.*, 2008; Caplonch *et al.*, 2009; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a; Navarro, 2016t; Coria *et al.*, 2017; Quiroga *et al.*, 2017) y La Banda épocas estivales período 2009-2021 (OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Elaenia albiceps chilensis* (Fiofío silbón)**

- R.** Migrante de paso. R. previa: visitante estival.
D. Sierra de Ambargasta (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Sierra de Guasayán Oct-2011 (Coria *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

***Elaenia albiceps albiceps* (Fiofío silbón) ^(Nsubsp.)**

- R.** Migrante de paso.
D. Áreas Protegidas de Copo Nov-2000 y Pozo Hondo Nov-2002 (Caplonch y Lobo 2005; Alderete y Caplonch, 2010).
C. No Amenazada.

***Elaenia albiceps* subsp. (Fiofío silbón).** Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 y Lagunas Saladas (López de Casenave *et al.*, 1998; Heredia, 2011). Estos registros se tratarían de una o de las dos subespecies anteriores (De la Peña, 2020i).

***Elaenia parvirostris* (Fiofío de pico corto)**

- R.** Migrante estival reproductor.
D. Toda la provincia, especialmente en Sierra de Guasayán y Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Soria *et al.*, 2012; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).
C. No Amenazada.

***Myiopagis viridicata viridicata* (Fiofío de corona dorada)**

- R.** Migrante estival reproductor.
D. Sierra de Guasayán (Nores *et al.*, 1991; Coria y Heredia, 2012; Coria *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

***Suiriri suiriri suiriri* (Suirirí común)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Soria *et al.*, 2012; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

***Phaeomyias murina murina* (Piojito pardo) ^(NSP)**

- R.** Ocasional (migrante estival reproductor).
D. Sierra de Guasayán Ene-Feb-2011 (2) y Jul-2010-2011 (2) (Coria y Heredia, 2012; Coria *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

***Anairetes flavirostris flavirostris* (Cachudito de pico amarillo) ^(NSP)**

- R.** ¿Residente en el extremo suroeste? Migrante invernal en el resto de la provincia.
D. Sierra de Guasayán Jun-2003 y Feb-2011, El Mangrullo en época invernal, Termas de Río Hondo Ago-2009 (1), Lagunas Saladas, Laguna de Pampa Mayo Sep-2016 (1) (Ferrari *et al.*, 2006; Aparicio *et al.*, 2008; Gómez, 2011g; Heredia, 2011; Nava-

rro, 2016w; Coria *et al.*, 2017) y cerca de Sumampa Ago-2012 (1) (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Polystictus pectoralis* (Tachuri canela) ^(NSP-SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Sin mención de localidad por Zotta (1939).

C. Vulnerable.

***Pseudocolopteryx sclateri* (Doradito copetón) ^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Sin mención de localidad por Zotta (1939). Bañados del Río Dulce Feb-1974 (2) (Nores *et al.*, 1991).

C. No Amenazada.

***Pseudocolopteryx dinelliana* (Doradito pardo)**

R. ¿Migrante estival reproductor parcial? R. previa: permanente.

D. Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce, en ambos lugares permanentes (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Los Corbalanes Jun-2012, Dique Los Quiroga Sept-2018 y Termas de Río Hondo Ago-2014-2016 (Navarro, 2012a; La Grotteria, 2014b; Gómez Umpierrez, 2018; Schmidt, 2020).

C. Vulnerable.

***Pseudocolopteryx flaviventris* (Doradito común)**

R. Ocasional (¿Migrante invernal?). R. previa: no determinada.

D. Bañados de Añatuya Jul-1990 (7) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011). Posible presencia en Dptos. Capital y Río Hondo (OB Quiroga y OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Serpophaga nigricans* (Piojito gris)**

R. Residente.

D. Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Los Corbalanes, Dique Los Quiroga e Isla Tara Inti (Heredia, 2011; Gómez, 2014c; Bustamante, 2016c; Navarro, 2016v).

C. No Amenazada.

***Serpophaga subcristata subcristata* ^(Nsubsp.) y *S. subcristata munda* ^(Nsubsp.) (Piojito común)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Zimmer, 1955; Salvador, 1988; Noriega *et al.*, 1991; Straneck, 2007; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017; De la Peña, 2020i). Se requieren estudios específicos sobre las distribuciones

de estas subespecies en la provincia, por lo tanto, en este caso “toda la provincia” se refiere a la especie. Actualmente se discute si estas dos subespecies son especies diferentes (i.e. *Serpophaga subcristata* y *Serpophaga munda*).

C. No Amenazada.

***Serpophaga griseicapilla* (Piojito trinador) ^(NSP)**

R. Migrante invernal del oeste.

D. Toda la provincia (Codesido y Bilenca, 2004; Ferrari et al., 2006; Straneck, 2007; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria et al., 2015a, 2017; Neme, 2019).

C. No Amenazada.

***Pitangus sulphuratus argentinus* (Benteveo común)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2015a, 2017; Echevarria et al., 2019; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

***Machetornis rixosa rixosa* (Picabuey)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria et al., 2015a, 2017).

C. No Amenazada.

***Myiodynastes maculatus solitarius* (Benteveo rayado)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Norte de la provincia y Sierra de Guasayán (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Coria et al., 2017). Actualización de distribución: El Mangrullo, Campo F. Cantos - INTA y Lagunas Saladas (Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria et al., 2016).

C. No Amenazada.

***Empidonax varius varius* (Tuquito rayado)**

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: no determinada.

D. Bañados de Figueroa Feb-1981 (1) y Sep-1988 (varios individuos) (Nores et al., 1991; Caplonch, 2007). Actualización de distribución: cerca de Santo Domingo Oct-1998, Pozo Hondo Abr-Jun-2003 y El Mangrullo (Caplonch, 2007; Aparicio et al., 2008).

C. No Amenazada.

***Empidonax aurantioatrocristatus aurantioatrocristatus* (Tuquito gris)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Tyrannus melancholicus melancholicus (Suirirí real)

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2017).

C. No Amenazada.

Tyrannus savana savana (Tijereta)

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Casiornis rufus (Burlisto castaño)

R. Ocasional (migrante estival reproductor). R. previa: no determinada.

D. Dpto. Copo: 10 Km al oeste de Los Pirpintos Nov-1986 (2) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 (López de Casenave *et al.*, 1998) y registrado durante un trayecto por el este de la provincia (sin mención de localidad) desde Selva hasta Sachayoj Feb-1992 (3) (Salvador y Eroles, 1994).

C. No Amenazada.

Myiarchus swainsoni ferocior (Burlisto de pico canela)

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Caplonch, 2007; Coria *et al.*, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Myiarchus swainsoni swainsoni (Burlisto de pico canela)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Pampa de Los Guanacos Abr-1956 (1) (colección FML) (Nores *et al.*, 1991). Actualmente en Argentina mapeada para Corrientes y Misiones (De la Peña, 2020i).

C. No Amenazada.

Myiarchus ferox australis (Burlisto de pico negro)^(NSP)

R. Ocasional (migrante estival reproductor).

D. Límite interprovincial con Santa Fe (Dpto. General Taboada) Feb-2006 (2) (Luna y Manassero, 2008).

C. No Amenazada.

Myiarchus tyrannulus tyrannulus (Burlisto de cola castaña)

R. Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.
D. Girardet (2) (colección MLP), norte de las Salinas de Ambargasta Oct-1980 (1) y Río Urueña Oct-1981 (2) (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Bañados de Figueroa Nov-1988, Frías Abr-1991 (1), Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991, Nov-2002 y Oct-2012, Pozo Hondo Ene-2003, Campo F. Cantos - INTA Dic-1997, Mar-Dic-1998 y Nov-Dic-2014, El Mangrullo, Sierra de Guasayán épocas estivales 2010-2011 (López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Caplonch, 2007; Aparicio et al., 2008; Coria, 2012b; Coria et al., 2016, 2017), San Ramón Ene-2010 (1), Forres Ene-2011 (1) y cerca de Sumampa Nov-2012 (1) (OB Quiroga obs. pers.).
C. No Amenazada.

Myiophobus fasciatus auriceps (Mosqueta estriada)

R. Migrante estival reproductor.
D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Codesido y Bilenca, 2004; López de Casenave et al., 1998; Alderete y Caplonch, 2010; Heredia, 2011; Soria et al., 2012; Coria et al., 2015a, 2017).
C. No Amenazada.

Sublegatus modestus brevirostris (Suirirí de pico corto)

R. Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.
D. Termas de Río Hondo Nov-1929 (1) (colección FML), Ahí Veremos Oct-1981 (1) y Sachayoj Sep-1990 (1) (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 y Oct-2012 (1), El Mangrullo, Lagunas Saladas, Campo F. Cantos - INTA, Pozo Hondo (López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Alderete y Caplonch, 2010; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Soria et al., 2012; Coria et al., 2016) y Villa Figueroa Sept-2015 (1) (OB Quiroga obs. pers.).
C. No Amenazada.

Pyrocephalus rubinus rubinus (Churrinche)

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.
D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Soria et al., 2012; Coria et al., 2017). Laguna de J. Cruz Jul-2014 (1) macho juvenil (OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

Fluvicola albiventer (Viudita blanca)

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.
D. Toda la provincia, principalmente en Bañados de Figueroa y Paso de la Cina (Bañados del Río Dulce) (Nores et al., 1991; Coria, 2012a; Coria et al., 2015a; Echevarria et al., 2019).
C. No Amenazada.

Arundinicola leucocephala (Lavandera) ^(NSP-SR)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Sin mención de localidad por Short (1975).

C. No Amenazada.

Alectrurus risora (Yetapá de collar) ^(SR)

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Menciones en Nores *et al.* (1991): Girardet Feb-1927 (1) (colección MACN), Selva Ene-1900 (Hartert y Venturi, 1909) y al límite con Santa Fe común y abundante (Pereyra, 1938).

C. En Peligro.

Lessonia rufa (Sobrepuesto común)

R. Migrante invernal del sur.

D. Sur y centro de la provincia (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001a). Actualización de distribución: Pozo Hondo, El Mangrullo, Lagunas Saladas y alrededores de Isla Tara Inti (Caplonch, 2007; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a).

C. No Amenazada.

Hymenops perspicillatus perspicillatus (Pico de plata)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.* 1991; Torres y Michelutti, 2001a; Coria, 2012a; Echevarria *et al.*, 2019).

C. No Amenazada.

Knipolegus striaticeps (Viudita chaqueña)

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Caplonch, 2007; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Soria *et al.*, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014; Coria *et al.*, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Knipolegus hudsoni (Viudita chica)

R. ¿Migrante de paso? R. previa: no determinada.

D. Campo del Cielo (sin fecha) (1) (colección MZC) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Los Corbalanes May-2013 (1) y Sep-2015 (1), y Salinas de Ambargasta Abr-2018 (1) (Navarro, 2013b, 2015f; Villegas, 2018).

C. Vulnerable.

Knipolegus aterrimus aterrimus (Viudita común)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017).
C. No Amenazada.

Satrapa icterophrys (Suirirí amarillo)

- R.** ¿Migrante invernal? R. previa: no determinada.
D. San Pedro de Guasayán Jul-1981 (1) (colección FML) (Nores, *et al.*, 1991) y Julio (sin información del año) (Caplonch *et al.*, 2009). Actualización de distribución: Laguna de Pampa Mayo Mar-2014 (1), Río Utis (Bañados del Río Dulce) Oct-2008 (1) y May-2014 (1), e Isla Tara Inti Ago-2013 (1) (Quiroga *et al.*, 2016; Carmona, 2019a).
C. No Amenazada.

Muscisaxicola maculirostris maculirostris (Dormilona chica)^(NSP)

- R.** Ocasional (migrante invernal del oeste).
D. Pozo Hondo Abr-2002 (4) (Caplonch, 2007).
C. No Amenazada.

Muscisaxicola maclovianus mentalis (Dormilona de cara negra)^(NSP)

- R.** Ocasional (migrante invernal del sur).
D. Termas de Río Hondo Abr-2010 (1) (Gómez, 2011h).
C. No Amenazada.

Nengetus cinereus pepoaza (Monjita gris)

- R.** Ocasional. R. previa: no determinada.
D. Sin mención de localidad por Zotta (1939) y Campo del Cielo Sep-1927 (3) (colección MZC) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011).
C. No Amenazada.

Xolmis velatus (Monjita rabadilla blanca)^(NSP)

- R.** Ocasional.
D. Paso de Oscares (Bañados del Río Dulce) Abr-2019 (1) (Carmona, 2019b).
C. No evaluada.

Xolmis irupero irupero (Monjita blanca)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

***Neoxolmis coronatus* (Monjita coronada)**

- R.** Migrante invernal del sur.
D. Toda la provincia (Zotta, 1939; Nores *et al.*, 1991; Capllonch, 2007; Andina, 2018c).
C. No Amenazada.

***Neoxolmis salinarum* (Monjita salinera)**

- R.** Residente.
D. Suncho Corral Sept-1905 (1) (colección FML) y Salinas de Ambargasta (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Pozo Hondo y Ardiles (Capllonch *et al.*, 2005; Capllonch, 2007; Soria *et al.*, 2012).
C. Vulnerable.

***Neoxolmis rubetra* (Monjita castaña)**

- R.** Migrante invernal del sur.
D. Extremo sur de Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011).
C. Vulnerable.

***Agriornis micropterus micropterus* (Gaucho común)**

- R.** Migrante invernal del sur.
D. Toda la provincia (Zotta, 1939; Nores *et al.*, 1991; Capllonch, 2007; Aparicio *et al.*, 2008; Capllonch *et al.*, 2015).
C. No Amenazada.

***Agriornis murinus* (Gaucho chico)**

- R.** Migrante invernal del sur.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Capllonch, 2007; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Capllonch *et al.*, 2015). Puesto el Saladillo Jul-2014 (OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Cnemotriccus fuscatus bimaculatus* (Mosqueta de ceja blanca)^(NSP)**

- R.** Ocasional.
D. Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 y Oct-2012 (López de Casenave *et al.*, 1998; Coria, 2012b).
C. No Amenazada.

***Lathrotriccus euleri argentinus* (Mosqueta parda)^(NSP)**

- R.** Ocasional (migrante estival reproductor).
D. San Pedro de Guasayán, Pozo Hondo y Bañados de Figueroa (Capllonch y Zelaya, 2006).
C. No Amenazada.

Subfamilia incertae sedis

Tachuris rubrigastra rubrigastra (Tachurí sietecolores)

R. Residente.

D. Paso de la Cina (Bañados del Río Dulce) (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Isla Tara Inti, Dique Los Quiroga y Laguna de Cuyojo (Coria, 2012a; Quiroga et al., 2017; Navarro, 2020f).

C. No Amenazada.

PASSERES

VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis viridis (Juan chiviro)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilanca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria et al., 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Vireo olivaceus chivi (Chiví común)

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilanca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Soria et al., 2012; Coria, 2012b; Coria et al., 2016, 2017).

C. No Amenazada.

CORVIDAE

Cyanocorax chrysops tucumanus (Urraca común)

R. Residente.

D. Sierra de Guasayán (Nores e Yzurieta, 1981; Norés et al., 1991; Coria et al., 2017; Coria, 2020).

C. No Amenazada.

***Cyanocorax chrysops* subsp.** (Urraca común). Río Urueña (límite con Tucumán y Salta) Oct-1984 (4), Sachayoj Sept-1990 (8) (Nores et al., 1991) y Áreas Protegidas de Copo Sept-Oct-1998 (Trucco y Caziani, 2008). Los registros en el departamento Copo probablemente correspondan a la subespecie *C. chrysops chrysops*, por su cercanía a la provincia del Chaco donde fue citada (De la Peña, 2020j).

HIRUNDINIDAE

Pygochelidon cyanoleuca patagonica (Golondrina barranquera)

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: no determinada.

D. Bañados de Figueroa Oct-1981 (1) (Nores et al., 1991). Actualización de distri-

bución: Sierra de Guasayán Feb-2011, Termas de Río Hondo Jul-2009 (1), Lagunas Saladas época estival (Heredia, 2011; Gómez, 2012a; Coria *et al.*, 2017), Los Corbalanes Dic-2014, Laguna de Cuyo Dic-2014 (17), Jul-2012 (5), Sauce Bajada Ene-2015 (4) y La Banda época estival (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Alopochelidon fucata* (Golondrina de cabeza rojiza)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; Soria *et al.*, 2012; Coria *et al.*, 2015a, 2017).

C. No Amenazada.

***Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (Golondrina ribereña)**

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción y reforzar los registros estivales.

R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Olorg (1959) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Isla Tara Inti Abr-Oct-2018 (2), Los Corbalanes Sept-2016 (1), Bañados de Añatuya May-2017 (1) y Río Dulce (Dpto. Robles) Jul-2020 (4) (Navarro, 2016w; Ebel, 2017; Bustamante, 2018c; Enggist, 2018c; Domnanovich, 2020d).

C. No Amenazada.

***Progne tapera fusca* (Golondrina parda)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017; Echevarria *et al.*, 2019; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

***Progne chalybea macrorhamphus* (Golondrina doméstica)**

R. Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.

D. Campo del Cielo Oct-1927 (1) (colección MZC) y Girardet Ago-1927 (1) (colección MZC) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Río Utis (Bañados del Río Dulce) Ene-1999 (18), El Mangrullo, Termas de Río Hondo Ene-2009 (1), Dique Los Quiroga Dic-2019 (1) (Torres y Michelutti, 2001b; Aparicio *et al.*, 2008; Gómez, 2012b; Navarro, 2019f), La Banda Dic-2012 (1) y Nov-2015 (2), y ciudad de Santiago del Estero Oct-2015 (1) (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Progne elegans* (Golondrina negra)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

***Tachycineta leucorrhoa* (Golondrina de cejas blancas)**

- R.** Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.
D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria et al., 2017; Echevarria et al., 2019).
C. No Amenazada.

***Tachycineta leucopyga* (Golondrina patagónica)**

- R.** Migrante invernal del sur.
D. Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Termas de Río Hondo y Los Corbalanes (Gómez, 2012c; Navarro, 2015g).
C. No Amenazada.

***Riparia riparia riparia* (Golondrina zapadora)**

- R.** Migrante estival no reproductor. R. previa: no determinada.
D. Termas de Río Hondo Dic-1929 (1) (colección FML) y Nov-2008 (3), y Bañados de Figueroa Oct-1981 (8-10) (Nores et al., 1991; Gómez, 2012d). Actualización de distribución: Dique Los Quiroga Mar-2015 (1) y Los Corbalanes época estival-2015 (OB Quiroga y JL Navarro obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Hirundo rustica erythrogaster* (Golondrina tijerita)**

- R.** Migrante estival no reproductor.
D. Toda la provincia, especialmente en Bañados de Figueroa, Bañados del Río Dulce y Termas de Río Hondo (Nores et al., 1991; García, 2014b; Andina, 2018d).
C. No Amenazada.

***Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota* (Golondrina de rabadilla canela)**

- R.** Migrante estival no reproductor.
D. Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Sierra de Guasayán, ciudad de Santiago del Estero, Dique Los Quiroga, e Isla Tara Inti y alrededores (Heredia, 2011; Coria et al., 2015a, 2017; Quiroga et al., 2017; Enggist, 2019b).
C. No Amenazada.

TROGLODYTIDAE***Troglodytes aedon rex* (Ratona común)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria et al., 2015a, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

***Cistothorus platensis tucumanus* (Ratona aperdizada)**

- R.** Residente.
D. Pampa de Los Guanacos Abr-1956 (1) (colección FML) y Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Sierra de Guasayán y Lagunas Saladas (Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

POLIOPHTILIDAE

***Polioptila dumicola dumicola* (Tacuarita azul)**

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

TURDIDAE

***Catharus ustulatus swainsoni* (Zorzalito boreal)^(NSP)**

- R.** Ocasional (migrante estival no reproductor).
D. San Pedro de Guasayán, Campo F. Cantos - INTA Nov-2010 (1) (Caplonch, 2012; Quiroga *et al.*, 2016), y ribera del Río Dulce (Dpto. Banda) Ene-2013 (1) (OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Turdus amaurochalinus* (Zorzal chalchalero)**

- R.** Migrante estival reproductor parcial. R. previa: permanente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Navarro, 2016x; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017). La Banda épocas invernales período 2010-2020 (OR Coria obs. pers.).
C. No Amenazada.

***Turdus rufiventris rufiventris* (Zorzal colorado)**

- R.** Residente.
D. Norte y centro de la provincia, Sierra de Guasayán y Lagunas Saladas (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017).
C. No Amenazada.

***Turdus nigriceps nigriceps* (Zorzal de cabeza negra)^(NSP)**

- R.** Migrante de paso.
D. Bañados de Figueroa Sept-1988 (23) y Sierra de Guasayán Feb-Mar-2011 (2) (Caplonch *et al.*, 2008; Coria y Heredia, 2012).
C. No Amenazada.

Turdus chiguancus anthracinus* (Zorzal chiguanco)*R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción.**D.** Sur de la provincia en Sierra de Sumampa y Sierra de Ambargasta en primavera donde muy probablemente nidifique, y en llanuras en invierno (Nores e Yzurieta, 1981; Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Sierra de Guasayán Jun-2003, Jul-2010-2011 y verano-2015, Termas de Río Hondo Nov-2011, La Banda Ago-2013, Maco Ago-2017 (1), Los Corbalanes Ago-2019 (Ferrari et al., 2006; Coria y Heredia, 2012; Gómez, 2012e; Coria et al., 2017; Navarro, 2015h, i, 2019g; Quiroga, 2019) y ciudad de Santiago del Estero Jul-2012 (OR Coria obs. pers.).**C.** No Amenazada.**MIMIDAE*****Mimus patagonicus* (Calandria mora)****R.** Residente en el extremo sur y ¿migrante invernal hacia el centro de la provincia?**D.** Salinas de Ambargasta y Bañados del Río Dulce (en ambos lugares permanente), Suncho Corral Jun-1905 (1) (colección MACN) (Salvador, 1988; Nores et al., 1991) y Laguna de Cuyo Ago-2017 (1) (Andina, 2017b).**C.** No Amenazada.***Mimus saturninus modulator* (Calandria grande)****R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores et al., 1991; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; De la Peña, 2020k; Coria et al., 2017).**C.** No Amenazada.***Mimus triurus* (Calandria real)****R.** Migrante invernal del sur. R. previa: permanente. Las observaciones personales y estudios posteriores a la lista de 1991 que contemplan tanto épocas estivales como no estivales, evidencian solo registros invernales, y aún sin registro de reproducción en la provincia (De la Peña, 2020k).**D.** Toda la provincia (Nores et al., 1991; Heredia, 2011; Codesido y Bilenca, 2004; Coria et al., 2015a, 2017).**C.** No Amenazada.**STURNIDAE*****Sturnus vulgaris vulgaris* (Estornino pinto)^(NSP)****R.** ¿Residente? Realizaría desplazamientos posreproductivos, se requieren más estudios específicos.**D.** Ciudad de Santiago del Estero Ago-2015 (12), Dic-2017 (1), Abr-2018 (3), Nov-2019 (26) (registro de reproducción) y Ene-2020 (45) (Quiroga, 2016, 2019, 2020). Introducido desde Eurasia (Craig y Feare, 2009).**C.** No Evaluada.

PASSERIDAE

Passer domesticus domesticus (Gorrión)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2015a, 2017). Introducido desde Eurasia (De la Peña, 2020).

C. No Evaluada.

MOTACILLIDAE

Anthus lutescens lutescens (Cachirla chica)

R. Residente.

D. Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa y Embalse de Río Hondo (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Los Corbalanes y Dique Los Quiroga (Heredia, 2011; Navarro, 2016y; Delaloye, 2018).

C. No Amenazada.

Anthus furcatus furcatus (Cachirla de uña corta)

R. Residente.

D. Sur y centro de la provincia (Salvador, 1988; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas y Termas de Río Hondo (Heredia, 2011; Gómez, 2012f)

C. No Amenazada.

Anthus correndera (Cachirla común)

R. Residente.

D. Bañados de Río Dulce y norte de Salinas de Ambargasta (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Termas de Río Hondo (Heredia, 2011; Gómez, 2012g), Laguna de Cuyo Nov-2012 y Puesto el Saladillo Jul-2014 (OB Quiroga y OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

FRINGILLIDAE

Fringillinae

Spinus magellanicus tucumanus (Cabecitanegra común)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Euponiinae

Euphonia chlorotica serirostris (Tangará común)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

PASSERELLIDAE

Rhynchospiza strigiceps strigiceps (Cachilo de corona castaña)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.

D. Suncho Corral Abr-May-1905 (3) y Oct-1917 (1) (colección MACN), Lavalle Jun-Jul-1916 (5) (colección Museo Americano de Historia Natural de Nueva York - MAHN) y May-1981 (3-4), Monte Quemado Oct-1950 (2) (colecciones MACN y MAHN), 10 Km al oeste de Los Pirpintos Nov-1986 (5) y Sachayoj Sept-1990 (10) (Navas, 1965; Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo, Campo F. Cantos - INTA, El Mangrullo, Lagunas Saladas, Pozo Hondo, Sierra de Guasayán (López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Soria *et al.*, 2012; Coria *et al.*, 2016, 2017), Sauce Bajada Ene-2012 (2), cerca de Sumampa Nov-2012 (2), Dpto. Taboada Ago-2012 (2) y Puesto el Saladillo Jul-2014 (1) (OB Quiroga y OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

Ammodramus humeralis xanthornus (Cachilo de ceja amarilla)

R. ¿Residente? Requiere registros invernales y de reproducción.

D. Campo del Cielo Sept-Oct-1927 (2) (colección MZC) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 y Oct-2012, Lagunas Saladas, Campo F. Cantos - INTA Nov-Dic-2014, El Mangrullo, Sierra de Guasayán época estival, Fernández Sept-2015 (1), Estancia Los Prados Nov-2017 (1) (López de Casenave *et al.*, 1998; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Navarro, 2015j; Coria *et al.*, 2016, 2017; Capellino, 2017i), Dpto. Banda Ene-2010 (3) y Feb-2015 (2), y cerca de Río Utis (Bañados del Río Dulce) Nov-2012 (varios individuos) (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

Arremon flavirostris dorbignii (Cerquero de collar)^(NSP)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción.

D. Sierra de Guasayán épocas estivales y no estivales en laderas húmedas (Ferrari *et al.*, 2006; Coria y Heredia 2012; Coria *et al.*, 2017) y Río Urueña Jul-2012 (1) (Quiroga *et al.*, 2016).

C. No Amenazada.

Zonotrichia capensis hypoleuca (Chingolo)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a, 2016).

C. No Amenazada.

***Zonotrichia capensis australis* (Chingolo)**

- R.** Migrante invernal del sur. **R. previa:** no determinada.
D. Bañados de Figueroa Jul-1980 (3) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Pozo Hondo Ago-1971 (8) y La Banda Jul-2017 (2) (Ortiz y Caplonch, 2011; Quiroga, 2019).
C. No Amenazada.

***Zonotrichia capensis choraules* (Chingolo) ^(Nsubsp.)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

- R. previa.** No determinada.
D. previa. Lavalle en julio (sin información del año) (1) (Chapman, 1940).
C. No Amenazada.

ICTERIDAE

Dolichonychinae

***Dolichonyx oryzivorus* (Charlatán) ^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

- R. previa.** No determinada.
D. previa. Sin mención de localidad por Olrog (1959, 1963, 1979) (Nores *et al.*, 1991).
C. Vulnerable.

Sturnellinae

***Leistes superciliaris* (Pecho colorado)**

- R.** Residente.
D. Sur y centro de la provincia (Nores *et al.*, 1991; Quiroga *et al.*, 2017; Capellino, 2019b). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo, Lagunas Saladas, Termas de Río Hondo, Campo F. Cantos - INTA y Sierra de Guasayán (Heredia 2011; Coria, 2012b; Gómez, 2012h; Coria *et al.*, 2016, 2017; Quiroga *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

***Leistes loyca* subsp. (Loica común) ^(NSP)**

- R.** Ocasional.
D. Pozo Hondo Jun-2003 (50) (Soria *et al.*, 2012).
C. No Amenazada.

Cacicinæ

***Cacicus solitarius* (Boyero negro)**

- R.** Residente.
D. Noreste de la provincia y Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Termas de Río Hondo, Los Corbalanes, Forres

(Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2013; Navarro, 2017s), Dique Los Quiroga Feb-2015, Los Gallegos Ene-2013 y Laguna de J. Cruz Jul-2014 (OB Quiroga y OR Coria obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Cacicus chrysopterus* (Boyero de alas amarillas)**

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Zotta (1944) (Nores et al., 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo (registrado por EJ Derlindati entre 1998 y 2002 (APN, 2006)) y Sachayoj en abril (sin información del año) (1) macho (Salvador y Di Giacomo, 2014).

C. No Amenazada.

Icterinae

***Icterus pyrrhopterus pyrrhopterus* (Boyerito)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria et al., 2015a, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

Agelaiinae

***Molothrus rufoaxillaris* (Tordo pico corto)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2015a, b, 2017).

C. No Amenazada.

***Molothrus bonariensis bonariensis* (Tordo renegrido)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores et al., 1991; López de Casenave et al., 1998; Aparicio et al., 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria et al., 2015a, b, 2017).

C. No Amenazada.

***Amblyramphus holosericeus* (Federal)**

R. ¿Migrante estival reproductor parcial? Requiere relevamientos invernales considerando que esta especie realiza desplazamientos entre el litoral argentino y el Pantanal (Caplonch, 2018). R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Zotta (1944), Bañados de Figueroa (CC Olrog obs. pers. en Noras et al. (1991)). Actualización de distribución: Lagunas Saladas (Heredia, 2011), Laguna de Cuyoj verano-2010 nido con (3) pichones (A Ramírez com.

pers. en Quiroga *et al.* (2016)) y cerca del límite interprovincial con Tucumán (Dpto. Jiménez) Sept-2017 (2) adultos (Quiroga, 2018).

C. Vulnerable.

***Gnorimopsar chopi chopi* (Chopí)**

R. Ocasional. R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Zotta (1944) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo, registrado por EJ Derlindati entre 1998 y 2002 (APN, 2006).

C. No Amenazada.

***Agelasticus cyanopus cyanopus* (Varillero negro) ^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Sin mención de localidad por Olrog (1959, 1963, 1979) (Nores *et al.*, 1991).

C. No Amenazada.

***Agelaioides badius badius* (Tordo músico)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, b, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

***Agelasticus thilius petersii* (Varillero de alas amarillas)**

R. Residente.

D. Bañados de Figueroa y Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Lagunas Saladas, Termas de Río Hondo, Los Corbalanes, Dique Los Quiroga y Laguna de Cuyo (Heredia, 2011; Gómez, 2014d; Navarro, 2016z, 2020g; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

***Chrysomus ruficapillus ruficapillus* (Varillero congo)**

R. Residente.

D. Sur y centro de la provincia (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: alrededores de Isla Tara Inti y Lagunas Saladas (Heredia, 2011; Coria 2012a).

C. No Amenazada.

***Pseudoleistes virescens* (Pecho amarillo común) ^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Sin mención de localidad por Zotta (1944), Olrog (1959, 1963, 1979) y Short (1975), citas mencionadas en Norés *et al.* (1991).

C. No Amenazada.

PARULIDAE

Geothlypis aequinoctialis velata (Arañero de cara negra)

- R.** Migrante estival reproductor parcial.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Setophaga pityayumi pityayumi (Pitiayumí)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilanca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Basileuterus culicivorus azarae (Arañero coronado chico) ^(NSP)

- R.** Ocasional.
D. Sierra de Guasayán Jun-2003 (1) y Feb-2011 (2) (Ferrari *et al.*, 2006; Coria y Heredia 2012).
C. No Amenazada.

Myioborus brunniceps (Arañero de corona rojiza) ^(NSP)

- R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción.
D. Sierra de Guasayán épocas estivales y no estivales en laderas húmedas (Ferrari *et al.*, 2006; Coria y Heredia 2012; Coria *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

CARDINALIDAE

Piranga flava flava (Fueguero común)

- R.** Residente.
D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilanca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).
C. No Amenazada.

Pheucticus aureoventris aureoventris (Rey del bosque)

- R.** Migrante estival reproductor parcial. R. previa: no determinada.
D. Sierra de Guasayán Nov-1981 (3) (Nores e Yzurieta, 1982; Nores *et al.*, 1991), Feb-2003 (2) (Ferrari *et al.*, 2004), Jul-2010 (1) (Coria y Heredia, 2012) y épocas estivales-2010-2011 en laderas húmedas (Coria *et al.*, 2017).
C. No Amenazada.

Cyanoloxia brissonii argentina* (Reinamora grande)*R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2017).**C.** No Amenazada.**THRAUPIDAE*****Hemithraupis guira* subsp. (Saíra dorada) ^(NSP)****R.** Ocasional.**D.** Ciudad de Santiago del Estero Jun-2020 (2) (Ibarra, 2020). Se trataría de la subespecie *H. guira boliviana*, considerando la proximidad del registro a las provincias de Tucumán y Catamarca donde fue citada (De la Peña, 2020k).**C.** No Amenazada.***Sicalis flaveola pelzelni* (Jilguero dorado)****R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Codesido y Bilenca, 2004; Soria *et al.*, 2012; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).**C.** No Amenazada.***Sicalis luteola luteiventris* (Misto)****R.** ¿Residente? Requiere registro de reproducción. R. previa: no determinada.**D.** Árraga Feb-1983 (8-10), Embalse Río Hondo Jun-1985 (8-10) y Mar-1987 (3), y Sachayoj Sept-1990 (15) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Selva Ene-1977, El Mangrullo, Isla Tara Inti Jun-2012 (2) (Aparicio *et al.*, 2008; Coria, 2012a; De la Peña, 2020k), Laguna de Cuyo Mar-2010 (1), Oct-Nov-2012 y Ene-2013, Campo F. Cantos - INTA Sept-2014 (6) y Nov-2014 (2), Río Utis (Bañados del Río Dulce) Nov-2012 y Taboada Ago-2012 (2) (OB Quiroga y OR Coria obs. pers.).**C.** No Amenazada.***Rhopospina carbonaria* (Yal carbonero)****R.** Migrante invernal del sur. R. previa: no determinada.**D.** Sotelillo (sitio no localizado) Jun-1954 (1) (colección FML), La Banda Jun-1954 (1) (colección FML), Colonia Dora Jul-1942 (1) (colección MACN) y sur de Salinas de Ambargasta Sept-1981 (8-10) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: ciudad de Santiago del Estero Ago-2016 (1), La Aurora May-2017 (1) y cerca de Tintina Sept-2018 (1) (Monteleone, 2016; Navarro, 2017w; Capovilla, 2018c).**C.** No Amenazada.***Catamenia analis analis* (Piquito de oro común)****R.** ¿Residente en el extremo suroeste y visitante invernal en el centro de la provincia?**R. previa:** no determinada.

D. Sierra de Guasayán Oct-1980 (5), Jul-2009 (1) y Oct-2011 (Nores *et al.*, 1991; Hulsberg, 2009c; Coria *et al.*, 2017). Actualización de distribución: Termas de Río Hondo Nov-2011 (1) (Gómez, 2012i) y ribera del Río Dulce (Dpto. Capital) Jul-2013 (1) (OB Quiroga obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Volatinia jacarina jacarina* (Volatinero)**

R. Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.

D. 10 km al oeste de Los Pirpintos Nov-1986 (1) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991, cerca de Sachayoj Feb-1992 (70-80), Pozo Hondo pequeñas bandadas en posible desplazamiento migratorio Abr-Jun-2003, Termas de Río Hondo Dic-2008 (1), Estancia Los Prados Nov-2016 (1), La Bajada Feb-2016 (2), ribera del Río Dulce (Dpto. Capital) Feb-2019 (Salvador y Eroles, 1994; López de Casenave *et al.*, 1998; Ortiz y Caplonch, 2010; Gómez, 2012j; Soria *et al.*, 2012; Capellino, 2016; Navarro, 2016ad; Quiroga y Llugdar, 2019a), Forres Ene-2011 (3), cerca de Sumampa Nov-2012 (2), Dique Los Quiroga Feb-2015 (2) y ribera del Río Albigasta Feb-2015 (1) (OB Quiroga, OR Coria y J Lima obs. pers.).

C. No Amenazada.

***Tachyphonus rufus* (Frutero negro)^(NSP)**

R. Ocasional.

D. Áreas Protegidas de Copo, registrado por EJ Derlindati entre 1998 y 2002 (APN, 2006).

C. No Amenazada.

***Coryphospingus cucullatus fargoi* (Brasita de fuego)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Codesido y Bilenca, 2004; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Sporophila lineola lineola* (Corbatita overo)**

R. Migrante estival reproductor. R. previa: no determinada.

D. Isca Yacú Ene-1906 (2) (Colección FML) y Ene-2018 (2), y 10 km al oeste de Los Pirpintos Nov-1986 (2) (Nores *et al.*, 1991; Quiroga y Llugdar, 2019a). Actualización de distribución: Isla Tara Inti y alrededores Ene-2010 (1) y Mar-2018 (1), y Los Corbalanes Feb-2016-2017 (2) (Gómez, 2012l; Navarro, 2016ae, 2017x; Bustamante, 2018d).

C. No Amenazada.

***Sporophila hypoxantha* (Capuchino canela)^(NSP)**

R. Ocasional (migrante estival reproductor).

D. La Banda Ene-Feb-2015 (varios individuos), Termas de Río Hondo Feb-2017

(3) y Dpto. Juan Felipe Ibarra Feb-2021 (1) (Quiroga *et al.*, 2016, 2020; Navarro, 2021b).

C. Vulnerable.

***Sporophila ruficollis* (Capuchino de garganta café)**

R. Ocasional (migrante estival reproductor). R. previa: no determinada.

D. Selva (Hartert y Venturi, 1909), cita mencionada en Nores *et al.* (1991). Actualización de distribución: Pinto Nov-2018 (1) y Dpto. Juan Felipe Ibarra Feb-2021 (1) (Schlemmer, 2018; Navarro, 2021c).

C. Vulnerable.

***Sporophila caerulescens caerulescens* (Corbatita común)**

R. Migrante estival reproductor.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Codesido y Bilenca, 2004; Coria *et al.*, 2015a, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

***Sporophila collaris melanocephala* (Corbatita dominó)**

R. Migrante estival reproductor parcial. R. previa: no determinada.

D. Sin mención de localidad por Olrog (1959, 1963, 1979) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Bañados de Añatuya Jul-1992 (1), Paso de Oscares (Bañados del Río Dulce) Oct-2009 (1), Termas de Río Hondo Ene-2010 (1) y Bañados de Figueroa Jul-2014 (1) (Sferco y Baldo, 1995; Gómez, 2012k; Quiroga *et al.*, 2016; Carmona, 2018b).

C. No Amenazada.

***Saltatricula multicolor* (Pepitero chico)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Heredia, 2011; Codesido y Bilenca, 2004; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

***Saltator coerulescens coerulescens* (Pepitero gris)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a; Coria *et al.*, 2015a, 2017).

C. No Amenazada.

***Saltator aurantiirostris aurantiirostris* (Pepitero de collar)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Embernagra platensis olivascens (Verdón)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Poospiza ornata (Monterita canela)

R. Migrante invernal del sur. R. previa: no determinada.

D. Sierra de Ambargasta Oct-1980 (50-80) y Sierra de Guasayán May-1981 (1) y Jul-2011 (1) (Nores *et al.*, 1991; Coria *et al.*, 2017). Actualización de distribución: Villa Guasayán Jul-2009 (1), cerca de Sumampa Ago-2012 (varios individuos), Bañados de Figueroa May-2015 (1), Los Corbalanes Sept-2016 (1) y cerca de Tintina Sept-2018 (2) (Hulsberg, 2009b; Andina, 2015b; Navarro, 2016aa; Quiroga *et al.*, 2017; Capovilla, 2018b).

C. No Amenazada.

Poospiza nigrorufa (Sietevestidos)^(NSP)

R. Ocasional.

D. Lagunas Saladas (Heredia, 2011).

C. No Amenazada.

Poospiza whitii (Sietevestidos serrano)^(NSP)

R. ¿Residente? Requiere registro de reproducción.

D. Sierra de Guasayán Feb-Jun-Oct-2011 (3), San Ramón Ene-2010 (1), La Aurora May-2017 (1), El Mojón Ene-2012 (1) y ciudad de Santiago del Estero Jul-2013 (1) (Quiroga, 2014b; Navarro, 2017t; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Microspingus torquatus pectoralis (Monterita de collar)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017; Sánchez *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

Microspingus melanoleucus (Monterita de cabeza negra)

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Codesido y Bilenca, 2004; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2016, 2017).

C. No Amenazada.

Asemospiza obscura obscura (Espiguero pardo)

R. Ocasional.

D. Bañados de Figueroa Feb-1986 (8) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991, cerca de Río Utis

(Bañados del Río Dulce) Nov-2012 (1) y Estancia Los Prados Ene-2018 (1) (López de Casenave *et al.*, 1998; Capllonch *et al.*, 2015; Capellino, 2019c).

C. No Amenazada.

***Lophospingus pusillus* (Soldadito común)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Codesido y Bilenca, 2004; Heredia, 2011; Coria *et al.*, 2017).

C. No Amenazada.

***Diuca diuca minor* (Diuca común)**

R. Migrante invernal del sur. **R. previa:** no determinada.

D. Sotelillo (sitio no localizado) Jun-1954 (1) (colección FML), Termas de Río Hondo May-1957 (5) (colección FML), Huyamampa Oct-1957 (1) (colección FML), Suncho Corral Abr-Jun-1906 (6) (colección MACN) y Girardet Sept-1923 (1) (colección MLP) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: El Mangrullo, cerca de Añatuya May-2013 (1), Estancia Los Prados Sept-2015 (1), extremo este de Salinas de Ambargasta Jul-2016 (3) y Los Corbalanes Jun-2017 (2) (Aparicio *et al.*, 2008; Andina, 2013b; Bustamante, 2016d; Capellino, 2017j; Navarro, 2017u).

C. No Amenazada.

***Gubernatrix cristata* (Cardenal amarillo)^(SR)**

Requiere nuevos estudios para evaluar su situación actual.

R. previa. No determinada.

D. previa. Gramilla Nov-1963 (1) (colección FML) (Nores *et al.*, 1991).

C. En Peligro.

***Paroaria coronata* (Cardenal común)**

R. Residente.

D. Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Heredia, 2011; Coria, 2012b; Coria *et al.*, 2017; Quiroga y Llugdar, 2019a).

C. No Amenazada.

***Paroaria capitata capitata* (Cardenilla)**

R. Residente. **R. previa:** no determinada.

D. Sin mención de localidad por Zotta (1944) y Olrog (1959, 1963, 1979) (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Isla Tara Inti y alrededores Jul-2012 (2), May-2014 (2) y Oct-2018 (1), Dique Los Quiroga May-2017 (2) y Sep-2016 (1), Los Corbalanes Mar-2012 (1) y Ago-2016 (1), y ribera del Río Dulce (Dpto. Capital) Dic-2018 (1) (registro de nidificación) (Coria, 2012a; García, 2014c; Navarro, 2012b, 2016ab, ac, 2017v; Enggist, 2018d; Quiroga y Llugdar, 2019c).

C. No Amenazada.

Rauenia bonariensis schulzei* (Naranjero)*R.** Residente.**D.** Toda la provincia (Nores *et al.*, 1991; López de Casenave *et al.*, 1998; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2017).**C.** No Amenazada.***Thraupis sayaca obscura* (Celestino común)****R.** Residente.**D.** Bañados de Figueroa, Río Urueña y Girardet (Nores *et al.*, 1991). Actualización de distribución: Áreas Protegidas de Copo, Isla Tara Inti, Lagunas Saladas, ciudad de Santiago del Estero, Sierra de Guasayán (López de Casenave *et al.*, 1998; Heredia, 2011; Coria, 2012a, b; Coria *et al.*, 2015a, 2017), Dique Los Quiroga Mar-2015, Los Corbalanes Sept-2014 y Dic-2016, La Banda principalmente en época estival, Los Gallegos Ene-2013, Villa Robles Mar-2011 y Forres Ene-2011 (OB Quiroga y JL Navarro obs. pers.).**C.** No Amenazada.**AGRADECIMIENTOS**

Agradecemos a las personas citadas en este trabajo que compartieron sus registros en EcoRegistros y eBird. También por colaboraciones con la bibliografía y registros a Martín De la Peña, Daniel Carrizo, Ada Echevarria, Martín Herrera, Patricia Caplonch, Jorge M. Spinuzza, Alejandro G. Di Giacomo y Alejandro Mouchard. A los/as revisores/as por contribuir a mejorar notablemente la calidad del manuscrito.

LITERATURA CITADA

- Aguilan, C. (2018a). Pato de cabeza negra (*Heteronetta atricapilla*). eBird. <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S47813654>
- Aguilan, C. (2018b). Leñatero (*Anumbius annumbi*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S47818795>
- Alderete, C., Caplonch, P. (2010). Pesos de aves suboscines de Argentina. Nótulas Faunísticas - Segunda Serie, 58, 1-5. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-58.pdf>
- Alvarez, A. (1919). Flora y fauna de la provincia de Santiago del Estero. Ciudad de Santiago del Estero: Editorial del Poder Ejecutivo de la provincia de Santiago del Estero.
- Andina, M. (2013a). Piojito picudo (*Inezia inornata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=20694>
- Andina, M. (2013b). Diuca común (*Diuca diuca*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=22309>

- Andina, M. (2014a). Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=68314>
- Andina, M. (2014b). Piojito picudo (*Inezia inornata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=42097>
- Andina, M. (2015a). Chiricote (*Aramides cajaneus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=91299>
- Andina, M. (2015b). Monterita canela (*Poospiza ornata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=100375>
- Andina, M. (2017a). Pato zambullidor chico (*Oxyura vittata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=214502>
- Andina, M. (2017b). Calandria mora (*Mimus patagonicus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=214501>
- Andina, M. (2018a). Atí (*Phaetusa simplex*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=239942>
- Andina, M. (2018b). Bandurria mora (*Theristicus caerulescens*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=266240>
- Andina, M. (2018c). Monjita coronada (*Xolmis coronatus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=266102>
- Andina, M. (2018d). Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=240199>
- Aparicio, G., Lizzi, J., Maturo, H., Antoniazzi, L. (2008). La Reserva Natural El Mangrullo y su aporte para la conservación del Gran Chaco Americano. Informe Técnico. Santa Fe: Fundación Hábitat y Desarrollo.
- APN - Administración de Parques Nacionales. (2006). Plan de Manejo del Parque Nacional Copo. Versión Final. APN/GEF/BIRF. https://sib.gob.ar/archivos/PM_PN_Copo.pdf
- Areta, J.I., Bodrati, A., Klavins, J., Almirón, D., Hulsberg, H., Mangini, G. (2014). El Aguilucho Jote (*Buteo albonotatus*) en Argentina. Nuestras Aves, 59, 3-8. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9SQ0VyMHFOVUl4d2c/view>
- Bareiro Guiñazú, L. (2018). Águila pescadora (*Pandion haliaetus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S42268294>
- Bareiro Guiñazú, L. (2019a). Pato de cabeza negra (*Heteronetta atricapilla*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S52058995>
- Bareiro Guiñazú, L. (2019b). Pato fierro (*Nomonyx dominicus*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S52117145>
- Bareiro Guiñazú, L. (2019c). Halcón peregrino (*Falco peregrinus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S51413099>
- Barrionuevo, C., Fra, E., Salinas, R., Ortiz, D., Julio, L., Caplonch, P., Aráoz, R. (2011). Nuevos registros del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para cuatro provincias argentinas. Nuestras Aves, 56, 13-16. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3SmRFN2JDSEhqUGc/view>
- Boletta, P.E., Acuña, L.R., Juárez de Moya, M.L. (1989). Análisis de las características climáticas de la provincia de Santiago del Estero y comportamiento del tiempo durante la sequía de la campaña agrícola 1988-89. Santiago del Estero: INTA-UNSE.

- Boletta, P.E.C. (2001). Utilización de información agrometeorológica y satelital para la evaluación de la desertificación en el Chaco Seco-Departamento Moreno, Santiago del Estero. Tesis de Magíster. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. https://fcf.unse.edu.ar/archivos/tesis/Tesis_Boletta.PDF
- Brace, R.C., Hornbuckle, J., Pearce-Higgins, J.W. (1996). Records of wintering Hudson's Black-tyrant *Knipolegus hudsoni* at the Estación Biológica del Beni, Bolivia. *Cotinga*, 5, 67-68.
- Bravo, S.P., Cueto, V.R., Gorosito, C.A. (2017). Migratory timing, rate, routes and wintering areas of White-crested Elaenia (*Elaenia albiceps chilensis*), a key seed disperser for Patagonian forest regeneration. *PLoS ONE*, 12(2), 1-15. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170188>
- Bustamante, W. (2016a). Aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=166853>
- Bustamante, W. (2016b). Martín pescador mediano (*Chloroceryle amazona*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=163695>
- Bustamante, W. (2016c). Piojito gris (*Serpophaga nigricans*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=165057>
- Bustamante, W. (2016d). Diuca común (*Diuca diuca*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=162451>
- Bustamante, W. (2018a). Aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=261619>
- Bustamante, W. (2018b). Espinero de frente rojiza (*Phacellodomus rufifrons*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=263144>
- Bustamante, W. (2018c). Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=262601>
- Bustamante, W. (2018d). Corbatita overo (*Sporophila lineola*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=267435>
- Cabrera, A.L. (1971). Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 14(1-2), 1-42. http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/sipcyt/bfa003895.pdf
- Campos, L.F. (2017). Anó grande (*Crotophaga major*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=188024>
- Carmona, C. (2016a). Pato crestudo (*Sarkidiornis sylvicola*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=169124>
- Carmona, C. (2016b). Gallineta overa (*Pardirallus maculatus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=168874>
- Carmona, C. (2018a). Becasina común (*Gallinago paraguaiae*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=261404>
- Carmona, C. (2018b). Corbatita dominó (*Sporophila collaris*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=266080>
- Carmona, C. (2019a). Suirirí amarillo (*Satrapa icterophrys*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=309546>
- Carmona, C. (2019b). Monjita rabadilla blanca (*Xolmis velatus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=326750>
- Capellino, H. (2016). Volatinero (*Volatinia jacarina*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=177843>

- Capellino, H. (2017a). Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=233742>
- Capellino, H. (2017b). Batitú (*Bartramia longicauda*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=212792>
- Capellino, H. (2017c). Bandurria boreal (*Theristicus caudatus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=212793>
- Capellino, H. (2017d). Atajacaminos tijereta (*Hydropsalis torquata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=211961>
- Capellino, H. (2017e). Atajacaminos tijereta (*Hydropsalis torquata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=211957>
- Capellino, H. (2017f). Martín pescador mediano (*Chloroceryle amazona*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=200508>
- Capellino, H. (2017g). Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=233592>
- Capellino, H. (2017h). Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=231181>
- Capellino, H. (2017i). Cachilo de ceja amarilla (*Ammodramus humeralis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=230887>
- Capellino, H. (2017j). Diuca común (*Diuca diuca*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=233738>
- Capellino, H. (2018a). Playerito unicolor (*Calidris bairdii*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=296542>
- Capellino, H. (2018b). Playerito de rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=290250>
- Capellino, H. (2019a). Carpintero negro (*Dryocopus schulzi*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=368008>
- Capellino, H. (2019b). Pecho colorado (*Leistes superciliaris*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=367992>
- Capellino, H. (2019c). Espiguero pardo (*Asemospiza obscura*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=341825>
- Capllonch, P. (2007). Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina: Parte 1. Acta Zoológica Lilloana. 51(2), 151-160. https://www.researchgate.net/publication/275097564_Migraciones_de_especies_de_Tyrannidae_de_la_Argentina_Parte_1
- Capllonch, P. (2012). Datos de anillado del zorzalito boreal (*Catharus ustulatus swainsoni*) en el noroeste de Argentina. Nuestras Aves, 57, 11-13. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3TXM5Z3M2UlNJWVk/view>
- Capllonch, P. (2018). Un panorama de las migraciones de aves en Argentina. Hornero, 33(1), 1-18. <https://drive.google.com/file/d/1lkM0YAAVGQ7aXQS3NQHcLTMHuXw9sHu/view>
- Capllonch, P., Lobo, R. (2005). Contribución al conocimiento de la migración de tres especies de *Elaenia* de Argentina. Ornitología Neotropical, 16, 145-161. <https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/on/v016n02/p0145-p0162.pdf>
- Capllonch, P., Ortiz, D., Ruiz, C., Lobo Allende, R. (2005). Nuevos registros y observaciones de aves para las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Nuestras

- Aves, 50, 20-21. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3R0hHQlZVbDJReUU/view>
- Capllonch, P., Zelaya, P. (2006). Sobre la distribución y migración de la Mosqueta parda (*Lathrotriccus euleriargentinus*) en Sudamérica. *Ornitología Neotropical*, 17, 501-513. <https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/on/v017n04/p0501-p0514.pdf>
- Capllonch, P., Soria, K., Ortiz, D. (2008). Comportamiento migratorio del zorzal plomizo (*Turdus nigriceps nigriceps*) en Argentina. *Ornitología Neotropical*, 19, 161-174. <https://sora.unm.edu/sites/default/files/ON%20%2819%29%20161-174.pdf>
- Capllonch, P., Ortiz, D., Soria, K. (2009). Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina: Parte 2. *Acta Zoológica Lilloana*, 53(1-2), 77-97. http://www.lillo.org.ar/revis/zoo/2009/v53n12_a09.pdf
- Capllonch, P., Lobo Allende, R. (2013). Distribución de la martineta chaqueña (*Eudromia formosa formosa*) en la región chaqueña de la Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 113, 1-13. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-113.pdf>
- Capllonch, P., Alderete, C.A., Aráoz, R., Barboza, E., Mamaní, J.C., Ortiz, D., Pérez Bogado, W.E., Quiroga, O.B., Soria, k. (2015). Observaciones y capturas de aves poco conocidas en el norte de Argentina. *Nuestras Aves*, 60, 76-82. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9STjhrb2c3ZlQzQIk/view>
- Capovilla, P.H. (2018a). Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S48413310>
- Capovilla, P.H. (2018b). Monterita canela (*Poospiza ornata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S48413514>
- Capovilla, P.H. (2018c). Yal carbonero (*Porphyrositta carbonaria*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S48413514>
- Caziani, S.M., Protomastro, J.J. (1991). Nest and eggs of the Stripe-backed Antbird (*Myrmorchilus strigilatus*). *The Condor*, 93, 445-446. <https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/condor/v093n02/p0445-p0446.pdf>
- Chapman, F.M. (1940). The Post-Glacial History of *Zonotrichia capensis*. *Bulletin American Museum of Natural History*, 77, 381-438. <http://digitallibrary.amnh.org/handle/2246/876>
- Cejas, W.E. (2005). Primer registro del aguilucho negro (*Buteo albonotatus*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 49, 27-28. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3akNHUVQ2RDN0MTg/view>
- Codesido, M., Bilenca, D. (2004). Variación estacional de un ensamble de aves en un bosque subtropical semiárido del Chaco Argentino. *Biotropica*, 36(4), 544–554. http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/sipcyt/bfa004758.pdf
- Coles, P.C. (2015a). Sirirí de vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S26410558>
- Coles, P.C. (2015b). Macá gris (*Tachybaptus dominicus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S26410669>

- Collar, N.J., Gonzaga, L.P., Krabbe, N., Madroño Nieto, A., Naranjo, L.G., Parker, T.A., Wege, D.C. (1992). Threatened Birds of the Americas. The ICBP/IUCN Red Data Book. 3rd Edition, Part 2. U.K.: International Council for Bird Preservation, Cambridge.
- Coria, O.R. (2010). Primer registro documentado del Cóndor Andino (*Vultur gryphus*) en Sierras de Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves, 55, 46-47. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9SdXIBdmlZNHUXR1k/view>
- Coria, O.R. (2012a). Inventario de aves de la Reserva Natural Isla Tara Inti, Santiago del Estero, Argentina. Informe Técnico. Ciudad de Santiago del Estero: Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero.
- Coria, O.R. (2012b). Inventario de aves del Parque Provincial Copo, Santiago del Estero, Argentina. 2012. Informe Técnico. Ciudad de Santiago del Estero: Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero.
- Coria, O.R. (2014). Evaluación de tres modelos de la Teoría de Metacomunidades. Un estudio de caso con las comunidades de aves de la Sierra de Guasayán (Santiago del Estero, Argentina). Tesis Doctoral. Ciudad de Santiago del Estero: Universidad Nacional de Santiago del Estero. http://bcdigi.unse.edu.ar:8080/jspui/bitstream/123456789/7/1/0002-PoSFCF2014_Coria.pdf
- Coria, O.R. (2020). Urraca común (*Cyanocorax chrysops*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=423153>
- Coria, O.R., Heredia, J. (2012). Notas sobre la avifauna de la Sierra de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves, 57, 47-49. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9SdFpBajlNWl9CSWM/view>
- Coria, O.R., Gómez, N., Heredia, J., Quiroga, O., Carrizo, D.A., Ruiz, P., Herrera, M., Rojas, L.M. (2013). Nuevos aportes sobre la avifauna de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves, 58, 68-72. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9SajJZdGNKWVJqODA/view>
- Coria, O.R., Lima, J.J., Palacio, M.O., Roger, E., Albuja Carbonell, D.C. (2015a). Avifauna de la Reserva Urbana de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Quebracho, 23(1,2), 41-53. <https://fcf.unse.edu.ar/archivos/quebracho/v23n1a05.pdf>
- Coria, O.R., Heredia, J., Torres, R., Lima, J., Araujo, P., Zerda, H., Palacio, M., Roger, E. (2017). Lista de aves de la Sierra de Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. Nótulas Faunísticas - Segunda Serie, 212, 1-14. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-212.pdf>
- Coria, R.D., Coria, O.R. (ex aequo), Kunst, C.R. (2015b). Influencia del rolado selectivo de baja intensidad (RBI) sobre las comunidades de aves de bosques del Chaco Occidental. Ecología Austral, 25, 158-171. http://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecología_Austral/article/view/236/95
- Coria, R.D., Coria, O.R. (ex aequo), Kunst, C.R. (2016). Diversidad y composición de especies de aves en un gradiente bosque-arbustal-sabana del Chaco Semiárido, Argentina. Ornitología Neotropical, 27, 1-15. <https://journals.sfu.ca/ornneo/index.php/ornneo/article/view/6/pdf>
- Craig, A.J., Feare, C.J. (2009). Family Sturnidae (starlings). Vol.14. Bush-shrikes to Old World sparrows. En: Del Hoyo, J., Elliot, A., Christie, D.A. (eds.). Handbook of the birds of the world (pp. 654-758). Barcelona: Lynx Editions.

- De la Peña, M.R. (2013). Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/134_descarga_130_descarga_la_version_digital_del_libro.pdf
- De La Peña, M.R. (2020a). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 1: Rheidae, Tinamidae, Anhimidae Anatidae, Cracidae, Odontophoridae, Phasianidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 1, 1-300. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_239_tomo_1.pdf
- De La Peña, M.R. (2020b). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 2: Podicipedidae, Phoenicopteridae, Spheniscidae, Diomedeidae, Procellariidae, Hydrobatidae, Pelecanoididae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 2, 1-156. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_240_tomo_2.pdf
- De La Peña, M.R. (2020c). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 3: Ciconiidae, Fregatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Pelecanidae, Ardeidae, Threskiornithidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 3, 1-165. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_241_tomo_3.pdf
- De La Peña, M.R. (2020d). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 4: Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae, Aramidae, Rallidae, Heliornithidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 4, 1-255. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_242_tomo_4.pdf
- De La Peña, M.R. (2020e). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 5: Charadriidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Chionidae, Pluvianellidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Jacanidae, Rostratulidae, Stercorariidae, Laridae, Rynchopidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 5, 1-247. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_243_tomo_5.pdf
- De La Peña, M.R. (2020f). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 6: Columbidae, Cuculidae, Tytonidae, Strigidae, Nyctibiidae, Caprimulgidae, Apodidae, Trochilidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 6, 1-348. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_244_tomo_6.pdf
- De La Peña, M.R. (2020g). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 7: Trogonidae, Alcedinidae, Momotidae, Galbulidae, Bucconidae, Ramphastidae, Picidae, Cariamidae, Falconidae, Psittacidae, Thamnophilidae, Melanopareiidae, Conopophagidae, Grallariidae, Rhinocryptidae, Formicariidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Cien-

- cias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 7, 1-344. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_245_tomo_7.pdf
- De La Peña, M.R. (2020h). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 8: Furnariidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 8, 1-294. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_246_tomo_8.pdf
- De La Peña, M.R. (2020i). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 9: Tyrannidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 9, 1-441. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_247_tomo_9.pdf
- De La Peña, M.R. (2020j). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 10: Oxyruncidae, Cotingidae, Pipridae, Tityridae, Vireonidae, Corvidae, Hirundinidae, Troglodytidae, Polioptilidae, Donacobiidae, Ciclidae, Turdidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 10, 1-216. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_248_tomo_10.pdf
- De La Peña, M.R. (2020k). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 11: Mimidae, Sturnidae, Motacillidae, Thraupidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 11, 1-348. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_249_tomo_11.pdf
- De La Peña, M.R. (2020l). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 12: Emberizidae, Cardinalidae, Parulidae, Icteridae, Fringillidae, Passeridae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 12, 1-244. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_250_tomo_12.pdf
- De La Peña, M.R. (2020m). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Tomo 13: Bibliografía. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), 13, 1-233. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/331_descarga_251_tomo_13.pdf
- Delaloye, M. (2018). Cachirla chica (*Anthus lutescens*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S48388566>
- Di Giacomo, A.S., Di Giacomo, A. (2004). Extinción, Historia Natural y Conservación de las poblaciones del Yetapá de Collar (*Alectrurus risora*) en la Argentina. Ornitología Neotropical, 15 (Suppl.), 145-157. <https://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/on/v015s/p0145-p0158.pdf>
- Domnanovich, R. (2020a). Cónedor andino (*Vultur gryphus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S77161984>
- Domnanovich, R. (2020b). Milano pico de garfio (*Chondrohierax uncinatus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S77242841>
- Domnanovich, R. (2020c). Choca listada (*Thamnophilus doliatus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S71413317>

- Domnanovich, R. (2020d). Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S71851598>
- Ebel, A. (2017). Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S50909419>
- Echevarria, A.L., Fanjul, M.E., Marano, C.F., Martínez, M.V., Orce, M., Cocimano, M.C. (2011). Primer registro de la garza azul (*Egretta caerulea*) en los Bañados de Figueroa, un AICA de Santiago del Estero, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 55(2), 278-281. <http://www.lillo.org.ar/revis/zoo/2011/v55n2/v55n2a12.pdf>
- Echevarria, A.L., Martínez, M.V., Fanjul, M.E. (2017). The bird community of Bañados de Figueroa, an Important Aica of Santiago del Estero, Argentina. Book of abstracts. Ornithological Congress of the Americas. Puerto Iguazú, Argentina. http://afonet.org/2017iguazu/site/wp-content/uploads/OCA_abstracts.pdf
- Echevarria, A.L., Fanjul, M.E., Martínez, M.V., Benavidez, A. (2019). Avifauna de los Bañados de Añatuya, Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) de Santiago del Estero, Argentina. *El Hornero*, 34(2), 43-49. <https://drive.google.com/file/d/1z5i26nCqfP7RG5TxMh-GtWKSphsd5FTC/view>
- Eguia, P. (2019). Becasa de mar (*Limosa haemastica*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=340394>
- Eguia, P. (2020). Atajacaminos ñañarca (*Systellura longirostris*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=372376>
- Enggist, S. (2018a). Pollona pintada (*Porphyrriops melanops*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49230493>
- Enggist, S. (2018b). Gallareta de escudete rojo (*Fulica rufifrons*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49207339>
- Enggist, S. (2018c). Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49207339>
- Enggist, S. (2018d). Cardenilla (*Paroaria capitata*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49207339>
- Enggist, S. (2019a). Espinero de frente rojiza (*Phacellodomus rufifrons*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S62153283>
- Enggist S. (2019b). Golondrina de rabadilla canela (*Petrochelidon pyrrhonota*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S62153283>
- Ferrari, C., Güller, R., Rodríguez Elías, P., Vitale, S. (2004). Notas sobre la avifauna en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, Argentina. *Nuestras Aves*, 48, 14-16. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3MzBDNmtuX2oybjQ/view>
- Ferrari, C., Güller, R., Monteleone, D., López-Lanús, B. (2006). Nuevos aportes sobre la avifauna de las Sierras de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 52, 8-10. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3RHdldndDdmszZlk/view>
- García, F. (2014a). Garza azul (*Egretta caerulea*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=50128>
- García, F. (2014b). Golondrina tijerita (*Hirundo rustica*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=74389>
- García, F. (2014c). Cardenilla (*Paroaria capitata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=50001>

- Giménez, A.M., Abraham, F. (1987). Notas preliminares sobre la formación boscosa de las Sierras de Guasayán, Santiago del Estero. Algunos aspectos dendrológicos. Acta del IV Jornadas Técnicas Bosques Nativos degradados. El Dorado, Misiones. 51-81 pp.
- Gómez, N. (2011). Primer registro de garza azul (*Egretta caerulea*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista, 1(17), 1-4. http://www.ecoregistros.org/site/articulos/EcoRegistros_N17-PRIMER-REGISTRO-DE-GARZA-AZUL-Egretta-caerulea-EN-LA-PROVINCIA-DE-SANTIAGO-DEL-ESTERO-ARGENTINA.pdf
- Gómez, N. (2011a). Gavilán ceniciente (*Circus cinereus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=9468>
- Gómez, N. (2011b). Aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=8973>
- Gómez, N. (2011c). Gallareta de ligas rojas (*Fulica armillata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=9461>
- Gómez, N. (2011d). Gaviota capuchón gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=9322>
- Gómez, N. (2011e). Urutaú común (*Nyctibius griseus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=9602>
- Gómez, N. (2011f). Chotoy (*Schoeniophylax phryganophilus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=9692>
- Gómez, N. (2011g). Cachudito de pico amarillo (*Anairetes flavirostris*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=9943>
- Gómez, N. (2011h). Dormilona de cara negra (*Muscisaxicola maclovianus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=10049>
- Gómez, N. (2012a). Golondrina barranquera (*Pygochelidon cyanoleuca*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13458>
- Gómez, N. (2012b). Golondrina doméstica (*Progne chalybea*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13590>
- Gómez, N. (2012c). Golondrina patagónica (*Tachycineta leucopyga*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13472>
- Gómez, N. (2012d). Golondrina zapadora (*Riparia riparia*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13484>
- Gómez, N. (2012e). Zorzal chiguancó (*Turdus chiguanco*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13435>
- Gómez, N. (2012f). Cachirla de uña corta (*Anthus furcatus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13640>
- Gómez, N. (2012g). Cachirla común (*Anthus correndera*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13639>
- Gómez, N. (2012h). Pecho colorado (*Leistes superciliaris*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13615>
- Gómez, N. (2012i). Piquito de oro común (*Catamenia analis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13384>
- Gómez, N. (2012j). Volatinero (*Volatinia jacarina*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=14033>

- Gómez, N. (2012k). Corbatita dominó (*Sporophila collaris*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13414>
- Gómez, N. (2012l). Corbatita overo (*Sporophila lineola*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13401>
- Gómez, N. (2013). Garza azul (*Egretta caerulea*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=23451>
- Gómez, N. (2014a). Gaviota capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=35121>
- Gómez, N. (2014b). Tuyuyú (*Mycteria americana*) EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=47849>
- Gómez, N. (2014c). Piojito gris (*Serpophaga nigricans*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=45316>
- Gómez, N. (2014d). Varillero de alas amarillas (*Agelasticus thilius*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=34678>
- Gómez Umpierrez, W.L. (2018). Doradito pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=298361>
- Gorleri, F. (2018). Jote real (*Sarcoramphus papa*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49701489>
- Hartert, E., Venturi, S. (1909). Notes sur les oiseaux de la République Argentine. Novit. Zool. 16, 159-267.
- Heredia J. (2011). Informe Ornitológico de las Lagunas Saladas de Santiago del Estero, Argentina. Informe Técnico. Ciudad de Santiago del Estero: Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero.
- Hulsberg, H. (2009a). Remolinera serrana (*Cinclodes comechingonus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S47596079>
- Hulsberg, H. (2009b). Monterita canela (*Poospiza ornata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S47593919>
- Hulsberg, H. (2009c). Piquito de oro común (*Catamenia analis*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S47593628>
- Hulsberg, H. (2017). Carpintero campestre (*Colaptes campestris*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S47572238>
- Hulsberg, H. (2019). Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S57868006>
- Ibarra, R. (2020). Saíra dorada (*Hemithraupis guira*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=402378>
- La Grotteria, J. (2014a). Garza azul (*Egretta caerulea*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=62499>
- La Grotteria, J. (2014b). Doradito pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/audio.php?id=974>
- Layus, J. (2015). Gallito de collar (*Melanopareia maximiliani*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S26500330>
- Lobo Allende, R., Caplonch, P. (2016). Notas ecológicas sobre la martineta chaqueña (*Eudromia formosa*). Historia Natural - Tercera Serie, 6(1), 25-39. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/revista-historia-natural/tomo-11/historia-natural-2016-1-art-03.pdf>

- López de Casenave, J., Peltto, J.P., Caziani, S.M., Mermoz, M., Protomastro, J. (1998). Responses of avian assemblages to a natural edge in Chaco semiarid forest in Argentina. *The Auk*, 115(2), 425-435. <https://academic.oup.com/auk/article/115/2/425/5173297>
- López, J. J. (2012). Gaviota chica (*Leucophaeus pipixcan*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=11408>
- López-Lanús, B. (2020). Guía Audiornis de las aves de Argentina, fotos y sonidos: identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Edición de campo. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina.
- Lucero, M.M. (1982). El anillado de aves en la República Argentina. Fundación Miguel Lillo. Miscelania, 74, 1-35.
- Luna, H., Manassero, M. (2008). Nuevos registros de aves para Santa Fe y Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 53, 12-13. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3bElZYXRyWmw3Tm8/view>
- MAyDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina). (2017). Categorización de las Aves de la Argentina. Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas. Buenos Aires: MAyDS y AA. <https://avesargentinas.org.ar/sites/default/files/Categorizacion-de-aves-de-la-Argentina.pdf>
- Monteleone, D. (2016). Yal carbonero (*Porphyrospiza carbonaria*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S31346763>
- Masuzzo, G. (2019). Pato real (*Cairina moschata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=300970>
- Menegaux, A. (1925). Etude d'une collection d'oiseaux faite par M.E. Wagner dans le chaco argentin. *Rev. Franc. Ornith.*, 9, 221-238, 279-297, 322-329.
- Michelutti, P., Torres, R. (2006). Nuevos registros y comentarios sobre aves acuáticas escasas o fuera de su rango de distribución conocido en el centro de Argentina. *Nuestras Aves*, 51, 32-34. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3WkpwYmNvbnlSZ2M/view>
- Minetti, J.L. (1999). Atlas Climático del Noroeste Argentino. Tucumán: Laboratorio Climatológico Sudamericano.
- Muñiz, E. (2013). Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=24335>
- Narosky, T., Yzurieta, D. (2003). Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Navarro, J.L. (2012a). Doradito pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=13927>
- Navarro, J.L. (2012b). Cardenilla (*Paroaria capitata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=12641>
- Navarro, J.L. (2013a). Martín pescador mediano (*Chloroceryle amazona*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=25064>
- Navarro, J.L. (2013b). Viudita chica (*Knipolegus hudsoni*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=22616>
- Navarro, J.L. (2015a). Pato zambullidor chico (*Oxyura vittata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=89985>

- Navarro, J.L. (2015b). Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=101569>
- Navarro, J.L. (2015c). Parina grande (*Phoenicoparrus andinus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=162815>
- Navarro, J.L. (2015d). Añapero boreal (*Chordeiles minor*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S26553769>
- Navarro, J.L. (2015e). Atajacaminos colorado (*Antrostomus rufus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/audio.php?id=1498>
- Navarro, J.L. (2015f). Viudita chica (*Knipolegus hudsoni*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=115137>
- Navarro, J.L. (2015g). Golondrina patagónica (*Tachycineta leucopyga*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=100624>
- Navarro, J.L. (2015h). Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=102435>
- Navarro, J.L. (2015i). Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S26553769>
- Navarro, J.L. (2015j). Cachilo de ceja amarilla (*Ammodramus humeralis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=116200>
- Navarro, J.L. (2016a). Pato capuchino (*Spatula versicolor*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S32178670>
- Navarro, J.L. (2016b). Pato gargantilla (*Anas bahamensis*). eBird <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S26816472>
- Navarro, J.L. (2016c). Pato gargantilla (*Anas bahamensis*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S28526280>
- Navarro, J.L. (2016d). Pato gargantilla (*Anas bahamensis*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S31775122>
- Navarro, J.L. (2016e). Pato gargantilla (*Anas bahamensis*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S38762256>
- Navarro, J.L. (2016f). Pato de cabeza negra (*Heteronetta atricapilla*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S29659408>
- Navarro, J.L. (2016g). Macá gris (*Tachybaptus dominicus*). eBird. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=147693>
- Navarro, J.L. (2016h). Urutaú común (*Nyctibius griseus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S27142683>
- Navarro, J.L. (2016i). Carau (*Aramus guarauna*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S33006643>
- Navarro, J.L. (2016j). Gallareta de ligas rojas (*Fulica armillata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S28009996>
- Navarro, J.L. (2016k). Gallareta de ligas rojas (*Fulica armillata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S32160297>
- Navarro, J.L. (2016l). Gallareta de escudete rojo (*Fulica rufifrons*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S26641569>
- Navarro, J.L. (2016m). Playero zancudo (*Calidris himantopus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S31981880>
- Navarro, J.L. (2016n). Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S38321182>

- Navarro, J.L. (2016ñ). Rayador (*Rynchops niger*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S29660783>
- Navarro, J.L. (2016o). Atí (*Phaetusa simplex*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S28010926>
- Navarro, J.L. (2016p). Tuyuyú (*Mycteria americana*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S31779175>
- Navarro, J.L. (2016q). Hocó colorado (*Tigrisoma lineatum*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S31427921>
- Navarro, J.L. (2016r). Choca listada (*Thamnophilus doliatus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S32178670>
- Navarro, J.L. (2016s). Remolinera común (*Cinclodes fuscus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S30206067>
- Navarro, J.L. (2016t). Fiofío grande (*Elaenia spectabilis*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S33006643>
- Navarro, J.L. (2016u). Cachudito de pico amarillo (*Anairetes flavirostris*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S31775785>
- Navarro, J.L. (2016v). Piojito gris (*Serpophaga nigricans*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S28867247>
- Navarro, J.L. (2016w). Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S31779175>
- Navarro, J.L. (2016x). Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*). eBird. <https://ebird.org/org/checklist/S29824302>
- Navarro, J.L. (2016y). Cachirla chica (*Anthus lutescens*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S27548626>
- Navarro, J.L. (2016z). Varillero de alas amarillas (*Agelasticus thilius*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S32160297>
- Navarro, J.L. (2016aa). Monterita canela (*Poospiza ornata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S31427128>
- Navarro, J.L. (2016ab). Cardenilla (*Paroaria capitata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S31775122>
- Navarro, J.L. (2016ac). Cardenilla (*Paroaria capitata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S31095779>
- Navarro, J.L. (2016ad). Volatinero (*Volatinia jacarina*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S27813439>
- Navarro, J.L. (2016ae). Corbatita overo (*Sporophila lineola*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S27548626>
- Navarro, J.L. (2017a). Martineta chaqueña (*Eudromia formosa*). eBird. <https://ebird.org/org/view/checklist/S35318996>
- Navarro, J.L. (2017b). Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S38762256>
- Navarro, J.L. (2017c). Pato barcino (*Anas flavirostris*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S36463998>
- Navarro, J.L. (2017d). Pato maicero (*Anas georgica*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S35833014>
- Navarro, J.L. (2017e). Flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*). eBird. <https://ebird.org/org/checklist/S34948047>

- Navarro, J.L. (2017f). Macá plateado (*Podiceps occipitalis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=198554>
- Navarro, J.L. (2017g). Ñacundá (*Chordeiles nacunda*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S34399157>
- Navarro, J.L. (2017h). Carau (*Aramus guarauna*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S3517040>
- Navarro, J.L. (2017i). Pollona pintada (*Porphyrriops melanops*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S35958614>
- Navarro, J.L. (2017j). Gallareta de escudete rojo (*Fulica rufifrons*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S36252002>
- Navarro, J.L. (2017k). Atí (*Phaetusa simplex*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S34944134>
- Navarro, J.L. (2017l). Tuyuyú (*Mycteria americana*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S36463998>
- Navarro, J.L. (2017m). Rayador (*Rynchops niger*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S35651687>
- Navarro, J.L. (2017n). Rayador (*Rynchops niger*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S37146730>
- Navarro, J.L. (2017ñ). Espátula rosada (*Platalea ajaja*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S37420454>
- Navarro, J.L. (2017o). Águila negra (*Buteogallus urubitinga*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S36463998>
- Navarro, J.L. (2017p). Aguilucho de alas largas (*Geranoaetus albicaudatus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S35490145>
- Navarro, J.L. (2017q). Remolinera común (*Cinclodes fuscus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S36635925>
- Navarro, J.L. (2017r). Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomeus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S36463998>
- Navarro, J.L. (2017s). Boyero negro (*Cacicus solitarius*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S38515850>
- Navarro, J.L. (2017t). Sietevestidos serrano (*Poospiza whitii*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S37049667>
- Navarro, J.L. (2017u). Diuca común (*Diuca diuca*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S37799818>
- Navarro, J.L. (2017v). Cardenilla (*Paroaria capitata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S37146730>
- Navarro, J.L. (2017w). Yal carbonero (*Porphyrositta carbonaria*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S37049667>
- Navarro, J.L. (2017x). Corbatita overo (*Sporophila lineola*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S34399157>
- Navarro, J.L. (2018a). Pato media luna (*Spatula discors*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S48401661>
- Navarro, J.L. (2018b). Pato colorado (*Spatula cyanoptera*). eBird. <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S49039171>
- Navarro, J.L. (2018c). Pato barcino (*Anas flavirostris*). eBird. <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S49039171>

- Navarro, J.L. (2018d). Pato maicero (*Anas georgica*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S48401661>
- Navarro, J.L. (2018e). Pato maicero (*Anas georgica*). eBird. <https://ebird.org/view/checklist/S41984467>
- Navarro, J.L. (2018f). Pato picazo (*Netta peposaca*). eBird. <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S48103808>
- Navarro, J.L. (2018g). Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S44626789>
- Navarro, J.L. (2018h). Gallareta de ligas rojas (*Fulica armillata*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S29957623>
- Navarro, J.L. (2018i). Gallareta de ligas rojas (*Fulica armillata*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49039171>
- Navarro, J.L. (2018j). Gaviota capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S48401661>
- Navarro, J.L. (2018k). Gaviota capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S45986595>
- Navarro, J.L. (2018l). Choca listada (*Thamnophilus doliatus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49206522>
- Navarro, J.L. (2018m). Curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomeus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49039171>
- Navarro, J.L. (2018n). Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S49039171>
- Navarro, J.L. (2018ñ). Anambé común (*Pachyramphus polychopterus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S41984467>
- Navarro, J.L. (2019a). Cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S62346898>
- Navarro, J.L. (2019b). Pato capuchino (*Spatula versicolor*). eBird. <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S52842051>
- Navarro, J.L. (2019c). Gavotín lagunero (*Sterna trudeaui*). ebird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S59089575>
- Navarro, J.L. (2019d). Espinero de frente rojiza (*Phacellodomus rufifrons*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S56260336>
- Navarro, J.L. (2019e). Piojito picudo (*Inezia inornata*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=366887>
- Navarro, J.L. (2019f). Golondrina doméstica (*Progne chalybea*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S62346898>
- Navarro, J.L. (2019g). Zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S59293594>
- Navarro, J.L. (2020a). Pato crestudo (*Sarkidiornis sylvicola*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S74717267>
- Navarro, J.L. (2020b). Jabirú (*Jabiru mycteria*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S77253461>
- Navarro, J.L. (2020c). Águila negra (*Buteogallus urubitinga*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S71175833>
- Navarro, J.L. (2020d). Batará estriado (*Myrmorchilus strigilatus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S74067978>

- Navarro, J.L. (2020e). Remolinera serrana (*Cinclodes comechingonus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S72262759>
- Navarro, J.L. (2020f). Tachurí sietecolores (*Tachuris rubrigastra*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S72489010>
- Navarro, J.L. (2020g). Varillero de alas amarillas (*Agelasticus thilius*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S73854671>
- Navarro, J.L. (2021a). Burrito común (*Laterallus melanophaius*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S82309304>
- Navarro, J.L. (2021b). Capuchino canela (*Sporophila hypoxantha*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S82177556>
- Navarro, J.L. (2021c). Capuchino de garganta café (*Sporophila ruficollis*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S82043114>
- Navas, J.R. (1965). Notas sobre *Aimophila strigiceps* y su distribución geográfica. El Hornero, 10(3), 215-224. https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/hornero/hornero_v010_n03_p215.pdf
- Navas, J.R. (1971). Estudios sobre la avifauna andinopatagónica. 1. Géneros *Upucerthia*, *Ochetorhynchus* y *Eremobius* (Furnariidae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool., 11, 267-304.
- Navas, J.R., Bó, N.A. (1981). Nuevas aportaciones a la taxonomía de las razas geográficas de *Eudromia elegans* y *Eudromia formosa*. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. B. Rivadavia e Inst. Nac. Inv. Cienc. Nat., Ser. Zool. T, 11, 31-59.
- Neme, A.M. (2019). Herramientas para el Monitoreo Participativo de Fauna Silvestre en la Reserva Campesina de la UPPSAN, Santiago del Estero. Piloto con metodología RAPELD. Trabajo Final de Grado. Ciudad de Santiago del Estero: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
- Neumann, R. (2019). Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*). eBird. <https://ebird.org/checklist/S56398149>
- Nores, M., Yzurieta, D. (1981). Nuevas localidades para aves Argentinas. Historia Natural, 2(5), 33-42.
- Nores, M., Yzurieta, D. (1982). Nuevas localidades para aves Argentinas. Parte II. Historia Natural, 2(13), 101-104.
- Nores M., Cerana, M.M. (1990). Biogeography of forest relicts in the mountains of northwestern Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, 63, 37-46. http://rchn.biologiacile.cl/pdfs/1990/1/Nores_&_Cerana_1990.pdf
- Nores, M., Yzurieta, D., Salvador, S.A. (1991). Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs. Córdoba, 59, 157-196.
- Olrog, C.C. (1953). Sobre las aves del noroeste argentino. El Hornero, 10(1), 84-85. <https://www.avesargentinas.org.ar/el-hornero-volumen-10-n%C3%BAmero-1>
- Olrog, C.C. (1959). Las aves argentinas. Una guía de campo. Tucumán: Inst. Miguel Lillo.
- Olrog, C.C. (1963). Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana, 9, 1-377.
- Olrog, C.C. (1965). Diferencias en el ciclo sexual de algunas aves. El Hornero, 10, 269-272.
- Olrog, C.C. (1972). Notas ornitológicas VIII sobre la colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana, 26(18), 269-274.

- Olrog, C.C. (1979). Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27, 1-324.
- Ortiz, D., Caplonch, P. (2010). La migración del volatinero *Volatinia jacarina jacarina* Linné 1766 (Emberizidae: aves). *kempffiana*, 6(1), 38-42. [http://museon-ekempff.org/sitio/Informacion/KEMPFFIANA/Kempffiana%206\(1\)/38-42_Ortiz_&_Caplonch.pdf](http://museon-ekempff.org/sitio/Informacion/KEMPFFIANA/Kempffiana%206(1)/38-42_Ortiz_&_Caplonch.pdf)
- Ortiz, D., Caplonch, P. (2011). La migración del Chingolo (*Zonotrichia capensis*) en Argentina. *Historia Natural - Tercera Serie*, 1, 105-109. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/revista-historia-natural/tomo-01/historia-natural-2011-1-art-08.pdf>
- Ortiz, D., Mamani, J., Moreno Ten, T., Quiroga, O., Alderete, C. (2012). Nuevos registros del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la provincia de Santiago del Estero. *Biológica*, 15, 87-90.
- Pagano, L.G., Bodrati, A., Jensen, R. (2017). Estatus del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en Buenos Aires y nuevos registros para otras provincias argentinas. *Nuestras Aves*, 62, 3-7. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9STmMwc1JsaVdjVnM/view>
- Pagot, M. (2003). Análisis y simulación hidrológica del sistema Bañados del Río Dulce. Trabajo Final de Maestría. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Paulini, H., Torres, R., Villalba, S., Michelutti, M., Lépez, M. (2015). Presencia del Jote Cabeza Amarilla (*Cathartes burrovianus*) en el Chaco Seco argentino. *Nótulas Faunísticas - Segunda Serie*, 187, 1-5. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-187.pdf>
- Pauro, C. (2014). Rayador (*Rynchops niger*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=55823>
- Pereyra, J.A. (1938). Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. *Memorias del Jardín Zoológico*, 9(2), 1-304.
- Pereyra, J.A. (1950). Avifauna argentina (contribución a la ornitología). El Hornero, 9, 178-241. https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/hornero/hornero_v009_n02_p178.pdf
- Quiroga, O.B. (2014a). Aportes a la distribución y reproducción del Chiricote (*Aramides cajaneus*) en Santiago del Estero, Argentina. *Biológica*, 17, 58-59. http://www.museoameghino.gob.ar/archivos/repositorios/157_descarga_124_.pdf
- Quiroga, O.B. (2014b). Primeros registros documentados del Sietevestidos Serrano (*Poospiza whitii*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista 4(9), 29-31. http://www.ecoregistros.org/site/articulos/EcoRegistros4_N9-Primeros-registros-documentados-del-Sietevestidos-Serrano-Poospiza-whitii-en-la-provincia-de-Santiago...pdf
- Quiroga, O.B. (2016). Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en ciudad capital, Santiago del Estero. *Nuestras Aves*, 61, 20. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9SMkpqbHJNSjg1bTA/view>
- Quiroga, O.B. (2017). Presencia del Burrito Pico Rojo (*Mustelirallus erythrops*) en Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista, 7(8), 29-31.
- Quiroga O.B. (2018). Siete aves poco frecuentes en Santiago del Estero y Tucumán, Argentina. *Nuestras Aves*, 63, 36-38. <https://drive.google.com/file/d/15UfRUaOgz14359pbzuBZszweu69TSnvs/view>

- Quiroga, O.B. (2019). Comentarios sobre nueve especies de aves de Santiago del Estero y Tucumán, Argentina. Nótulas Faunísticas - Segunda Serie, 274, 1-4. <https://fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-274.pdf>
- Quiroga, O.B. (2020) ¿El estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) coloniza la provincia de Santiago del Estero, Argentina? Historia Natural - Tercera Serie, 10(3), 103-112. https://fundacionazara.org.ar/img/revista-historia-natural/tercera-serie-volumen-10-3-2020/HN%2010_3%20Articulo%208_%20103-112.pdf
- Quiroga, O.B., Llugdar, J.E. (2015). Nuevos registros del macá plateado (*Podiceps occipitalis occipitalis*) en Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista, 5(2), 4-5. http://www.ecoregistros.org/site/articulos/EcoRegistros5_N2-Nuevos-registros-del-Maca-Plateado-Podiceps-occipitalis-occipitalis-en-Santiago-del-Ester-Argentina.pdf
- Quiroga, O.B., Llugdar, J.E. (2019a). Primeros registros de nidificación para veintiuna especies de aves en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista, 9(7), 28-40. http://www.ecoregistros.org/site/articulos/EcoRegistros9_N7-Primeros-registros-de-nidificacion-para-veintiuna-especies-de-aves-en-la-provincia-de-Santiago-del-Ester-Argentina.pdf
- Quiroga, O.B., Llugdar, J.E. (2019b). Distribución y reproducción del Urutau Común (*Nyctibius griseus*) en Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista, 9(6), 21-27. https://www.ecoregistros.org/site/articulos/EcoRegistros9_N6-Distribucion-y-reproduccion-del-Urutau-Comun-Nyctibius-griseus-en-Santiago-del-Ester-Argentina.pdf
- Quiroga, O.B., Llugdar, J.E. (2019c). Cardenilla (*Paroaria capitata*) nidificando en Santiago del Estero. Nuestras Aves, 64, 24. https://drive.google.com/file/d/1EPolzF0iYit12sSYDvwoG330Vh_gb_J/view
- Quiroga, O.B., Navarro, J.L. (2020). Primer registro de reproducción del atajacaminos tijera (*Hydropsalis torquata*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. EcoRegistros Revista, 10(3), 8-12. http://www.ecoregistros.org/site/articulos/EcoRegistros10_N3-Primer-registro-de-reproduccion-del-Atajacaminos-Tijera-Hydropsalis-torquata-en-la-provincia-de-Santiago....pdf
- Quiroga, O.B., Coria, O.R., Gómez, N., Chimino, G., Jorge, F., Rojas, L.M., Llugdar, J.E., Alcalde, M. (2015). El gavotín negro (*Chlidonias niger*) y el burrito común (*Laterallus melanophaius*) en Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves, 60, 59-60. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWlRsQDu9SRTVEaGszX2Y2aWM/view>
- Quiroga, O.B., Caplonch, P., Pérez Bogado, W.E., Soria, K. (2016). Primeros registros y aportes a la distribución de la avifauna de Santiago del Estero, Argentina. Nuestras Aves, 61, 49-53. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3c1VxZEpkRUpBQk0/view>
- Quiroga, O.B., Caplonch, P., Pérez Bogado, W.E., Navarro, J.L., Llugdar, J.E., Soria, K. (2017). Notas sobre aves de Santiago del Estero, Argentina. Nótulas Faunísticas - Segunda Serie, 214, 1-6. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-214.pdf>
- Quiroga, O.B., Aveldaño, W.S., Mamaní, J.C., Pastur, E.M., Moreno Ten, T. (2020). Notas sobre veintidós especies de aves del noroeste argentino. Nótulas Faunís-

- ticas - Segunda Serie, 285, 1-7. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-285.pdf>
- Remsen, J.V., Areta, J.I., Bonaccorso, E., Claramunt, S., Jaramillo, A., Lane, D.F., Pacheco, J.F., Robbins, M.B., Stiles, F.G., Zimmer, K.J. Version (2021). A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society. Versión: 16 de Marzo de 2021. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACC-Baseline.htm>
- Roesler, I. (2003). El Aguilucho de cola corta (*Buteo brachyurus*) en la región chaqueña argentina. *El Hornero*, 18(02), 123-126. <https://core.ac.uk/download/pdf/70306858.pdf>
- Rupp, A.E. (2019). Piojito picudo (*Inezia inornata*). eBird. <https://ebird.org/brasil/checklist/S52761609>
- Saggese, M.D., De Lucca, E.R., Krapovickas, S.F., Haene, E.H. (1996). Presencia del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en Argentina y Uruguay. *El Hornero*, 14(3), 44-49. <https://www.avesargentinas.org.ar/el-hornero-volumen-14-n%C3%BAmero-3>
- Salvador, S.A. (1988). Datos de peso de aves argentinas. *El Hornero*, 13(1), 78-83. <https://drive.google.com/file/d/0B2uW1RsQDu9SUzhpMndEd1RObVE/view>
- Salvador, S., Eroles, P. (1994). Notas sobre aves de Santiago del Estero. *Nuestras Aves*, 30, 24-25. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3V2lmVUk2RDlyWjg/view>
- Salvador, S.A., Di Giacomo, A.G. (2014). Datos de pesos de aves argentinas. Parte 3. Historia Natural - Tercera serie, 4(2), 63-88. <https://www.fundacionazara.org.ar/img/revista-historia-natural/tomo-08/historia-natural-2014-2-art-04.pdf>
- Sánchez, R., Blendinger, P.G., Xuereb, A., Lougheed, S.C. (2018). Extra-pair paternity in a socially monogamous Neotropical tanager, the Ringed Warbling-finches *Poospiza torquata*. *Acta Ornithologica*, 52(2), 197-208. <http://www.bioone.org/doi/full/10.3161/00016454AO2017.52.2.007>
- Schlemmer, J. (2018). Capuchino de garganta café (*Sporophila ruficollis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=302180>
- Schmidt, C. (2020). Doradito pardo (*Pseudocolopteryx dinelliana*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=399255>
- Seipke, S.H., Clark, W.S. (2008). Primer registro documentado de Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 53, 35. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3VkJ1MDRqYjBQV0k/view>
- Sferco, G.D., Baldo, J.L. (1995). Nuevos registros de aves poco frecuentes para Santiago del Estero. *El Hornero*, 14(1-2), 78-79. <https://www.avesargentinas.org.ar/sites/default/files/documentos/V14N1.pdf>
- Short, L.L. (1975). A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 154(3), 163-352. <http://digitallibrary.amnh.org/handle/2246/608>
- Soria, K., Zelaya, P., Ortiz, D., Caplonch, P. (2012). Breve análisis de la avifauna de Pozo Hondo, Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 57, 3-8. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3MExmWVUwT0x2RzQ/view>
- Spinuzza, J.M. (2017). Primer registro de Carpintero Dorado Común (*Piculus chrysochloros*) en el Parque Nacional Copo, provincia de Santiago del Estero, Ar-

- entina. Nótulas Faunísticas - Segunda Serie, 221. <https://fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/tomo08/notulas-tomo-8-ss2017.pdf>
- Steullet, A.B., Deautier, E.A. (1935-1946). Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. Obra Cinc. Mus. La Plata, 1, 1-1006.
- Straneck, R. (2007). Una nueva especie de *Serpophaga* (Aves: Tyrannidae). Revista FAVE, Ciencias Veterinarias, 6(1-2), 31-42. <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEveterinaria/article/view/1440/2304>
- Teran, A. (2015). Garza azul (*Egretta caerulea*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=84334>
- Teran, A. (2018). Pato crestudo (*Sarkidiornis sylvicola*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=248159>
- TNC (The Nature Conservancy), FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina), DeS-del Chaco (Fundación para el Desarrollo Sustentable del Chaco), WCS (Wildlife Conservation Society Bolivia). (2005). Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano / Gran Chaco Americano. Buenos Aires: Fundación Vida Silvestre. <https://wwfar.awsassets.panda.org/downloads/dossier.pdf>
- Torres, R., Michelutti, P. (2001a). Las aves de ambientes acuáticos del sistema Laguna Mar Chiquita – Bañados del Río Dulce (provincias de Córdoba y Santiago del Estero, Argentina). Boletín Academia Nacional Ciencias, 66, 61-73.
- Torres, R., Michelutti, P. (2001b). Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. Nótulas Faunísticas – Segunda Serie, 1, 1-5.
- Torres R.M., Michelutti, P. (2006). Aves Acuáticas. En: Bucher, E.H. (ed.), Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (pp. 237-249). Córdoba: Academia Nacional de Ciencias. https://www.promarmarchiquita.com.ar/documentos/archivos/capitulo_aves_acuaticas.pdf
- Torres, R., Michelutti, P., León, J., Bruno, G., Cejas, W. (2006). Nuevas citas y comentarios sobre rapaces en la región central de Argentina (provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). Nuestras Aves, 52, 13-16. <https://drive.google.com/file/d/0B2f9VJbAiGt3cW1FcFJyYW1WdFk/view>
- Torres, R., Michelutti, P., Dominino, J., León, J., Mangeaud, A., Rodríguez, A., Pozzi, C., Plencovich, G., Pagot, M., Hillman, G. (2010). Effects of weather and water level on reproduction of colonial waterbirds in Laguna Mar Chiquita – Bañados del Río Dulce (Central Argentina). Ornitología Neotropical, 21, 383-396. <https://sora.unm.edu/sites/default/files/ON%2021%20%283%29%20383-396.pdf>
- Trucco, C.E., Caziani, S.M. (2008). Remoción de semillas en un borde inducido por un incendio forestal en el Chaco semiárido argentino. Ecosistemas, 17(1), 123-133. <https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/487>
- Villegas, F.J. (2018). Viudita chica (*Knipolegus hudsoni*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=260981>
- Vivas, E.M. (2016). Gallineta overa (*Pardirallus maculatus*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=175347>
- Vivas, E.M. (2017a). Pato crestudo (*Sarkidiornis sylvicola*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=217557>
- Vivas, E.M. (2017b). Urutaú común (*Nyctibius griseus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S66883154>

- Vivas, E.M. (2017c). Atí (*Phaetusa simplex*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=215275>
- Vivas, E.M. (2017d). Aguilucho colorado (*Buteogallus meridionalis*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=215277>
- Vivas, E.M. (2017e). Lechuzón orejudo (*Asio clamator*). EcoRegistros. <http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=229477>
- Vivas, E.M. (2017f). Batará estriado (*Myrmorchilus strigilatus*). eBird. <https://ebird.org/argentina/checklist/S66883154>
- Weller, M.W. (1967). Distribution and habitat selection of the Black-headed Duck (*Heteronetta atricapilla*). El Hornero, 10 (4), 299-306. <https://www.avesargentinas.org.ar/el-hornero-volumen-10-n%C3%BAmero-4>
- Wionczak, M.J., Pradier, L.S., Krause, L.O., Pavese, N. (2018). La Monjita Rabadilla Blanca (*Xolmis velatus*), una nueva especie para la Argentina. Nuestras Aves, 63, 8-10. <https://drive.google.com/file/d/1yF3NyCRUxsga—JT-tZ9cGgWkad-q9UM0/view>
- Zimmer, J.T. (1955). Further Notes on Tyrant Flycatchers (Tyrannidae). American Museum Novitates, 1749, 1-24. <http://digilibRARY.amnh.org/bitstream/handle/2246/5403/v2/dspace/ingest/pdfSource/nov/N1749.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Zotta, A.R. (1939). Lista sistemática de las aves argentinas. El Hornero, 7, 299-326. <https://drive.google.com/file/d/0B2uWIRsQDu9SWVFabEd0M0RJZzA/view>
- Zotta, A.R. (1944). Lista sistemática de las aves argentinas. Buenos Aires: Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Apéndice 1. Ordenado por departamentos, se especifican las coordenadas geográficas de los lugares de registros de las aves en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Para los lugares que abarcan más de un departamento, se asigna la coordenada del centro del lugar.

Appendix 1. The geographic coordinates of the places where birds were recorded in the Argentinian province of Santiago del Estero are specified and ordered by departments. For places spanning more than one department, the coordinates of the center locations are assigned.

Departamentos	Lugares	Coordenadas geográficas
Copo	Áreas Protegidas de Copo	25°45'08"S – 61°49'19"O
	El Caburé	26°01'02"S – 62°20'06"O
	Los Pirpintos	26°07'58"S – 62°03'54"O
	Los Tigres	25°54'25"S – 62°36'16"O
	Monte Quemado	25°48'23"S – 62°49'46"O
	Pampa de los Guanacos	26°13'57"S – 61°50'22"O
	Urutau	25°42'47"S – 63°02'34"O
Pelegrini	Ahí Veremos	25°52'07"S – 63°58'08"O
	Nueva Esperanza	26°12'07"S – 64°14'22"O
	Río Urueña	26°15'21"S – 64°25'41"O
	Santo Domingo	26°12'58"S – 63°46'39"O
Alberdi	Sachayoj	26°40'38"S – 61°48'49"O
	Santos Lugares	26°41'41"S – 63°33'19"O
Jiménez	Ardiles	27°24'32"S – 64°29'54"O
	Isca Yacú	27°01'44"S – 64°36'43"O
	Pozo Hondo	27°09'53"S – 64°29'20"O
Figueroa	Laguna de J. Cruz	27°17'46"S – 63°47'13"O
	Puesto el Saladillo	27°28'41"S – 63°49'06"O
	Villa Figueroa	27°43'08"S – 63°30'30"O
Moreno	Estancia Los Prados	26°50'28"S – 63°09'01"O
	Girardet	27°37'09"S – 63°10'05"O
	Otumpa	27°19'40"S – 62°13'31"O
	Quimili	27°38'51"S – 62°24'53"O
	Tintina	27°01'41"S – 62°42'26"O
Banda	Abra Grande	27°17'28"S – 64°22'45"O
	Clodomira	27°34'38"S – 64°07'51"O
	El Tramo	27°41'31"S – 64°49'04"O
	La Aurora	27°29'42"S – 64°13'55"O
	La Bajada	27°47'21"S – 64°13'12"O
	La Banda	27°44'03"S – 64°14'32"O
	Laguna de Cuyo	27°40'01"S – 64°07'02"O
	Laguna de Pampa Mayo	27°37'00"S – 64°00'43"O
	Los Corbalanes	27°34'10"S – 64°27'31"O
	Salinas de Huyamampa	27°19'33"S – 64°10'35"O
	San Ramón	27°41'58"S – 64°17'03"O
Río Hondo	Sauce Bajada	27°49'17"S – 64°10'26"O
	Embalse de Río Hondo	27°31'30"S – 64°53'41"O
	Isla Tara Inti	27°30'54"S – 64°52'41"O
	La Donosa	27°26'06"S – 64°59'10"O
	Termas de Río Hondo	27°29'44"S – 64°51'42"O
Guasayán	Villa Río Hondo	27°35'43"S – 64°54'55"O
	El Mangrullo	28°06'39"S – 65°00'09"O
	Lavalle	28°11'46"S – 65°06'22"O
	San Pedro de Guasayán	27°57'23"S – 65°09'59"O
Capital	Villa Guasayán	27°53'10"S – 64°51'05"O
	Ciudad de Santiago del Estero	27°48'13"S – 64°15'51"O
	El Mojón	27°55'40"S – 64°13'29"O
	El Zanjón	27°51'53"S – 64°14'57"O

Apéndice 1 (cont.).**Appendix 1 (cont.).**

Departamentos	Lugares	Coordenadas geográficas
Robles	Los Cardozos	27°56'04"S – 64°10'58"O
	Maco	27°51'01"S – 64°13'59"O
	Beltrán	27°49'45"S – 64°03'54"O
	Forres	27°52'38"S – 63°58'41"O
	Los Arias	27°52'07"S – 64°08'25"O
Juan Felipe Ibarra	Villa Robles	27°55'13"S – 64°06'35"O
	Campo del Cielo	27°52'24"S – 61°48'15"O
	Lagunas Saladas	28°03'22"S – 62°10'28"O
	Suncho Corral	27°56'12"S – 63°25'42"O
	Tobas	28°07'29"S – 62°41'50"O
Sarmiento	Yuchán	27°46'52"S – 62°58'34"O
	Garza	28°09'09"S – 63°32'14"O
	Taboada	28°00'31"S – 63°44'40"O
	Los Gallegos	28°11'00"S – 64°02'60"O
	Árraga	28°03'08"S – 64°13'28"O
Silípica	Campo F. Cantos - INTA	28°01'26"S – 64°18'02"O
	Frías	28°38'16"S – 65°07'52"O
	Río Albigasta	28°39'32"S – 65°06'43"O
	Loreto	28°18'21"S – 64°10'44"O
	Monte Redondo	28°34'01"S – 64°10'01"O
Avellaneda	Colonia Dora	28°36'04"S – 62°56'56"O
	Icaño	28°40'45"S – 62°53'01"O
	Lugones	28°20'17"S – 63°20'27"O
Salavina	Los Telares	28°59'07"S – 63°26'53"O
	Quimilí Paso	28°48'44"S – 63°10'31"O
General Taboada	Añatuya	28°27'33"S – 62°50'14"O
	Averías	28°44'47"S – 62°27'08"O
Ojo de Agua	San Francisco	29°20'22"S – 63°47'36"O
	Sierra de Ambargasta	29°26'57"S – 63°57'53"O
	Villa Ojo de Agua	29°30'01"S – 63°41'40"O
Quebrachos	Paso de la Cina (Bañados del Río Dulce)	29°47'43"S – 62°48'25"O
	Paso de Oscares (Bañados del Río Dulce)	29°15'56"S – 63°12'38"O
	Sumampa	29°22'57"S – 63°28'20"O
Aguirre	Argentina	29°32'08"S – 62°15'58"O
	Malbrán	29°20'46"S – 62°26'28"O
	Pinto	29°08'44"S – 62°29'23"O
Rivadavia	Colonia Alpina	30°03'36"S – 62°06'19"O
	Laguna de los Porongos (Bañados del Río Dulce)	30°03'38"S – 62°34'03"O
	Selva	29°46'01"S – 62°02'54"O
Límite interdepartamental Capital-Banda	Dique Los Quiroga (Río Dulce)	27°38'56"S – 64°22'02"O
Límite interdepartamental Río Hondo – Jiménez	Gramilla	27°17'53"S – 64°36'36"O
Guasayán y Choya	Sierra de Guasayán	28°03'33"S – 64°49'50"O
Alberdi y Figueroa	Bañados de Figueroa	27°18'48"S – 63°41'26"O
General Taboada y Avellaneda	Bañados de Añatuya	28°42'52"S – 62°43'43"O
Salavina, Mitre, Quebrachos y Rivadavia	Bañados del Río Dulce	29°37'56"S – 62°52'43"O
Ojo de Agua, Choya y Loreto	Salinas de Ambargasta	29°07'13"S – 64°21'46"O