



Fundación
Miguel Lillo
Tucumán
Argentina

doi

NOTA

Primer registro de nidificación y nuevas localidades para el Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en Entre Ríos, Argentina

First nesting record and new locations for the European Starling (*Sturnus vulgaris*) in Entre Ríos, Argentina

Lorena Vanesa Sovrano 

Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Ruta Provincial N° 11, Km 10,5, (3101) Oro Verde, Entre Ríos. <lorenavsovrano@hotmail.com>

Resumen

El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) se considera una de las aves invasoras más exitosas a nivel mundial y se encuentra en expansión en Argentina. En este trabajo se reporta el primer registro documentado de reproducción de la especie en la provincia de Entre Ríos. El nido fue hallado en diciembre de 2025 en una cavidad natural y contenía dos pichones. Además, se presentan nuevos registros en ambientes urbanos y rurales que amplían la distribución conocida de la especie en la provincia.

Palabras clave: Especie invasora, expansión, primer registro reproductivo.

Abstract

The European Starling (*Sturnus vulgaris*) is considered one of the most successful invasive bird species worldwide and is currently expanding its range in Argentina. This study reports the first documented breeding record of the species in Entre Ríos Province. The nest was found in December 2025 in a natural cavity and contained two nestlings. In addition, new records from urban and rural environments are presented, expanding the known distribution of the species within the province.

Keywords: First breeding record, invasive bird, range expansion.

► Ref. bibliográfica: Sovrano, L. V. 2026. "Primer registro de nidificación y nuevas localidades para el Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en Entre Ríos, Argentina". *Acta Zoológica Lilloana* 70 (2): 763-769. DOI: <https://doi.org/10.30550/j.azl/2453>

► Recibido: 9 de junio 2026 – Aceptado: 21 de julio 2026.

► URL de la revista: <http://actazoologica.lillo.org.ar>

► Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.



OPEN ACCESS

El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) es una especie invasora, originaria de Europa, norte de África y oeste de Asia, que actualmente presenta una amplia distribución a nivel global (Craig y Feare, 2009; Cabe, 2020). En Argentina, se ha expandido en ambientes urbanos, rurales y periurbanos (Petracci et al., 2004; Merlo, 2021). Es una especie omnívora que nidifica en cavidades naturales o artificiales (Merlo, 2021; Cataudela Kraemer et al., 2026). Se ha registrado su nidificación en diferentes provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires (Di Giacomo et al., 1993; Di Sallo y Segura, 2014), Córdoba (Klavins y Álvarez, 2012), Mendoza (Mendoza y Sorroche, 2020), San Juan (Lucero, 2013), La Pampa (Liébana et al., 2020) y Corrientes (Cataudela et al., 2026). En la provincia de Entre Ríos existen registros de la especie (Peris et al., 2006; Jensen, 2008; Chimento, 2015).

El 14 de diciembre de 2025 se registró un nido con dos pichones de Estornino Pinto en el acceso a la Escuela Normal Rural “Juan Bautista Alberdi”, en la localidad de Oro Verde, Entre Ríos (31°50'S, 60°31'O). El nido se encontraba en una cavidad natural de un ejemplar de Jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*), aproximadamente 1,80 m de altura y a 50 cm de la senda peatonal. Los pichones, de aproximadamente más de 15 días, se asomaban a la entrada de la cavidad y emitían vocalizaciones de llamada (Fig. 1).



Figura 1. Pichones de Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en una cavidad natural de Jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*). Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Sovrano L.

Figure 1. Two European Starling (*Sturnus vulgaris*) nestlings in a natural cavity in a Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*). Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. Photo: Sovrano L.



Figura 2. Pichón asomándose de su nido y un adulto de Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*). Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Sovrano L.

Figure 2. A nestling is seen peeking of its nest and an adult European Starling (*Sturnus vulgaris*). Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. Photo: Sovrano L.

Asimismo, se observó a los progenitores alimentar a los pichones. Durante una hora de observación, los adultos realizaron seis visitas al nido (Fig. 2). Los ítems alimenticios registrados fueron insectos (Orthoptera y Lepidoptera). En una de las visitas de alimentación, un adulto arribó a ramas cercanas, emitiendo vocalizaciones y efectuando rápidos aleteos. Luego, se aproximó a la cavidad y alimentó a los pichones. Ante la llegada del adulto, los pichones incrementaron su actividad, asomándose a la entrada de la cavidad, elevando la cabeza y abriendo ampliamente el pico para solicitar alimento. Luego de la entrega de alimento, los pichones permanecieron en la entrada del nido durante algunos segundos antes de regresar al interior. Además, se observó que los adultos se acercaban a alimentar a los pichones cuando no había tránsito de personas por la senda peatonal.

Este hallazgo constituye el primer registro de reproducción de la especie en la provincia. Si bien se registró un único nido, el lugar posee grandes arboledas con ejemplares añosos donde la especie podría encontrar sitios de adecuados de para nidificar.

Adicionalmente, se obtuvieron nuevos registros de Estornino Pinto para la provincia. El 3 de julio de 2025 se detectaron dos individuos en la zona sureste de la ciudad de Paraná (31°46'S, 60°29'O), posados en un Fresno (*Fraxinus* sp.) sin hojas. Posteriormente, el 19 de octubre de 2025 se registró un individuo en el Parque Ecológico Municipal José Gazzano de la ciudad de Paraná (31°46'S, 60°30'O), posado sobre un Jacarandá cercano a la laguna del Parque y emitiendo vocalizaciones (Fig. 3). Ambas observaciones fueron realizadas en ambientes urbanos.



Figura 3. Adulto de Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en un Jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*). Paraná, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Sovrano L.

Figure 3. An adult European Starling (*Sturnus vulgaris*) on a Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*). Paraná, Entre Ríos, Argentina. Photo: Sovrano L.

Por otra parte, se obtuvieron nuevos registros en áreas rurales. El 26 de octubre de 2025 se observaron más de 25 individuos posados sobre tendidos eléctricos y en vuelo en una zona rural cercana a la localidad de General Ramírez, departamento de Diamante (32°08'S, 60°06'O). Asimismo, el 20 de julio de 2025 se recibió una consulta sobre un ave observada por primera vez en una zona rural de Espinillo Norte, departamento Paraná (Silvana Ferrari, com. pers., 20 de julio 2025). La especie fue identificada como Estornino Pinto y, desde entonces ha sido observada en reiteradas ocasiones en el área (Silvana Ferrari, com. pers., 7 de junio 2026). Los individuos fueron registrados en grupos de cuatro a cinco ejemplares posados en árboles.

Los registros presentados constituyen nuevos antecedentes publicados sobre la presencia del Estornino Pinto en distintas localidades de Entre Ríos y aportan la primera evidencia documentada de reproducción de la especie en la provincia. Actualmente existen numerosos registros en plataformas de ciencia ciudadana, que no han sido incorporados a la literatura científica. En este sentido, los registros presentados complementan el conocimiento disponible sobre esta especie en la provincia y contribuyen al conocimiento de su expansión en Argentina durante las últimas décadas. En relación a esto, el hallazgo de pichones confirma el establecimiento reproductivo de la especie y su expansión por la provincia. No obstante, la ausencia de relevamientos sistemáticos no permite determinar si se trata de un evento reciente o de una detección tardía. En consecuencia, resulta necesario fomentar el monitoreo de sus poblaciones y el registro de eventos reproductivos que permitan evaluar su dinámica de expansión y los posibles efectos sobre las comunidades de aves nativas.

La reproducción se registró durante la temporada reproductiva previamente descripta para la especie en Argentina (Ibáñez et al., 2015). El nido fue hallado en una cavidad natural, lo que concuerda con la información disponible para la especie (Ibáñez et al., 2015; Cabe, 2020). Suele seleccionar cavidades en troncos de árboles añejos o pueden usurpar las cavidades de otras aves como de la familia Picidae (Cabe, 2020). También, se han hallado nidos aberturas similares a cavidades en edificios u otras estructuras antrópicas (Cabe, 2020; Merlo, 2021). Por otra parte, los ítems alimenticios ofrecidos a los pichones coinciden con la dieta mayormente insectívora durante este periodo de cría (Feare, 1984; Cabe, 2020; Merlo, 2021). La frecuencia de visitas al nido para alimentar está dentro de los rangos reportados (Cabe, 2020). Sin embargo, dicha frecuencia podría ser influenciada por la ubicación del nido, ya que se encontraba cercano a una senda peatonal, y varias ocasiones los adultos retrasaron su visita o suspendieron la misma ante el paso de personas por el lugar. De esta manera, los adultos modificarían la frecuencia frente a una perturbación antrópica, que podría ser percibida como una amenaza al nido (Fontaine y Martin, 2006).

En conjunto, estas observaciones son consistentes con los antecedentes que describen al Estornino Pinto como una especie con capacidad de adaptación a diferentes ambientes.

En este contexto, y considerando su creciente expansión en el país, resulta importante continuar con el monitoreo de sus poblaciones y documentar nuevos eventos reproductivos en la región que permitan evaluar sus posibles efectos sobre las especies nativas y comprender la dinámica de sus poblaciones.

AGRADECIMIENTOS

Silvana Ferrari, por brindarme datos novedosos de manera desinteresada.

CONFLICTOS DE INTERÉS

No existen conflictos de interés entre los autores o terceros.

LITERATURA CITADA

- Cabe, P.R. (2020). European Starling (*Sturnus vulgaris*), version 1.0. En S.M. Billerman. (Ed.). *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology. <https://doi.org/10.2173/bow.eursta.01>
- Cataudela, J.F., Kraemer, S., Pucheta, M.F., Di Giacomo, A.G., Kopuchian, C., y Rosoni, J.R.R. (2026). Evidencia reciente de expansión: registros novedosos del estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Corrientes, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 70(1), 21-29. <https://doi.org/10.30550/j.azl/2280>
- Chimento, N.R. (2015). Nuevos registros de estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) y comentarios sobre su nidificación. *Nuestras Aves*, 60, 67-69. <https://doi.org/10.56178/na.vi60.271>
- Craig, A.J.F.K., y Feare C.J. (2009). Family Sturnidae (Starlings). En J. del Hoyo, A. Elliott y D.A. Christie. (Eds.). *Handbook of the Birds of the World* (pp. 654-759). Lynx Edicions.
- Di Giacomo, A.G., Di Giacomo, A.S., y Babarskas, M. (1993). Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 29, 32-33.
- Di Sallo, F.G., y Segura, L.N. (2014). Nidificación del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en un nido de Leñatero (*Anumbius annumbi*) en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 59, 13-15.
- Feare, C.J. (1984). *The starling*. Oxford University Press.
- Fontaine, J.J., y Martin, T.E. (2006). Parental birds assess nest predation risk and adjust their reproductive strategies. *Ecology Letters*, 9, 428-434. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2006.00892.x>
- Ibáñez, L.M. (2015). *Invasión del Estornino Pinto Sturnus vulgaris en el Noreste de la provincia de Buenos Aires: análisis de la competencia con aves*

- nativas y potencialidad como transmisor de parásitos* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata]. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata. <https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/handle/628872547/49947>
- Jensen, F.R. (2008). Nuevos registros de estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) para el sureste de la provincia de Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves*, 53, 22.
- Klavins, J., y Álvarez, D. (2012). El estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves*, 57, 27-29.
- Liébana, M.S., Santillán, M.Á., Seen, N.P., Fiorucci, M., Bernardos, J., y Mallet, J. (2020). Aportes al conocimiento de la distribución y biología del estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en el centro de Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 64, 43-57. <https://doi.org/10.30550/j.azl/2020.64.1/4>
- Lucero, F. (2013). Nuevas aves, primeras evidencias y localidades para las provincias de San Juan y Catamarca, Argentina. *Ecoregistros*, 3, 14.
- Mendoza, F., y Sorroche, S. (2020). Evidencias de nidificación de estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 289, 1-5.
- Merlo, F. (2021). Primeros registros de nidificación del estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en Oncativo, Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves*, 66, 41-45.
- Peris, S., Soave, G., Camperi, A., Darrieu, C., y Arámburu, R. (2006). Range expansion of the European Starling *Sturnus vulgaris* in Argentina. *Ardeola*, 52(2), 359-364.
- Petracci, P.F., Delhey, K.J.V., Pérez, C.H.F., Basanta, D., Massola, M.V., Zamorano, M., y Fosatti, M. (2004). Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. *Nuestras Aves*, 48, 25-31.