

CATALOGO DE LOS GENEROS DE LAS PLANTAS VASCULARES

DE LA FLORA ARGENTINA

PTERIDOPHYTA

POR A. CASTELLANOS Y R. H. CAPURRO

ABSTRACT

Catalogue of the genera of vascular plants of Argentine flora. — For vascular Cryptogams the authors follow Christensen's Index and for the other vascular plants Dalla Torre and Harms' Catalogue.

In each genus they mention the princeps work, the principal *Genera*, the Argentine works which treat about it, its world geographical area, the Argentine botanical provinces where it grows, the number of Argentine species and its etymology.

En vista que tanto el catálogo de Christensen, *Index filicum* (1906) y su *Supplementum* (1906-34) y el de Dalla Torre et Harms, *Catalogus Siphonogamarum* (1900-07) no son de fácil adquisición, y además, este último con su suplemento adjunto ya es antiguo, hemos creído conveniente recopilar los géneros de las plantas vasculares hasta ahora citados para la flora argentina, criterio éste puramente convencional, a fin de evitar las suposiciones, con el objeto de tener, en un libro manual y accesible, los géneros con un cómputo aproximado de las especies nuestras. Para la confección de esta obra hemos seguido el plan del catálogo de Dalla Torre y Harms, eliminando, a fin de abreviar, toda categoría que no tenga especies argentinas y limitando las citas bibliográficas a la obra *princeps*, a la de los sinónimos, a la de los *genera* de Endlicher, *Genera plantarum*

(1836-50), Bentham et Hooker, *Genera plantarum* (1862-83) y Engler u. Prantl, *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887-1911) y la segunda edición (1925-40). Además de estas obras generales hemos tenido en cuenta las modernas, monografías o revisiones de familias o de géneros que se han publicado dentro o fuera del país, pero que estudian nuestras especies; en cuyo caso al seguir a los autores modernos no citamos a los clásicos.

Hemos procurado darle más precisión al área geográfica argentina que la consignada en la obra que seguimos; además, siempre que nos ha sido posible, le hemos agregado la etimología de los géneros.

Esta obra ha sido realizada con la colaboración de varios autores, que figuran en las partes respectivas, y disponiendo de las bibliotecas y ficheros del Instituto Lillo de Tucumán y el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires.

Las abreviaturas usadas son las siguientes: C. Chr., *Ind. fil.* e *Ind. fil. sup.* para Christensen, *Index filicum* y sus suplementos; Endl., G. para Endlicher, *Genera plantarum*; B. H. para Bentham et Hooker, *Genera plantarum* y E. P. para Engler u. Prantl, *Die natürlichen Pflanzenfamilien* y E. P. 2ª para la segunda edición.

En las Fanerógamas hemos seguido el orden y amplitud de las familias según Engler-Diels, *Syllabus* (1936), y el número que precede al género, es el asignado por Dalla Torre y Harms en su catálogo.

Al final de este trabajo se adjunta un mapa fitogeográfico argentino con el objeto de hacer más comprensible el área geográfica que le damos a los géneros.

PTERIDOPHYTA

Revisada según Capurro, *Catálogo de las Pteridofitas* (1940).

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1097. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 71.

Área geográfica: América, África y Asia.

En Argentina: prov. Misionera, Tucumano-boliviana y Antártica.

Especies argentinas: 6.

Etimología: de $\theta\rho\iota\zeta$ = pelo y $\mu\epsilon\nu\acute{o}\varsigma$ = delgado.

Serpyllopsis van den Bosch

Van den Bosch in *Versl. Akad. Wet. Amsterdam* XI (1861) 318.

Área geográfica: Sudamérica.

En Argentina: prov. Antártica.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de *Serpylla* (género de Labiadas) y $\epsilon\psi\iota\varsigma$ = apariencia.

Hymenophyllum J. E. Smith

Smith, J. E., *Mem. Acad. Turin* V (1793) 418. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 73.

Área geográfica: América y Asia.

En Argentina: prov. Central y Antártica.

Especies argentinas: 15.

Etimología: de $\mu\epsilon\mu\beta\rho\alpha\upsilon\alpha$ = membrana y $\varphi\acute{\upsilon}\lambda\lambda\omicron\nu$ = hoja.

CYATHEACEAE

Balanium Kaulf.

Kaulfuss, *Enum. fil.* (1824) 228. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 77.

Area geográfica: América y Oceanía.

En Argentina: prov. Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\beta\alpha\lambda\acute{\alpha}\nu\pi\iota\sigma\iota\nu$ = bolsa. Soros en forma de saco.

Dicksonia L'Héritier

L'Héritier, *Sertum angl.* (1788) 30. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 77.

Area geográfica: América y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: dedicado al botánico escocés J. Dickson (1738-1832).

Hemitelia R. Brown

Brown, R., *Prod. fl. Nov. Hol.* (1810) 158. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 78.

Area geográfica: zonas tropicales de América, África y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera y Tucumano-boliviana.

Especies argentina: 2.

Etimología: de $\acute{\eta}\mu$ = mitad y $\tau\acute{\eta}\lambda\acute{\iota}\alpha$ = un objeto con reborde. Porque está desarrollada sólo la mitad del indusio.

Alsophila R. Brown

Brown, R., *Prod. fl. Nov. Hol.* (1810) 158. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 78.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 3.

Etimología: de $\alpha\lambda\sigma\omicron\varsigma$ = soto o bosque y $\phi\acute{\iota}\lambda\eta$ = amiga. Amiga de los bosques.

Lophosoria Presl.

Presl in *Abh. böhm. ges.* V, 5 (1848) 344. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 79.

Area geográfica: América.

En Argentina: prov. Antartándica.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\lambda\acute{\omicron}\varphi\omicron\varsigma$ = penacho o cresta y $\sigma\omega\rho\acute{\omicron}\varsigma$ = soro.

POLYPODIACEAE

Woodsia R. Brown

Brown, R., *Prod. fl. Nov. Hol.* (1810) 158. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 79.

Area geográfica: América, Asia y Europa.

En Argentina: prov. Bonariense, Central y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 2.

Etimología: dedicado al botánico inglés José Woods.

Cystopteris Bernh.

Bernhardi in Schrader, *Neu. Journ.* I, 2 (1806) 26. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 80.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Central, Tucumano-boliviana y Antartándica.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\kappa\acute{\upsilon}\sigma\tau\iota\varsigma$ = vejiga y $\pi\epsilon\pi\epsilon\acute{\rho}\iota\varsigma$ = helecho. Indusio en forma de vejiga.

Dryopteris Adans.

Adanson, *Fam. plant.* II (1763) 20. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 81.

Subgénero: *Cyclosorus* (Link) C. Chr., *Biol. Arbejder tilegnede Eug. Warming* (1911) 81.

Id. *Eudryopteris* C. Chr., *ibid.* pg. 76.

Id. *Goniopteris* (Presl) C. Chr., *ibid.* pg. 83.

Id. *Meniscium* Schreber in Linnaeus, *Gen. pl.* 8ªed. (1791).

Id. *Lastrea* Bory emend. C. Chr., *Biol. Arbejder tilegnede*

Eug. Warming (1911) 79.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Uruguay, Correntino-paraguaya, Misionera, Chaqueña, Tucumano-boliviana, Central y Antartándica.

Especies argentinas: 32.

Etimología: de $\beta\alpha\upsilon\varsigma$ = encina y $\pi\tau\epsilon\rho\acute{\iota}\varsigma$ = helecho. Dioscórides dice que sus especies viven en la corteza mohosa de las encinas o robles, por eso les llaman helechos del roble.

Didymochlaena Desv.

Desvaux, *Berl. Mag.* V (1811) 303. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 94.

Area geográfica: América, África y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\delta\acute{\iota}\delta\upsilon\mu\omicron\varsigma$ = doble y $\chi\lambda\acute{\alpha}\nu\alpha$ = vestido.

Aspidium Sw.

Swartz in Schrader, *Journ.* (1800) 29. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 95.

Subgénero: *Sagenia* Presl, *Verh. Ges. vaterl. Mus.* (1836) 59.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Oranense y Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\acute{\alpha}\sigma\pi\acute{\iota}\delta\iota\omicron\nu$ = escudito. Por la forma del indusio.

Polystichum Roth

Roth, *Röm. Mag.* II 1 (1799) 106. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 99.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Misionera, Chaqueña, Central, Tucumano-boliviana, Andina, Patagónica, Antartándica, Uruguay y Correntino-paraguaya.

Especies argentinas: 8.

Etimología: de $\pi\omicron\lambda\acute{\iota}\varsigma$ = mucho y $\sigma\tau\acute{\iota}\chi\omicron\varsigma$ = hilera o rango. Porque los soros suelen presentarse en varias hileras.

Polybotrya Humb., Bonpl. et Will.

Humboldt, Bonpland et Willdenow, *Sp. pl.* V (1810) 99. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 104.

Area geográfica: América y Asia.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\pi\omicron\lambda\acute{\iota}\varsigma$ = mucho y $\beta\acute{\epsilon}\tau\tau\omicron\varsigma$ = racimo de uva.

Leptochilus Kaulf.

Kaulfuss, *Enum. fil.* (1824) 147. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 104.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera y Chaqueña.

Especies argentinas: 2.

Etimología: de $\lambda\epsilon\pi\tau\acute{\iota}\varsigma$ = delgado o delicado y $\gamma\epsilon\acute{\iota}\lambda\omicron\varsigma$ = labio, borde.

Saccoloma Kaulf.

Kaulfuss in *Berl. Jahrb. Pharmacie* (1820) 51 y *Enum. fil.* (1824) 224. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 105.

Area geográfica: América y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\sigma\acute{\alpha}\kappa\kappa\omicron\varsigma$ = saco y $\lambda\omicron\omega\mu\alpha$ = borde.

Microlepia Presl

Presl, *Tent. Pterid.* (1836) 124. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 105.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\mu\iota\kappa\rho\acute{\iota}\varsigma$ = pequeño y $\lambda\epsilon\pi\acute{\iota}\varsigma$ = escama.

Dennstaedtia Bernh.

Bernhardi in Schrader, *Journ.* (1801) 124. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 105.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 5.

Etimología: dedicado al botánico alemán A. W. Dennstaedt.

Lindsaya Dry.

Dryander in *Trans. Linn. Soc.* III (1797) 39. Smith, *Mem. Ac. Turin* V (1793) 413. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 106.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: dedicado al botánico inglés Archibaldo Lindsay.

Athyrium Roth

Roth in *Röm. Mag.* II (1799) 105 y *Tent. fl. Germ.* III (1800) 58. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 107.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Misionera, Chaqueña, Correntino-paraguaya, Central y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 2.

Etimología: $\acute{\alpha}$ = sin y $\theta\acute{\upsilon}\rho\acute{\iota}\sigma\upsilon$ = pequeña puerta; significa abierto, libre.

Diplazium Sw.

Swartz in Schrader *Journ.* II (1800) 61. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 108.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 2.

Etimología: de $\delta\iota\pi\lambda\acute{\alpha}\zeta\epsilon\iota\upsilon$ = doblemente hecho. Por presentar soros dobles.

Phyllitis Ludwig

Ludwig, *Inst. hist. phys. reg. veg.* 2ª ed. (1757) 142. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 108.

Area geográfica: América, Europa y Asia.

En Argentina: prov. Misionera y Chaqueña.

Especies argentinas: 3.

Etimología: $\varphi\upsilon\lambda\lambda\acute{\iota}\tau\iota\varsigma$ = nombre empleado por Dioscórides para designar el helecho llamado en castellano «lengua cervina».

Asplenium L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1078. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 109.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Misionera, Correntino-paraguaya, Chaqueña, Central, Tucumano-boliviana y Antartánica.

Especies argentinas: 26.

Etimología: de $\acute{\alpha}$ = privativo y $\sigma\pi\lambda\acute{\iota}\gamma$ = tristeza. Suponían propiedades curativas de ese mal.

Pleurosorus Fée

Fée, *Gen. fil.* (1850-52) 179. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 117.

Area geográfica: América, Europa y Oceanía.

En Argentina: prov. Central y Antartánica.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\pi\lambda\epsilon\upsilon\rho\acute{\sigma}\nu$ = costado y $\sigma\omega\rho\acute{\sigma}\varsigma$ = soro.

Blechnum L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1077. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 118.

Subgénero: *Eublechnum* Baker, *Synop. Fil.* (1874) 183.

Id. *Lomaria* Willdenow, *Berl. Mag.* III (1809).

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Central, Tucumano-boliviana, Correntino-Paraguaya, Patagónica y Antartánica.

Especies argentinas: 22.

Etimología: de $\beta\lambda\eta\chi\upsilon\sigma\upsilon$, nombre dado por Dioscórides a un helecho y después empleado por Linneo.

Anogramma Link

Link, *Fil. sp.* (1841) 137. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 126.

Area geográfica: América, África, Asia y Europa.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Misionera, Correntino-paraguaya, Chaqueña y Central.

Especies argentinas: 3.

Etimología: de ἄνω = hacia arriba; γραμμή = línea.

Gymnogramma Desv.

Desvaux, *Berl. Mag.* V (1811) 304. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 127.

Area geográfica: América, África y Oceanía.

En Argentina: prov. Central.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de γυμνός = desnudo y γραμμή = línea. Porque las hileras de soros no tienen indusio.

Hemionitis L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1077. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 128.

Area geográfica: América y Asia.

En Argentina: Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de ἡμίονος = mula. Porque se suponía siempre estéril.

Gymnopteris Bernh.

Bernhardi in Schrader, *Journ.* (1799) 291. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 128.

Area geográfica: América, Oceanía y Asia.

En Argentina: prov. Tucumano-boliviana, Central, Chaqueña y Misionera.

Especies argentinas: 2.

Etimología: de γυμνός = desnudo y πτερίς = helecho.

Ceropteris Link

Link, *Fil. sp.* (1841) 141. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 129.

Area geográfica: América y África.

En Argentina: prov. Tucumano-boliviana, Central, Correntino-paraguaya y Misionera.

Especies argentinas: 2.

Etimología: de κηρός = cera y πτερίς = helecho.

Trismeria Fée

Fée, *Gen. Polyp.* (1850-52) 164. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 130.

Area geográfica: América.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Misionera, Correntino-paraguaya, Chaqueña, Central y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de τρεῖς = tres y μέρος = parte. Porque presenta la fronde dividida en 3 lóbulos.

Pellaea Link

Link, *Fil. sp.* (1841) 48. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 130.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Tucumano-boliviana, Chaqueña, Central, Bonariense, Patagónica y Andina.

Especies argentinas: 5.

Etimología: de πελλός = obscuro.

Doryopteris J. Sm.

Revisado según Tryon, *Doryopteris* (1942).

Smith, J. in *Journ. Bot.* III (1841) 404 y IV (1842) 162.

Tryon, *Doryopt.* (1942) 11.

Area geográfica: América, África y Oceanía.

En Argentina: Tucumano-boliviana, Central, Chaqueña, Correntino-paraguaya y Misionera.

Especies argentinas: 5.

Etimología: de δόρυ = lanza y πτερίς = helecho. Por la forma lanceolada de las frondes.

Adiantopsis Fée

Fée, *Gen. Polyp.* (1850-52) 145. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 136.

Area geográfica: América y África.

En Argentina: Tucumano-boliviana, Chaqueña, Correntino-paraguaya, Misionera y Uruguay.

Especies argentinas: 4.

Etimología: de *Adiantum* (género de Polipodiáceas) y $\psi\psi$ = apariencia.

Notholaena R. Brown

Revisado según Weatherby, *Notholaena* (1941).

Brown, *Prod. fl. Nov. Hol.* (1810) 145. Weatherby, *Nothol.* (1941) 251.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay (Mesopotámica), Correntino-paraguaya, Chaqueña, Misionera?, Tucumano-boliviana, Oranense, Central, Andina y Patagónica?

Especies argentinas: 6.

Etimología: de $\nu\theta\theta$ = espúreo y $\lambda\alpha\lambda\alpha$ = vestido. En la especie genérica la lana de la fronde forma un vestido espúreo de los esporangios.

Cheilanthes Sw.

Swartz, *Synop. fil.* V (1806) 126. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 140.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: en todas las provincias botánicas.

Especies argentinas: 11.

Etimología: de $\chi\epsilon\lambda\theta$ = margen y $\alpha\theta\theta$ = flor. Porque los soros están en el margen de la fronde.

Hypolepis Bernh.

Bernhardi in Schrad. *Neu. Journ.* I 2 (1806) 34; Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 144.

Area geográfica: América, África y Oceanía.

En Argentina: prov. Bonariense y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 3.

Etimología: de $\psi\psi$ = debajo y $\lambda\epsilon\pi\iota\varsigma$ = escama. Por el pliegue marginal que cubre los esporangios.

Cryptogramma R. Brown

Brown, R. ap. Richards in Franklin, *Narr. of a Journey* (1823) 767. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 145.

Area geográfica: América, Europa y Asia.

En Argentina: prov. Antartándica.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de $\kappa\rho\upsilon\pi\tau\acute{o}\varsigma$ = oculto y $\gamma\rho\alpha\mu\mu\acute{\eta}$ = línea. Porque los soros están colocados submarginales.

Adiantum L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1094. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 145.

Area geográfica: América, África, Europa, Asia y Oceanía.

En Argentina: en todas las provincias botánicas.

Especies argentinas: 22.

Etimología: de α = privativo y $\delta\iota\lambda\iota\omega$ = mojar. Las frondes repelen las gotas de agua.

Pteris L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1073. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 152.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Misionera, Correntino-paraguaya, Chaqueña y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 8.

Etimología: $\pi\tau\acute{\epsilon}\rho\iota\varsigma$ = antiguo nombre griego de un helecho, de $\pi\tau\epsilon\rho\acute{o}\nu$ = ala o pluma.

Pteridium (Gled.) Scop.

Gleditsch in Boehmer, *Fl. Lipsiae Indigena* (1750) 295. Scopoli, *Fl. carniol.* ed. 1 (1760) 169. Kuhn, *Bot. Ost.-Afri. Deck. Reise* III 3 (1879) 11. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 155.

Area geográfica: en las zonas tropicales y templadas del globo.

En Argentina: prov. Tucumano-boliviana, Central, Misionera y Uruguay.

Especies argentinas: 1.

Etimología: diminutivo de *Pteris*.

Vittaria Sm.

Smith, J. E. in *Mem. Acad. Turin* V (1793) 413, tab. 9. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 156.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: del lat. *vitta* = venda y el sufijo *arium*(aria) = que expresa idea de posesión.

Antrophyum Kaulf.

Kaulfuss, *Enum. fil.* (1824) 197. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 154.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: Tucumano-boliviana y Misionera.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de *ἄντρον* = antro y *φύω* = crecer. Que vive o se produce en los antros o cavernas.

Polypodium L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1082 y *Gen. pl.* 5ª ed. (1754) 1043. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 157.

Subgénero *Campyloneurum* (Presl) Christ.

Presl, *Tentamen Pteridographiae* (1836) 189. Christensen, *Ind. fil.*

Subgénero *Goniophlebium* (Blume) Christ.

Blume, *Fl. Javae* (1828) 132, tab. 82. Christensen, *Ind. fil.*

Subgénero *Marginaria* (Bory) Christ.

Bory, *Dictionnaire classique d'hist. nat. Paris* X (1826) 176. Christensen, *Ind. fil.*

Subgénero *Eupolypodium* Christensen, *Ind. fil.*

Id. *Phlebodium* R. Brown

Id. *Pleopeltis* (H. B. ex Willd.) Christ.

Humboldt, Bonpland ex Willdenow, *Sp. pl.* V (1810) 211. Christensen, *Ind. fil.*

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Correntino-paraguaya, Chaqueña, Misionera, Central, Tucumano-boliviana, Oranense, Antartánica y Patagónica.

Especies argentinas: 43.

Etimología: de *πολύς* = muchos y *πός* = pie. Porque el rizoma lleva muchas raíces.

Elaphoglossum Schott

Schott, *Gen. fil.* (1834) tab. 14. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 169.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Bonariense, Central, Tucumano-boliviana y Antartánica.

Especies argentinas: 14.

Etimología: de *ἐλαγος* = ciervo y *γλῶσσα* = lengua. Por la forma de la fronde.

Trachipteris André ex Christ

André, *Rev. Hort.* (1899). Christ, *Monogr. Elaphog.* (1899) 150. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 173.

Area geográfica: América.

En Argentina: prov. Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de *τραχύς* = áspero y *πτερίς* = helecho.

Acrostichum L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1067. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 173.

Area geográfica: América y Oceanía.

En Argentina: prov. Misionera y Chaqueña.

Especies argentinas: 1.

Etimología de: *ἄκρος* = extremidad y *στίχος* = hileras o rangos.

PARKERIACEAE**Ceratopteris Brongn.**

Brongniart in *Bull. Soc. Philom.* (1821) 186. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 174.

Area geográfica: en las zonas tropicales y subtropicales del globo.

En Argentina: prov. Correntino-paraguaya y Misionera.
Especies argentinas: 2.
Etimología: de κέρας = cuerno y περιζ = helecho.

GLEICHENIACEAE

Gleichenia Sm.

Smith, J. E. in *Mem. Acad. Turin* V (1793) 419; Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 175.
Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.
En Argentina: prov. Misionera y Antartánica.
Especies argentinas: 5.
Etimología: dedicado al botánico alemán F. W. von Gleichen (1717-1783).

Dicranopteris Bernh.

Bernhardi in Schrader, *Neu. Journ.* I 2 (1806) 1. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 176.
Area geográfica: América.
En Argentina: prov. Antartánica.
Especies argentinas: 1.
Etimología: de δίκρανον = horquilla y περιζ = helecho.

SCHIZAEACEAE

Schizaea Sm.

Smith, J. E., *Mem. Acad. Turin* V (1793) 419. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 176.
Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.
En Argentina: prov. Antartánica.
Especies argentinas: 1.
Etimología: de σχίζω = hender o dividir a lo largo.

Lýgodium Sw.

Swartz in Schrad. *Journ.* (1801) 106. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 177.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.
En Argentina: prov. Misionera.
Especies argentinas: 2.
Etimología: de λυγρόν = flexible.

Aneimia Sw.

Swartz, *Synop. fil.* IV (1806) 155. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 177.
Area geográfica: América.
En Argentina: prov. Patagónica, Bonariense, Central, Uruguay, Correntino-paraguaya, Chaqueña, Misionera y Tucumano-boliviana.
Especies argentinas: 7.
Etimología: de αν = privativo y εἶμα = vestido. Carece de indusio.

OSMUNDACEAE

Osmunda L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1063; *Gen. plant.* ed. 5ª (1754) n° 1036. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 179.
Area geográfica: en todo el mundo.
En Argentina: prov. Bonariense y Misionera.
Especies argentinas: 2.
Etimología: de Osmunder, nombre sajón de la divinidad celta Thor, emblema de la fuerza.

SALVINIACEAE

Azolla Lam.

Lamarck, *Encycl. Méth.* I (1783) 343. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 180.
Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.
En Argentina: en todas las provincias botánicas.
Especies argentinas: 2.

Salvinia Adans.

Adanson, *Fam. plant.* II (1763) 15. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 181.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Correntino-paraguaya, Misionera, Chaqueña, Central y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 2.

Etimología: dedicado al profesor florentino Antonio María Salvini (1633-1729).

MARSILEACEAE**Marsilea** L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1099; *Gen. plant.* ed. 5ª. (1754) n° 1046. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 182.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Patagónica, Bonariense, Uruguay, Central y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 3.

Etimología: dedicado al botánico italiano Giovanni Marsili (1658-1730), profesor de Botánica en la Universidad de Padua.

Pilularia L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1100; *Gen. plant.* ed. 5ª (1754) n° 1047. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 183.

Area geográfica: América, Europa y Oceanía.

En Argentina: prov. Bonariense y Central.

Especies argentinas: 1.

Etimología: del lat. *pilula* = píldora y *arium* = conjunto.

OPHIOGLOSSACEAE

Revisada según Lichtenstein, *Ofioglosáceas argentinas* (1944).

Ophioglossum L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1062; *Gen. plant.* ed. 5ª (1754) n° 1035. Lichtenstein, *Ofiog.* (1944) 383.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Misionera, Chaqueña, Central, Tucumano-boliviana y Antartándica.

Especies argentinas: ± 7 .

Etimología: de $\sigma\phi\epsilon\iota\varsigma$ = serpiente y $\gamma\lambda\omega\sigma\sigma\alpha$ = lengua.

Botrychium Sw.

Swartz in Schrader, *Journ.* II (1800) 110. Lichtenstein, *Ofiog.* (1944) 417.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Antartándica, Patagónica, Central y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 4.

Etimología: de $\beta\acute{o}\tau\rho\upsilon\varsigma$ = racimo de uvas. Por el aspecto de la agrupación de los esporangios.

EQUISETACEAE**Equisetum** L.

Linnaeus, *Gen. plant.* ed. 5ª (1754) n° 1033. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 186.

Area geográfica: en todo el mundo, menos Australia.

En Argentina: prov. Antartándica, Patagónica, Bonariense, Uruguay, Chaqueña, Central, Andina y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 5.

Etimología: del lat. *equus* = caballo y *seta* = cerda.

LYCOPODIACEAE**Lycopodium** L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1100; *Gen. plant.* ed. 5ª (1754) 1049. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 188.

Area geográfica: América, África, Asia y Oceanía.

En Argentina: prov. Antartándica, Patagónica, Andina, Central, Tucumano-boliviana, Correntino-paraguaya, Misionera, Uruguay y Bonariense.

Especies argentinas:

Etimología: de λύκος = lobo y πούς = pie.

SELAGINELLACEAE

Selaginella Beauv.

Beauvois, *Prod. aeth.* (1805) 101. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 190.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Bonariense, Uruguay, Correntino-paraguay, Misionera, Tucumano-boliviana, Central y Andina.

Especies argentinas: 13.

Etimología: diminutivo de *Selago*, antiguo nombre del género *Lycopodium* del cual después se separó como entidad genérica.

PSILOTACEAE

Psilotum Sw.

Swartz, *Synop. fil.* (1806) 187. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 194.

Area geográfica: zonas tropicales y subtropicales de América.

En Argentina: prov. Misionera y Tucumano-boliviana.

Especies argentinas: 1.

Etimología: de ψῆλος = desnudo.

ISOETACEAE

Isoetes L.

Linnaeus, *Sp. pl.* II (1753) 1100; *Gen. plant.* ed. 5^a (1754) 1048. Capurro, *Cat. Pteridofitas* (1940) 195.

Area geográfica: en todo el mundo.

En Argentina: prov. Antartánica, Central, Uruguay y Misionera.

Especies argentinas: 4.

Etimología: de ἴσος = igual y ἔτος = tiempo o año. Por presentar siempre el mismo aspecto.

Nota. — Impresa esta parte del *Catálogo de los géneros*, nos llegó la obra de Copeland, *Genera Filicum*, por lo cual no la hemos podido considerar.

(Continuará).