

UNA NUEVA ESPECIE SANTAFECINA DE « RHABDADENIA »

POR ROBERT E. WOODSON, JR.
(U. S. A.)

ABSTRACT

A new species of Rhabdadenia from Santa Fe. — *Rh. Ragonesei* is described from the Province of Santa Fe, R. A. Its closest affinities apparently are with *Rh. Pohliae* Muell. Arg., with which it might be confused in the sterile condition. However the corollas are quite distinct, those of the former being 9-10 cm long with proper tube about equalling the throat, and those of the latter 5-7 cm long with proper tube much shorter than the throat.

Entre varias Apocináceas de las que me han enviado, hace poco, hay una que constituye una especie nueva del género *Rhabdadenia*. Con mucho gusto la dedico al ingeniero señor Arturo E. Ragonesi, del Departamento de Agronomía del Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola-Ganadero de Santa Fe, R. A., de quien recibí el tipo.

Rhabdadenia Ragonesei Wods., sp. nov.

Suffrutex volubilis glaberrimus; ramis gracilibus subsimplicibus. Folia opposita brevissime (ca. 0,2-0,3 cm) petiolata oblongo-linearia apice acuminata basi obtusa 6-9 cm longa 0,3-0,7 cm lata. Inflorescentia alternato-lateralis 1-3-flora; pedunculo 4-5 cm longo; pedicellis ca. 0,2 cm longis; calycis laciniis linear-lanceolatis acuminatis 1,4-1,5 cm longis herbaceis glabris; corollae speciosae roseae tubo proprio 3,5 cm longo basi ca. 0,15 cm diametro fauci-

bus tubulo-campanulatis 3 cm longis ostio ca. 1,5 cm diam. lobis oblique obovatis acuminatis 3,0-3,25 cm longis ca. 2,5 cm latis patulis; antheris anguste oblongo-ellipticis longe acuminatis basi anguste obscureque 2-lobatis 0,5 cm longis dorso apicem versus dense papillatis caeterumque glabris; ovarii anguste oblongo-ovoideis ca. 0,15 cm longis stylo gracillino stigmate fusiformi-umbra-culiforme apice 2-lobato ca. 0,2 cm longo, nectariis 5 compresse ovoideo-subreniformibus ca. 0,5 cm longis. Folliculi ignoti.

Trepadora, voluble, glabra. Tallos delgados, sencillos. Hojas opuestas, brevemente (0,2-0,3 cm) pecioladas, oblongo-lineales, acuminadas, de base obtusa, 6-9 cm largo, 0,3-0,7 cm anchas. Inflorescencia alterno-lateral, 1-3-flora; pedúnculos 4-5 cm largo; pedicelos 0,2 cm largo; sépalos lineal-lanceolados, acuminados, 1,4-1,5 cm largo, herbáceos, glabros; corola rosada, tubo 3,5 cm largo, ca. 0,15 cm diá., garganta tubuloso-campanulada 3 cm largo, ca. 1,5 cm diá., lóbulos oblicuamente obovados, acuminados, 3,0-3,25 cm de largo, ca. 2,5 cm ancho, notables; anteras estrechamente oblongo-elípticas, muy acuminadas, u obscuramente 2-lobadas en la base, 0,5 cm largo, con la extremidad muy papilosa, siendo glabras en el resto de su superficie; ovario estrechamente ovado, ca. 0,15 cm largo, estigma fusiforme-umbraculiforme, bilobado, ca. 0,5 cm largo. Fruto: no he visto.

Material estudiado. — Prov. Santa Fe: Dpto. Gral. Obligado, entre Villa Guillermina y Rabón, Febr. 14, 1938, A. E. Ragonese 3267 (*Typo* en Herb. Missouri Bot. Garden, St. Louis, U. S. A.; *Isotipo* en el herbario del Departamento Agronomía del Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola-Ganadero, Santa Fe, R. A.).

Las hojas, así como el hábito general de esta especie, son muy semejantes a las de *Rhabdadenia Pohlia* Muell. Arg. Sin embargo, las corolas de las dos especies son muy distintas, las de la primera 9-10 cm de largo, con el tubo tan largo como la garganta, y las de la segunda 5-7 cm de largo con el tubo cortísimo.